




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
488/A/2







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
488/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
488/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
488/A/2

Q 6547

L. XLVIII

488(2) 16/  
A

Lier Ma  
(n. L.)

121


8 leaves

95 11

xy

Lier  
8 sw fr  
7 may/28







Ar. Fe.

AR



51922

# ARS DE DOSIBVS

MEDICINARVM,  
ET ALIA

PRAESTANTISSIMORVM  
Medicorum monumenta;

quae omnia in sequenti  
pagina indicantur.



Accessit & Index locupletissimus in calce Operis.



PATAVII,

*Apud Gratosum Perchacinum*

M. D. LXIIII.



MATTHAEI CVRTII De Dosibus,  
De septimestri partu. De febribus.

FRANCISCI CASSIANI Quæstio de se-  
ctiōe venæ in pleuritide.

BENEDICTI VICTORII Fauentini De  
Dosibus.

BARTHOLOMAEI Montagnanæ De  
Dosibus.

GVLIELMI RONDALITII De ponderi-  
bus, & iusta quantitate medicamentorū.

THOMAE DE GARBO De Reductio-  
ne medicinarum ad actum, & de Gradi-  
bus earundem.



G R A T I O S V S

P E R C H A C I N V S

*candido Lectori*

*S. D.*



I Pythagoræ  
notissima illa  
μετεωρύχων α-  
liquam fidem  
meretur ve-  
risimilem cer-  
tè eā hoc ma-

ximè facit argumentum, cum vi-  
deamus hæc nostra tempora, plu-  
rimos in varijs artibus viros ita  
excellentes, partim habuisse, par-

A 2 tim



tim adhuc habere, qui cū ipsis pri-  
mis earundem artium inuentori-  
bus, iure optimo comparari possint,  
quasi horum anima nunc in istorū  
corpora transmigrarint. Nolo  
autem hic longa serie omnes enu-  
merare, tum quod res hæc huius  
loci non sit, tum quod in immen-  
sum nostra cresceret oratio, sed  
tantum aliquorum, qui in arte  
medica, omnium calculis, ad sum-  
mum fastigium, hac nostra ætate,  
peruenerunt, breuem faciam men-  
tionem. Quid quæso præstantius  
desiderari potest, quàm sunt isti  
Viri, quorum opuscula typis no-  
stris diligenter excussa, candide  
Lector, nunc tibi legenda damus?

Si



*Si singulorum meritas laudes enu-  
merare vellem, singula volumina  
mihi conscribenda essent, nec un-  
quam par huic oneri esse possem.  
Sat erit aliquid de Curtio hic com-  
memorare, quem artem medicam  
hoc nostro seculo instaurasse, om-  
nes, etiam qui malè de eo sentiunt,  
fatentur, cumque Poeta dicat,*

*Non minor est virtus, quàm quærere parta tueri,  
Ideo tantum debemus Curtio, qui  
collapsam artem medicam instau-  
rauit, ac errorum tenebris sepul-  
tam iterum in lucem produxit,  
atque priori nitori miserè deturpa-  
tam restituit, quantum primis il-  
lis huius artis authoribus, qui &  
fundamenta artis iecerunt, ac tan-  
dem*

*A 3 dem*



dem totam artis fabricam pul-  
chro ordine construxerunt. Le-  
gimus Romanum illum Cur-  
tium, quia patriam suam ab hia-  
tu illo, sese in eum præcipitem dan-  
do, liberarit, omnium laudibus ce-  
lebratum, & adhuc in hodiernum  
usque diem virtus ipsius ab omni  
planè macula est immunis. Sic  
medica resp. in cælum usque, ut  
hunc nostrum Curtium extollat,  
est necesse, qui turpissimos tales  
hiatus, & foetidos innumeros er-  
rores in arte medica agnouit, &  
funditus aboleuit. Testantur de  
hac Curtij excellenti eruditione,  
monumenta plurima, tum mor-  
tua tū viua, quæ totus orbis nunc  
quo-



quoque reuerenter habet & obseruat. In omnium manibus sunt libri à Curtio editi, Doctissimi denique Viri, quos nunc in arte medica adhuc superstites veneramur, omnes ferè ex schola Curtij prodierunt. Hic est equus ille Troianus, ex quo non milites gregarij sed praestantissimi Duces sunt progressi. Hæc est schola ista Pythagoræ, quæ nihil nisi diuina ingenia toti orbi communicauit. Res ipsa loquitur, ideo discipulorum nomina silentio præteribo, præsertim cum sine adulationis suspitione eorum laudes à me decantari non possent, quam tamen procul semperq; à me abesse velim. Hæc de

A 4 Cur-



Curtio brevissimè dicta sufficiant.  
Sic nemo est cui Francisci Cassiani  
celeberrimum nomen non perue-  
nerit ad aures, Omnium ore etiā  
prædicatur insignis eruditio Bene-  
dicti Victorij Faurentini: Nec de-  
nique Bartholomæi Montagnana  
amplissima fama unquam apud  
doctos & bonos interibit. Quid  
vero de Rundalio hic in medium  
adducam? Eruditi aliquot iuue-  
nes Germani, qui in schola Mon-  
tis Pessulani cum dicto Rundali-  
tio familiariter viuentes, intelle-  
xerunt ex eo, ipsum nihil in isto  
opusculo de dosibus, quod Papiæ  
antea excussum fuerat, pro suo  
agnoscere, ita ut inde occasionem  
sum-



sumpserit, libellum de hoc argu-  
mento conscribendi, quem postea  
Lugduni, sub patrocinio Episco-  
pi Montis Pessulani, edi curauit.  
Hunc, priori isto neglecto, & ipse  
tibi, candide Lector, offerre ma-  
lui, ut germana & γνήσια, non au-  
tem spurij fœtus ex nostra officina  
prodirent. Quis vero hic Run-  
dalitius sit, omnibus doctis consta-  
re scio. Plurimi profecto solo ip-  
sius nomine moti, in extremam il-  
lam Gallie oram ad ipsum audien-  
dum proficisci non verentur, sicut  
nec Galenum, nec eo priores, in  
Ægyptum piguit transcurrere,  
ut inde optimis literis onusti ad  
suos reuenterentur. Opus de pi-  
scibus



scibus à Randalitio editum non-  
ne authorem immortalitate dona-  
uit? Sed præterea si Anatomicum  
desideras, hic solertem dabit, in  
chirurgia summas apud omnes  
meretur laudes, in doctrina sim-  
plicium primarijs meritò annume-  
rari potest, in morbis denique om-  
nibus curandis neminem habet se-  
cundum, sicut testantur omnes nō  
nisi doctissimi quique ipsius disci-  
puli, & testabuntur alij quoq; qui  
æqui iudices esse volent. Pellæ ur-  
bis nomen obscurum semper man-  
sisset, nisi ipsa Alexandrum istum  
Regem, qui à rerum suarum ge-  
starum magnitudine non Ma-  
gnus sed Maximus dici merue-  
rat,



rat, genuisset: Ita & Montem  
Pessulanum Rundalitus, alum-  
nus gratissimus, apud omnes red-  
didit maxime insignem, alioquin  
perpetua nocte & silentio innolu-  
tum. Sed nescio quo fastidio mor-  
tales presentia bona prosequun-  
tur, & ut Poeta inquit,

Virtutem incolumem odimus,  
Sublatam ex oculis quærimus inuidi,

Quia fortassis oculi nostri splendo-  
re Virtutis excæcati, minus de-  
xtrè de ea indicantes, faciunt ut  
tandem in minori apud nos sit exi-  
stimatione. Sic quoq; nunc Run-  
dalitio sui non desunt æmuli, qui  
nomen ipsius calumnijs obscurare  
nituntur. Salva tamen semper  
Run-



Rundalitia sua durabit authori-  
tas, & illa, quam laboribus suis  
acquisuit & adhuc acquirit, im-  
marcescibilis gloria, cumque iu-  
dicium melius posteritatis erit, ut  
Poeta ait, ideo spero & doctam  
posteritatē huius Viri nomen gra-  
ta semper memoria celebraturam.  
Præter hoc novum Rundalitiij opu-  
sculum, offero tibi, candide Le-  
ctor, nunc & alia duo, antea nun-  
quam edita, & à Thoma filio Dy-  
ni conscripta, quorum primum  
de reductione Medicinarum ad  
actum, secundum verò de gradi-  
bus earundem, incundas & uti-  
les disputationes & dogmata in  
se comprehendunt, sicut melius  
ista



ista à te agnosci quàm à me descri-  
bi possunt. Habui autem illa ip-  
sa, a doctissimo iuvene Iulio Cæsa-  
re Romanello Monopolitano, qui  
non inuitus precibus meis, cum  
ab ipso hos libellos peterem, locum  
dedit. Spontè enim quoque in hoc  
unicum incumbit, & occasiones  
omnes sedulo inuestigat, ut sibi tan-  
dem fenestra de re literaria benè  
merendi aperiatur. Hunc ipsius  
generosum animum facile agno-  
scent omnes, partim ex his duo-  
bus opusculis, partim ex alijs plu-  
rimis, quæ aliquando ex sua biblio-  
theca humano generi communi-  
cabit, ut ita & erudita posteritas  
eū publica priuatis semper prepo-  
suis-



10  
fuisse grata cum laude sit celebra-  
tura. Hoc te celare nolui, ut scias  
quid ex officina Ioannis Baptista  
Turlini, Typographi Ticinensis,  
primum acceperis, & quid nunc  
ex mea tibi offeratur. Quod si hoc  
meum studium tibi gratum fuis-  
se, & me cum meis conatibus apud  
te gratiosum verè esse intellexero,

Munera te dicam magna dedisse mihi,

& sic facies, ut tuæ erga me be-  
nevolentia memor, optimos quosq;  
libellos tibi ex officina mea sim pro-  
laturus. Bene vale & me, ut  
omnes tui studiosos soles, amore  
complecti perge.




IOANNIS FRANCISCI

RIPENSIS IN LIBRUM

de ponderibus .

A D D. G. RONDALETIVM

Medicum præstantissimum.



**V**iderat æquoreis, magnus Neptunus in vndis  
Iura prius toto te posuisse freto :  
Squamigerumq; genus placidas duxisse per vndas  
( Quis putet ) ad patuli littora curua soli :  
Ut tua, fluminibus neglectis, iussa capebant :  
Atque petant nutu, nomina vera, tuo .  
Vnde pater tumidum, Neptunus, summus aquarum  
Iudicii captus dexteritate boni,  
Consortem pelagi, liquidæ te fecit & vndæ :  
Ingenii poterant hæc monumenta tui.  
Non satis hæc : iusta terrasque bilance gubernas,  
Dum monstras Medico pondera certa choro.  
Quanta Machaoniis essent discrimina rebus,  
Constaret numeris ni bene fulta suis .  
Hæc tibi quæ certam promittit planta salutem,  
Corpora neglecto pondere sana necat .  
Hanc partem medicæ retulisti primus in artem  
Tam bene præteritis non lucubrata viris .  
Ut non sollicitet præbentem pharmaca, ne 've  
Propositum fallat pendula libra bonum.

Hunc



Hunc vigili doctum relegit qui mente libellum,  
Et voluit facili nocte dieque manu:  
Ergo dum fluuiis Mugil veriatur in vndis,  
Astutus mediis & Melanurus aquis.  
Atque Astræa vagam librat dum pondere lancem,  
Seruet quo placidos, conterat atque reos.  
Inclyta florebit meritorum fama tuorum,  
Qua sol Eois splendet & Hesperiiis.

Hunc

MATTHAEI



# MATHEI CVRTII

## AD TYRVNCVLOS

dosandi methodus.



VPIENS dare Iuueni  
bus breuem practican-  
di modum, decreui ali-  
qua de modo dosandi  
dicere, circa quæ tria fa-  
ciam: Primo dicam de  
modo dosandi syrupos:  
Secundo dicam de dosi  
medicinarum simpliciũ  
solutiuarum & compo-  
sitarum: Tertio de ele-

ctuariis, clysteribus, & aliis ad actum practicũ facien-  
tibus. De syrups primo dico, quòd communiter Pra-  
ctici dant vnciam vnã & mediam syrup. & aqua-  
rum vnc. 3. in dupla scilicet proportionẽ ad syrupũ,  
quandoque tamen dant vsque ad vnc. 2. syrup. Nec  
me latet, quòd Gherard. de solo voluit, quòd dentur  
vnc. 4. syrupi, & vnc. 6. aquarum, & in hanc senten-  
tiam cõcurrit Matheus de gradibus super nono Almã  
foris, communis tamen sententia est, quòd dentur  
vncia vna & media syrup. & 3. aquarum; qui modus  
sumitur à Galeno primo Reg. acut. comment. 42.  
nec alibi reperitur. Concludamus ergo, quòd com-  
muniter Practici dant vnc. vnã & mediam,

B

vel



## Mathei Curtij

vel vnc. duas syrapi, & tres aquarum: & hoc habet veritatem, siue vnus, siue duo dentur syrapi, siue etiam tres: Nam quandoque habemus vnā intentionem, quandoque duas, quandoque tres. Exemplum primi, si intentio Medici fuerit alterare malam complexionem calidam dabit vnc. vnā & mediam syrapi endi. & vnc. tres aquæ endi. Exemplum secundi, si intentio Medici erit ad duo, v. g. ad remouendam malam complexionem calidam, & ad aperiendum, tunc ratione remotionis malę complexionis calidę dabimus syrup. de endi. cum aqua endi. ratione autem apertionis dabimus syrup. bisantinum cum aqua foeniculi, sic ordinando. Recipe syrup. de endi. vnc. vnā, syrapi bisantini vnc. mediam, aquarum endiuię vnc. duas, foeniculi vnc. vnā, misce & fac syrupum. Exemplum tertii, si intentio Medici fuerit ad tria, v. g. ad remouendam malam complexionem calidam, & ad aperiendum, & ad incidendum, tunc dabimus tres syrapos, scilicet de endiuiā ad remouendam malam complexionem calidam cum aqua endi, pro apertione bisantinum cum aqua foeniculi, pro incisione acetosum cum aqua acetosę, sic ordinando.

Recipe ( syrup. de endi.  
( syrup. bisantini an. vnc. mediam  
( syrup. acetosi.

( endiuię  
Aquarum ( foeniculi an. vnc. vnā.  
( acetosę.

Misce & fiat syrupus

Nota, quòd plurimum aqua proportionatur syrupo, aliquando tamen cogitur Medicus vt remoueat malam



malam complexionem calidam, vel frigidam syruporum exhibere aquas nō proportionatas syrupis, exempli gratia, si ordinauero syrupum de epithimo, vel de stecade, ordino cum istis syrupis aquam tendentem ad frigiditatem, vt puta, violarum, vel endi. vt remoueat mala complexio calida syruporum, licet aque non sint proportionatæ syrupis, quia syrupi sunt calidi, & aquæ frigida, ista tamen relinquuntur iudicio Medici. Notandum tamen est, quod sicut exemplum dedi de istis, possumus per alios syrupos, & per alias aquas discurrere secundum quod Medico videbitur. Notandum etiam, quod semper possumus ponere aquas cordiales in syrupis, vt confortetur virtus regitiua & vitalis, quæ residet in corde, sicut Rex in regno, vt est omnium illustriss. Medicorum sententia. Concludamus ergo, quod in ordinando syrupos, non debemus ordinare nisi vnciam vnam & mediam syrupi, vel vnc. duas ad plus, raro tamen, vel syruporum: & vnc. tres aquæ, vel aquarum, exempli gratia sic dicendo. Recipe syrupi de endiuiâ, syrupi acetosi, & mellis ros. col. an. vnc. med. aquarum endiuię, acetosę, absinthii an. vnc. vnam, misce & fiat syrup. pro vna vice, & sicut exemplificaui in istis syrupis & aquis, ita & de aliis.

Syrupi digerentes materiam cholicam.

Hepar.

Syrup. de endiuiâ, succo endiuię, cicorea.

Cor.

Syrup. de succo acetosę, de acetos. citri, de buglossa.

Pectus.

Syrup. violatus, iuiubinus, iuleb violatum.

Stomachum.

Syrup. nenupharinus, de portulaca, de mirto, iuiub

B 2

Mes.



## Mathei Curtij

Mes. rosatum, acetosus simp. de oxifacharo.

Caput.

Syrup. rosatus, de granatis, violatus, de papauere, nenupharinus, rosatus, de buglossa.

Aque digerentes materiam cholicam.

Hepar.

Aq. endiuiz, epaticæ, cucurbita, cuscute, cicoreæ solatri, plantaginis.

Cor.

Aq. acetosæ, buglossæ, boraginis, violarum, nenupharis rosarum, cicoreæ.

Caput.

Aq. lactucæ, nenupharis, sem. co. frig. papaueris rosarum.

Stomac.

Aq. acetosæ, rosarum, plantaginis.

Pectus.

Aq. violarum, portulacæ, de iuiubis, iuleb violatum, nenupharis sem. co. frig. buglossæ.

Syrupi digerentes materiã melancholicam.

Caput.

Syrup. de bisantiis, de lupulis, de stechade, de betonica

Hepar & Splen..

Syrup. de epithimio, de lupulis, de fumo terræ, de borag. buglossæ, de bisantiis, oximel simp. cōp. squil.

Cor.

Syrup. de pomi comp. de sapor, de sapa, de bisantitiis, de thymo, de epithimo, boraginis, buglossæ.

Stomachum.

Syrup. bisantinus.

Aque



## De Dofibus

3

Aquæ digerentes materiam melancholicam.

Hepar.

Aq. lupulorum, de fumo terræ, de bugloffa.

Splen.

Aq. scolopendriæ epithimi.

Cor.

Aq. boraginis, & bugloffæ.

Syrupi digerentes materiam flegmaticam.

Cerebrum.

Syrup. lupulorum, florum sambuci, geniftæ, de ftecha  
de, de duabus radicibus.

Stomac.

Syrup. de menta, mellis ros. col. oximel fimp. oximel  
comp. de abfinthio, squill.

Hepar.

Syrup. de duabus radicibus, de eupatorio, acetofus  
diarodon, acetofus compo.

Cor.

Syrup. byfantinus, de cortice citri, de pomis compo.  
de borag. de bugloffa, mel. ros. col. omnia oximelia

Pectus.

Syrup. de bifantitiis, de thimo, acetofus de prima rad.  
de liquiritia, de hyfopo, de calamento, de præssi  
oximel simplex, compo. squill.

Matrix.

Syrup. de matricaria, de artemisia.

Aquæ digerentes materiam phleg.

Stomac.

Aquæ abfinthii, mētæ, ruthæ, apii, camomillæ, feniculi.

B 3

Pectus



## Mathei Curtij

Pectus.

Aq. capillorum veneris, hyssopi, prasii, buglossæ.

Caput.

Aq. maioranæ, saluiæ, rorismarini, betonicæ.

Hepar.

Aq. prasii, scabiosæ, eupathorii, saluiæ, apii, foeniculi, absinthii.

Renes, & vesicam.

Aq. asparagorum, agrimonix.

Cor.

Aq. mellis, agrimonix, asparagi.

Matrix.

Aq. artemisix, pulegii, rutæ, matricariæ.

Digestiua sanguinis non ponuntur, quia sanguinis cum putrescit, transit in choleram. Satis ergo est potuisse digestiua aliorum humorum. Sunt tamen nonnullæ, quæ sanguinem purificant. vt

Aq. capillorum veneris, absinthii, lactuce, lupulorum, boraginis, lactis caprini, fumiterræ, buglossæ, succi rosarum, cicoreæ.

Medicinæ purgantes choleram.

Nunc principaliter dicamus de dosi medicinarum solutiuarum. Et primo de simplicibus, secundo de compositis. Medicinæ simpl. choleram soluentes, sunt rhabarbarum cal. & siccæ complexionis in secundo g. Cuius dosi in substantia apud communiter praticantes est drag. tres, vel drag. tres & med. cum spica, vel squinanto eius correctiuo. Exempli gratia. Recipe rhabarbari electi drag. tres, vel drag. tres & med. spicæ vel squinanti drag. vnam, puluerizentur

omnia



## De Dosibus

4

omnia subtiliter, & cum decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam. Notandum est, quod si velles dare hanc medicinam in fluxibus, debes facere hanc decoctionem in rebus stipticis, ut puta cum decoctione facta ex granis myrti, sumach, sem. plantaginis, acetosæ, mirabolanorum, in aqua plantaginis. Dosis rhabarbari in infusione est drag. sex vel septem cum eius correctione, ut, Recipe rhabarbari electi drag. sex vel septem, spicæ, vel squinanti m. vnum, contundantur omnia grosso modo, & infundantur per vii. horas in suff. q. vini odoriferi, deinde fiat omnium fortis expressio, & cum decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnam.

## De Manna.

Manna conueniens dosis, quæ complexionis æqualis est, plus tamen ad caliditatem declinans, est vnc. duæ, vel vnc. duæ & med. ut, Recipe mannæ electæ vnc. duas, vel vnc. duas & med. dissoluatur cum decoctione communi florum & fructuum, & fiat potus.

## De Casia.

Casia æqualis complexionis ad latus caliditatis declinantis humidaq; in primo dosis est, drag. xi. vel xii. ut, Recipe casia nouiter extractæ, bonæ & pinguis drag. xi. vel xii. dissoluantur cum decoctione florum & fructuum, & fiat potus: cui adde syrupi violati vnc. vnam: & si volueris dare eam in forma boli, sic ordinetur. Recipe casia nouiter extractæ drag. xi. vel xii. & cum zuccaro fiat bolus.

## De Scamonea.

Dosis scamonæ, quæ est calida & sicca in tertio est g. vii. vel viii.

B 4

De



## Mathei Curtij

### De Tamarindis.

Dosis tamarindorum, secundum Mesuem est ab vnc. ii. ad v. in infusione vel decoctione, vt, Recipe tamarindorum vnc. duas, infundantur in vnc. x. aquæ lactis, & bulliant ebullitione vna, & fricentur manibus, & exhibeantur, siue colata siue non, & eorum complexio est frigida & sicca in secundo.

### De Aloe.

Aloes cal. in secundo, sicca in tertio, dosis in substantia est drag. vna, in infusione autem drag. duæ.

### De succo Rosarum.

Dosis succi rosarum frig. in primo, sicci in secundo, vel in infusione ipsarum recentium, est ab vnc. vna vsque ad vnc. duas cum zuccaro: numero dosis est ab vnc. duabus vsque ad quinque.

Nunc dicamus de medicinis purgantibus & educen-  
tibus phlegma: & primo de Agarico, qui est calid.  
in primo, & sicca in secundo. Cuius dosis in substan-  
tia est dragma vna, vel vna & med. cum suo correcti-  
uo, scilicet cum tertia parte salis gemmæ scrupu. vno  
puluerizato & dissoluto cum decoctione florū & fru-  
ctuum & fiat potus, cui addatur mellis ros. col. vnc.  
vna. Dosis Agarici in infusione est à drag. vna &  
med. vsque ad duas, exempli gratia. Recipe Agarici  
drag. vnam & med. vel drag. duas, salis gemmæ scrupu.  
duos, puluerizentur & infundantur per septem ho-  
ras in suff. q. oximelis simp. deinde fiat omnium fortis  
expresio, & cum decoctione florum & fructuum fiat  
potus, cui adde mel. rosa. cola. vnc. mediam.

### De Turbit.

Dosis Turbit calid. in tertio, in substantia & in infu-  
sione est sicut Agarici, correctiuumque ipsius est in  
Zinziberis secunda pars.

De



## De Dofibus.

5

### De Coloquintide.

Dofis coloquintidis, quæ est calida & ficca in tertio est à kirach. vi. vsque ad decem, eius correctiuum, secundum Mesuem, est mastix.

### De Emblicis.

Emblicorum dosis in substantia est ab aureis duobus vsq; ad tres : in infusione verò à tribus vsq; ad sex, quorum cōplexio est parum frig. sicc. in primo ordine.

### De Bellericis.

Bellericorum dosis est sicut dosis emblicorum, & cidoniorum.

### De Euphorbio.

Euphorbii, quod est calid. & ficcum in secundo, dosis est, secundum Mesuem, à mirach. vno vsque ad tres, secundum alios autem à g. iiii. vsque ad xii. & corrigitur cum mastice, & spica.

### De Hermodaëtis.

Dosis hermodaëtiorum, quorum complexio est calida & ficca in primo, ad secundum est à drag. duab. vsque ad v. aut plus secundum fortitudinem patientis corrigitur cū aqua mellis, aut lactis, spica, aut mastice.

### De succo Cucumeris asinini.

Dosis succi cucumeris asinini, qui est calidus & fuscus in tertio, est à g. x. vsque ad scrupu. vnum, dosis pulueris eius radice est à gr. vsq; ad drag. iiii. corrigitur & preparatur adiungēdo ei aliquid de dragagāto.

### De Serapino.

Dosis serapini est à drag. med. vsque ad aureum, datur cum aqua rutæ, aut endiuivæ.

### De Opoponace.

Opoponacis, cuius complexio est calida & ficca in tertio, radix vero ipsius in secundo, dosis est ad drag. vnam vsque ad ii.

De



## Mathei Curtii

### De Mesereon.

Dosis ipsius, secundum Mesuem, est à drag. quinque; usque ad vnc. vnam, & in concoctionibus & pulueribus kirach ii. usque ad v. eius malicia frangitur infundendo per diem vnum in aceto, aut lacte dulci, aut acetoso. Extinguitur eius malicia cum malignitate sua, cum succo portulacæ, & propriè cum succo endiuie, secundum Mesuem cap. primo. Mirabolani etiam frangunt virtutem eius.

### Medicinæ purgantes melancholiam.

Nunc dicamus de medicinis soluentibus melancholiam, & primo de Mirabolanis Indis, quorum complexio frigida in primo, & sicca in secundo, quorum dosis in substantia est à drag. ii. usque ad iiii. in infusione vero à iiii. usque ad x. educunt melancholiam & chole-ram adustam.

### De lapide Lazuli.

Dosis lapidis Lazuli, seu stellati abluti est à drag. vna usque ad duas, corrigitur & præparatur super lapidem, vel in mortario lapideo teritur & lauatur trecies cum aqua, & sic similiter vtendo lauatur decies cum aqua rosata, & administretur cum aqua buglossæ, & vino odorifero: eius complexio calida est in secundo & sicca in tertio.

### De lapide Armeno.

Lapis armeni calid. in primo datur sicut lazuli, & ita præparatur & corrigitur.

### De Sena.

Dosis Senæ in infusione & potione est ab aureis iiii. usque ad drag. vnam, secundum Mesuem, in pluribus: secundum alios autem est à drag. duabus vsq; ad drag. quinque



quinque, corrigitur & præparatur, si addatur tantundem zinziberis, aut salis gemmæ, & sic administratur: datur cū aqua decoctionis florum boraginis, buglossæ, dañtilorum, macis, & cardamomi: & potest decoqui in magna quantitate cum brodio carniū, vel pulli absque trituratione, & brodium illud sine molestia operatur cum incidentibus & aperientibus, sicut cum seminibus foeniculi, anisorum, dauci, zinziberis, cinamomi, & gariofilorum: & quandoq; administratur cum aqua mellis, aut cum decoctione passularum. Estque Sena calid. in principio secundi, & sicca in primo: folia autem eius calida sunt in primo.

## De Epithimo.

Dosis Epithimi in puluere est à drag. tribus vsque ad drag. vii. potus eius in decoctione est à drag. v. ad x. sed non sumatur in quantitate, & parum sustinet decoctionem: corrigitur si addatur tertia pars salis gemmæ, vel salis Indi, & debet incorporari cum oleo amigdalino dulci, & quandoque administratur cum decoctione mirabolanorum, mellis, & passularum. Eius complexio calida est & sicca in secundo, secundum vero Gal. calid. est in tertio.

## De medicinis solutiuis compositis.

Restat videre modum de dosi medicinarum solutiuarum compositarum, pro quo primo est notandum, quòd in qualibet medicina solutiua debemus adhibere aliquid quod habeat vim confortandi cor, quia est sententia omnium illustrium Medicorum, præcipuè Mes. in correctione medicinarum cap. de debilitate stomachi post purgationem cap. decimo, can. tertio, inquit, Non prætermittas aliquo modo quin confortetur



## Mathei Curtii

tur cor, qui est thesaurus vitæ. Secundo nota, quòd quando volumus euacuare ab aliquo membro particulari, debemus euacuare cum illa medicina solutiua, quæ respicit illud membrum, vel debemus ponere cū medicina solutiua aliquid directiuum ad membrum, vt puta, si velimus euacuare à capite, debemus ponere in decoctione flores stechados arabici, & facere decoctionem in aqua capitali, vt est aqua bethonice, vel saluix: & sicut dico de capite, sic debet intelligi de alijs membris. Terrio nota, quòd solutiue compositz sunt in duplici doctrina, nam quædam sunt lenitiuæ & vacuant leniendo, quædā fortes & educunt attrahēdo, & ista attrahētia sunt fortiora, vt inferius declarabimus.

### De medicinis lenientibus.

Diaprunis non solutiuis valet in materia cholerica, manna, & casia: similiter in materia cholerica, quanuis & in alijs, & ista sunt simplicia elect. de sebesten, diacatholicon, diacassia, hæc valēt in oī materia.

### De solutiuis compositis choleræ.

Diaphenicon, electuarium de succo rosarum, elect. rosa. Mes. Diacidonium chologogum, electuarium de psilio, diaprunis solut. diarosa. cum rab. elect. de elescoph, elect. Indum, diarosa. cum turbith.

### De solutiuis compo. melancholiam.

Confectio hamech, puluis senæ præparata, diasenæ Nico. Quarto nota, quòd in conficiendo medicinam solutiua, semper debes ponere lenitium suum, sicut  
est



## De Dosibus.

7

est sententia Io. Mes. de compilatione medicinarum cap. 1. Inquit .n. lenitas nempe medicinis associata, & propriè violentarum virtutum ipsas ad latus inco-  
lunitatis declinare facit. Dos lenitiuarū est à drag. quatuor, vsq; ad drag. vi. & ponimus drag. quatuor, vel quatuor & med. ad plus solutiui fortis cum leniti-  
uo, exempli gratia. Si voluero ordinare medicinam euacuante[m] cholera[m], sic dicam, Recipe diacatholi-  
conis drag. v. diapheniconis drag. vnam, elect. de suc-  
co ros. drag. duas, electuari de psilo semi. drag. misce,  
& cum decoctione florum & fructuum facta in aqua  
endiuiæ & buglossæ fiat potus, cui adde syrupi violati  
vnc. vnam. Ecce quomodo ibi drag. v. lenitiui, &  
drag. tres & med. solutiui fortis adsunt, & virtus  
huius medicinæ dirigitur ad hepar, & respicit cor me-  
diante decoctione facta in aquis appropriatis. Si vo-  
luero euacuare materiam phlegmaticam, sic dicam.  
Recipe diacatholiconis drag. v. electuarii Ind. drag.  
duas, diapheniconis drag. vnam & med. misce, & cū  
decoctione florum & fructuum facta in aqua buglossæ  
& foeniculi fiat potus, cui adde mellis ros. col. vnc.  
med. Si autem intentio mea fuerit euacuare melan-  
cholia[m], sic dicam. Recipe diasenæ lenitiui drag. v.  
confectionis hamech drag. duas, diasenæ Nico. drag.  
vnam & med. misce, & cum decoctione florum & fru-  
ctuū facta in aqua scolopédriæ & buglossæ fiat potus,  
cui adde syrupi violati vnc. vnā: & sicut dico de his so-  
lutiuis, ita poteris facere medicinas ex aliis solutiuis.

De medicinis, quibus communiter Practi-  
cantes vtuntur.

Nunc intendimus ponere aliquas, quibus commu-  
niter



## Mathei Curtii

niter practi cantes vtuntur, & primo dicam de medici  
nis compositis choleram soluentibus.

### Potio Rhabarbari in infusione.

Recipe rhabarbari boni & electi scrupulos tres, spi  
cæ scrup. vnum, incidantur minutim & terantur, de  
inde infundantur per septem horas in suff. q. vini odo  
riferi in hyeme, in estate autem in aqua end. postea  
fiat fortis expressio, in qua dissolue diacatholiconis,  
vel mannæ, vel cassiæ drag. v. elect. de succo ros.  
drag. duas elect. de psilio drag. vnam, misce, & cum  
decoctione florum & fructuum facta in aqua buglossæ  
& endiuix fiat potus, cui adde syrupi violati vnc. vnā.

### Potio Rhabarbari in substantia.

Recipe Rhabarbari drag. duas, spicæ scrup. vnum  
& med. puluerizentur subtiliter, quibus adde diaca  
tholiconis, aut alterius lenitiui drag. v. confectionis  
de dactilis elect. de succo ros. an. scrup. duos, & cum  
decoctione florum & fructuum fiat potus, cui adde  
syrupi violati vnciam vnam.

### Potio alia Rhabarbari in cura dissenterix.

Recipe corticum mirabolanorum citrinorum leni  
ter tostorum drag. rres, terantur grosso modo, & cū  
vnc. viii. aquæ plantaginis fiat decoctio vsque ad con  
sumptionem medietatis, in qua dissolue rhabarbari  
torrefacti & puluerizati dragmas duas, squinanti  
scrup. vnum & med. misce cidoniorum vnc. vnam,  
& fiat potus.

Potio



## Potio alia Rhabarbari in cura diffenteria.

Recipe corticum mirabolanorum citrinorum chebulorum an. vnc. vnam & med. terantur groſſo modo, & cum vnc. viii. aquæ plantaginis fiat decoctio vſque ad conſumptionem medietatis, in qua diſſolue rhabarbari torrefacti & puluerizati drag. duas, ſquinti ſcrup. vnum, miue cidoniorum ſacharatę vnc. vnam, & fiat potus.

## Potio Mirabolanorum in infuſione.

Recipe mirabolanorum citrinorum drag. quatuor, ſpicæ ſcrup. med. puluerizentur & infundantur per ſex horas in vnc. vna & med. decoctionis paſſularum, deinde fiat fortis expreſſio, in qua diſſolue elect. de ſucco roſ. vel diaprunis ſolutiui drag. tres, caſſiæ electæ vel manni drag. ſex cum decoctione florum & fructuum in ſero caprino fiat potus, cui adde ſyrupi violati vnciam vnam.

## Potio Mirabolanorum in ſubſtantia.

Recipe mirabolanorum citrinorum drag. duas, ſpicæ g. v. torrefiant aliquantulum ſuper laminam fereā calidam, & ſubtiliter puluerizentur, & cum vino cidoniorum, vel ſyrup. mirtino ad vnc. ii. & aqua plantaginis quantum ſufficit fiat potus.

## Potio familiaris &amp; vſitata.

Recipe caſſiæ nouiter extractæ, vel manni, vel diaprunis non ſolutiui drag. ſex, elect. de ſucco roſ. vel  
dia-



diaprunis solu. drag. iiii. & med. & cum decoctione florum & fructuū fiat potus, cui adde sirupi violati vnc. i.

Potio alia vsitata.

Recipe Rhubarbari electi drag. vnam, spicæ scrup. vnum, puluerizentur grosso modo & infundantur per septem horas in suff. q. aquæ endi. in estate, in hyeme vero in vino odorifero albo. Item recipe agarici electi drag. vnam, salis gemmæ scrup. vnum, puluerizentur grosso modo, & infundantur per septem horas in suff. q. oximelis simplicis, deinde fiat omnium fortis expressio, in qua dissolue mannæ electæ vnc. vnam, confect. de dactylis, elect. de succo ros. an. drag. vnam, misce & fiat potus, cui adde sirupi violati vnc. vnam.

De medicinis compositis soluentibus phlegma.

Nunc dicamus de medicinis compositis soluentibus phlegma, & prius de Agarico in substantia. Recipe Agarici albi, leuis, & frangibilis drag. vnam, salis gemmæ, zinziberis an. scrup. med. quibus adde mannæ, vel diacatholiconis drag. v. electua. Indi, misce, & cum decoctione florum & fructuum & passularum facta in aqua melissæ & foeniculi fiat potus, cui adde mellis rosati collati vnc. vnam.

Potio Agarici in infusione.

Recipe Agarici scrup. iiii. zinziberis, salis gemmæ an. scrup. med. puluerizentur in suff. q. vini albi odoriferi, vel oximelitis simplicis, vel aliqua aqua ex digestiuis phlegmatis, deinde fiat fortis expressio, in qua  
dissolue



dissolue cassiæ electæ, vel mannæ, vel alicuius alterius electuarii lenitiui drag. v. electuarii Indi drag. ii. & cum decoctione florum & fructuum facta in aqua mellis & fœniculi fiat potus, cui adde mellis rosati collati vnciam vnam.

## Potio Turbith in infusione.

Recipe Turbith boni, mundati, & mediocriter triti scrup. iiii. zinzib. scrup. elect. Indi scrup. ii. vel ii. & med. terantur & infundantur per horas viii. in suff. q. vini albi odoriferi, vel in decoctione passularum, vel in aliqua ex aquis digestiuis phlegmatis, deinde fiat fortis expressio, in qua dissolue cassiæ nouiter extractæ, vel mannæ, vel alterius lenitiui drag. v. electuarii Indi drag. ii. misce, & cum decoctione prædicta fiat potus, cui adde mellis ros. collati vnc. vnam.

## De medicinis cōpositis melancholiā soluētibus.

Recipe cassiæ nouiter extractæ vnc. vnam, confectionis hamech drag. iii. misce, & cum saccharo fiat bolus.

## Alia potio.

Recipe diacatholicorum, vel diasenæ lenitiui drag. xi. diasenæ Nico. drag. iii. & med. misce, & cum decoctione florum & fructuum epithimi, folliculorum senæ facta in aqua boraginis fiat potus, cui adde sirupi violati vnc. vnam. Et nota, quod medicina in forma boli potest fieri in quacunque materia siue cholericæ, siue phlegmaticæ cū lenitiuis & solutiuis appropriatis. Nota, quod dosis lenitiui & solutiui potest aliquando

C

augere,



## Mathei Curtii

augere & diminui, secundum fortitudinem & debilitatem tam ægrotantis, quàm medicinæ .

### De Pilulis .

Restat iam dicendum de Pilulis. Dosis pilularum, secundum communiter Practicantes, est drag. vna, & plus vel minus, secundum materiam simplicium ingredientium ipsas, & secundum fortitudinem & debilitatem morbi, & virtutem patientis, quia aliquando acuius ipsarum virtutem cum diagridio, vt, Recipe pilularum aggregatiuarum scrup. ii. diagridii g. ii. bene puluerizati, misce, & fac pilul. numero v. vel plus, vel minus, secundum fortitudinem & virtutem, vt supra, relinquitur autem hoc periti Medici.

### Pilulæ choleram euacuantes .

#### A capite.

Pilulæ Aureæ Mes. siue quibus Nic. Arabicæ Mes.

#### Ab epathæ.

De Rhabarbaro Mes.

#### A toto.

Aggregatiuæ .

### Pilulæ euacuantes phlegma.

#### A capite.

De hiera cum agarico, siue hiera Nico. Cocchie Almanso. De hiera simp. Gal. Feridæ Nic. & Mes. siue quibus Nic. De opoponace Mes. De euphorbio Mes. Arabicæ Nico. Assaiareth Bar. Mô.

#### A pectore.



## De Dosibus.

10

A Pectore.

De Agarico Mes. Agaricus trociscatus.

A Stomacho.

Elephanginæ Mes. De Mastice Mes. Stomaticæ Mes.

De Mastice Cono.

A iuncturis.

De hermodacti. Mes. De serapino Mes. Arteticæ Nic.

Ab hydrope.

Alletereon.

Ab oculis.

Lucis Mes.

De pilulis euacuantibus melancholiam.

Ab hepate, & splene.

Indæ Mes. De fumo terræ. De lapide lazuli. De lapide Armeno.

Nota, quòd si non habuero præparatas pilulas ab aliquo membro euacuâtes, accipiam pilulas ab aliquo membro euacuantibus cum aliquo directiuo ad illud membrum, à quo vellem euacuare. Nota item, quòd pilulæ, quæ dantur ad minorationem materiæ, debent dari in minori dosi, quam dantur ad eradicationem, vnde cum dantur ad eradicationem datur drag. i. sufficit autem ad minorationem scrupu. duos.

De medicinis non solutiuis.

Nunc tria principaliter dicamus de dosi medicinarum non solutiuarum: & primo de elect. & confect. & etiam de aliis sequentibus. Electuarium differt à cōfect. nam electuarium fit ex saccharo, vel melle, aut

C 2

syrupo



## Mathei Curtij

syropo : confectio verò fit ex saccharo solum dissolutum in aliqua aqua : dicitur electuarium quasi ex pluribus electum : confectio autem quasi cum aliis factio vel compositio. Nota diligenter, quòd in compositione electuariorum pro qualibet lib. zucha. vel mellis, aut syrup. antiquitus ponere solebant drag. iii. pulueris : nunc autem Aromatarii pro qualibet libr. zuccha. vel mellis, vel syrupi, ponunt in electuariis vnc. ii. pulueris, & hoc faciunt vt electuaria sint magis gustui delectabilia. In confectionibus solidis Aromatarii nostri temporis pro lib. zuccha. in confectionibus drag. vi. pulueris, ita quòd pro drag. i. pulueris dant vnc. ii. zucchari. Antiquitus verò solebant in lib. zucchari ponere drag. iii. pulueris, exempli gratia, Si voluero ordinare electuarium secundum antiquos, sic dicam. Recipe specierum aromatici ros. specierum diarodonis abbatis an. vnc. med zucchari dissoluti in aqua ros. lib. vnam, fit cōfectio solida in rotulis. Exemplum secundum Aromatarios nostri temporis. Recipe specierum aromatici rosarum, specierum diarodonis abbatis an. vnc. iiii. zucchari dissoluti in aqua ros. fiat confectio in forma solida in rotulis. Nota insuper, quòd dosis communis electuariorum est à drag. iii. ad drag. iiii. sequendo de elect. non solutiuis. Dosis verò communis confectionis nō solu. est à drag. quattuor ad drag. quinque, & plus & minus secundum diuersas relationes. Nota etiam, quòd electuaria & cōfectiones non solut. debent dari ante cibum per duas horas, & hoc est consuetudo apud Practicantes : & hoc habet veritatem de elect. confortantibus stomachum : electuaria verò confortantia caput debent exhiberi post coenam per horam ad quantitatem fabæ. Restat modo videre de electuariis, & confectionibus appropriatis



## De Dosibus. II

tis vnicuique membro particulari.

### Electuaria calida confortantia caput.

Pliris aromaticon, Aurea Alexandrina, Theriaca fermentata, Mitridatum, Diaconis, Dialibanus.

Diacastoreum, Diarrhodon, Zuccharum viol. Theodorinum, Confect. anacardina, Confectio de musco, Diambra, Acori conditi, Zuccharum rosatum, Loch de papauere, Cõseruam florum nenu. Chebuli cõditi.

### Electuaria calefacientia Splenem.

Diacalamentum, Conseruæ saluiæ, Conseruæ florum stechados.

Loch de squilla, Dialisophos, Dianthos.

Conseruæ florum rorismarini, Loch sanum & expertum, Loch de pulmone vulpis.

### Electuaria calefacientia Cor.

Electuarium de gemmis, Confectio de xiloaloes, Aromaticum muscatum.

Gallia muscata, Diamargariton, Confectio de musco, Electuarium lætificans, Confectio de cino.

Cortices citri conditi, Dianthum seu Dianthos, Cõditum de buglossa, Cõserua buglossæ, elect. de pomis.

### Electuaria calefacientia Stomachum.

Theriaca fermentata, Diaciminum, Diamuscum, Rosata nouella.

Diazinziber, Diatrio pipereõ, Mitridatũ, Diagalaga

C 3 Aroma-



## Mathei Curtii

Aromaticum rosatum, Aromaticum nardinum,  
Zinziber conditum.

Electuaria calefacientia Hepar.

Diaciminum, Diacalamentum, Diacinamomum,  
Diacostum.

Electuaria calefacientia Matricem.

Diacalamérú, Trifera magna, Cōfectio de acetosis.  
Confectio de xiloaloe, Diambra, Electuariū ducis.  
Diacinamomum, Electuarium dulce.

Electuaria calefacientia Iuncturas.

Confectio anacardina, Conserua rorismarini, Con  
serua florum stichados.

Diacorus, Acori conditi.

Diazinziber, Conserua saluix.

Electuaria infrigidantia pectus.

Zuccharum violatum, Diagragentum frigidum.

Loch de fursure simplic. Diapapauer.

Diapenidion sine speciebus calidis.

Electuaria infrigidantia Cor.

Zuccharum rosatum, Triasandali, Manus crist.

Diagalanga, Diacurcuma, Diabuglossatnm.

Diarrhodon abbatis, Confectio de acetosis,  
Dialacca.

Electua-



## De Dosibus.

12

### Electuaria infrigidantia Hepar.

Zuccharum rosatum, Triasandali.  
Trifera magna, Zuccharum violatum.  
Diacoston, Diacoppon.

### Electuaria infrigidantia Splenem.

Triasandali, Zuccharum violatum, Zuccharum rosatum.

Conseruæ florum stichados, Diarrhodon.

### Electuaria infrigidantia Stomachum.

Zuccharum rosatum, Zuccharum violatum.  
Diarrhodon descriptione communi, Diacitonion  
sine speciebus.

### Electuaria infrigidantia Iuncturas.

Diarrhodon, Succum rosatum.  
Zuccharum violatum, Triasandali.

## De Trociscis.

Restat modo videre de Trociscis: est autem Trociscus rotunda compositio cum quadam depressione ad similitudinem magni lupini, communis dosis trociscorum præter eos, qui oppiati sunt, est à drag. vna & media, vsque ad drag. ii. licet sit melius non transcendere vi. Trocisci autem aptissimi non debent exhiberi ultra quantitatem scrup. vnius, aut drag. med. Medicina sub forma trociscorum diutius conseruatur,

C 4

quàm



## Mathēi Curtij

quā sub forma pilularum, aut electuorum, aut cōfectionum, aut coctionum: exempli gratia, si voluerō ordinare compositionem vnam trociscorum, sic dicam. Recipe mastice cinamomi electi, garioflorum, coriandrorum præparatorum, calami aromatici an. drag. med. fiant trocisci cum syru. de mentha, vel cum aliqua aqua appropriata intentionem Medici, dummodo pondus vnius trocisci non excedat drag. med. & debent exsiccare in umbra. Vnde si voluerō ordinare pilulas, sic dicam. Recipe trociscorum supra ordinatorum drag. vnam, puluerizentur, & cum zuccharo dissoluantur in aqua menthæ, aut in aliqua alia secundum intentionem, & fiat confectio in rotulis trium dragmarum pro qualibet, similiter dicā de decoctionibus.

### De clysteribus.

Restat modo videre de clysteribus, multiplex autē est clystere, quodam lenitium, quod fit in febribus calidis, vt, Recipe florum maluæ, blitis, violarum, mercurialis, hordei an. m. med. fiat decoctio in suff. q. aquæ ad consumptionem tertiæ partis, deinde fiat colatura, de qua accipe libr. vnam, cassiæ nouiter extractæ, zucchari rubri an. vnc. vnam, olei violati vnc. quattuor, vitelli oui nu. i. salis drag. iii. fiat clystere, vel enema. Quoddam est clystere lauatiuum, quod fit hoc modo. Recipe aquæ hordei, vel brodii pulli, in quo decoctum, sit hordei libr. vna, zucchari rubri vnc. i. & med. vitelli oui num. i. fiat clystere sine sale & sine oleo, & fiat post exhibitionem medicinæ solutiue scammonate. Quoddam fit clystere partim lauatiuum, & partim solutiuum, vt. Recipe florum maluæ, cammomillæ an. manip. med. fiat decoctio in suff. q. aquæ, de qua accipe  
lib.



lib. vnam cassiæ nouiter extractæ, hieræ picræ, zucchari rubri an. vnc. med. olei camomelini, aut violati vnc. quatuor, salis drag. iii. vitelli oui nu. i. misce & fac clystere, vel sic Recipe brodii pulli, in quo sit camomilla decocta lib. vna cassiæ, hieræ pigræ, vel benedictæ, zucchari rubri an. vnc. med. mellis rosati col. vnc. ii. olei camomelini, vel violati vnc. iii. salis drag. iii. vitelli oui nu. i. misce, & fac clystere: & hæc duo enemata conueniunt febribus calidis, vbi sit aliqua materia phlegmatica, ventosa, & biliosa.

Quoddam est clystere constrictiuum, vt Recipe rosarum rubearum balaustiorum, hordei torrefacti, granorum myrti an. manip. med. contundantur, & bulliant in suff. q. aquæ cum castrati donec caput sit coctū. Deinde fiat colatura, de qua sumat lib. i. boli armeni, sanguinis draconis an. scrup. i. olei rosa. omphacini vnc. ii. pinguedinis renum caprarum vnc. i. misce, & fiat enema cum vitello vnus oui assati dissoluti in brodio dicto, & istud enema conuenit in fluxu maxime diuretico: possunt etiam consimilia clysteria multiplicari secundum intentionem Medici.

Quoddam est clystere carminantium forte, vt, Recipe rerum carminantium an. manip. med. fiat decoctio in suff. quantitate aquæ vsq; ad consumptionem tertiæ partis: deinde fiat colatura, de qua recipe lib. vnam benedictæ, zucchari rubri an. vnc. i. mellis ros. col. vnc. ii. olei de lilio vel ruthæ vnc. iii. salis drag. iii. misce, & fiat enema: si autem volueris facere fortius, potes addere drag. ii. vel drag. iii. olei de baccis lauri, & istud clystere conuenit in dolore forti à materia frigida.

Quoddam est clystere fortissimum fortissime resoluens materiam phlegmaticam, & competit paralysi,

apo



## Mathei Curtii

apoplexiæ, vt Recipe centauri minoris vtriusque sal  
uiæ, abrotani, calamenti, origani an. m. med. anisi, ro-  
rismarini, sebesten, seminis basiliconis maioris an. vnc.  
med. florum stichados arabici vnc. vnam, pulpæ co-  
loquintidos drag. ii. mellis anacardini, olei de casto-  
reo an. quartam medietatem salis gemmæ drag. i. hic  
re picræ, ellebori albi an. drag. vi. bulliant omnia, præ-  
ter hieram picram in decem libr. aquæ vsque ad con-  
sumptionem medietatis, coletur, & colaturæ suman-  
tur v. partes, & addatur hieræ picræ, & iniiciatur. Est  
enim efficax, proprium, & vltimum. Est aliud clyste-  
re commune in quacunq; dispositione leui apud mulie-  
res, vt, Recipe brodii carniū, vel decoctionis mat.  
violarum, hordei lib. i. zucchini rubri vnc. i. & med.  
vitelli oui numero vno, olei violati vnc. iii. salis drag.  
iii. misce, & fiat enema commune. Notandum tamen  
est, quòd enema potest variari & multiplicari secundū  
varias Medicorum intentiones: sed nota, quòd soluti-  
ua, quæ ingrediuntur enemata fortia in secunda, sunt  
doctrina: quædam enim sunt solutiua simplicia, quæ-  
dam sunt solutiua compositiua: simplicia sunt vt tur-  
bith, sal. gemmæ, coloquintidis agaricus, & ista ponun-  
tur in decoctione enematum in dosi duarum dragma-  
rum, sal. gemmæ ponitur in quantitate dragm. vna.  
Composita sunt, diaphenicon, hiera picra, hiera lo-  
godion, electuarium de baccis lauri, benedicta,  
electuarium elefscoph, electuarium Indum. De istis  
possumus ponere vnciam vnam, aliquando plus, ali-  
quando minus, secundum quòd placet Medico. Appa-  
ret igitur dosi clysteriorum, decoctio enim cōmunis  
est vnc. xii. Possumus tamen ascendere ad vnc. xvi.  
solutiua simplicia, quæ ponuntur in decoctione, non de-  
bent transcendere drag. iii. Solutiua autem compositi-  
ta



## De Dosibus.

14

ta debent poni ab vnc. med. ad vnc. vnam & mediam, aliquando ad vnc. duas: oleum debet esse vnc. iii. sal debet esse drag. iii. & hæc de dosi clysteriorum.

## De Epithematibus.

Epithema est medicina composita ex aquis destillatis speciebus, quæ mediante panno lineo, vel laneo applicatur membro infuso in aquis prædictis. Vnde licet Epithema possit cuilibet membro applicari, tamen communiter tribus applicatur membris, cordi, hepati, & renibus. Dosis epithematum quantum ad aquas communiter est vnc. xii. Dosis verò specierum communiter est drag. vna & med. licet aliquando Practicantes plus ponant, exempli gratia, Si voluero ordinare Epithema cordiale, sic dicam. Recipe aquæ ros. bu glossæ, melissæ, acetosæ an. vnc. iii. pulueris pro epithemate cordiali drag. vnam & med. vel drag. ii. croci parum, vini maluatici vnc. i. misce, & fiat epithema pro corde. Pro hepate sic dicam. Recipe aquarum ros. endiu. hepaticæ, solatri an. vnc. iii. sandali rubri drag. vnam & med. vel drag. ii. aceti vnc. vnam, misce, & fiat epithema pro hepate. Et nota, quod idē epithema potest applicari renibus, & sic apparet dosis epithematum.

## De Vnguentis.

Vnguentum est, quod ex oleo, vel oleis, pulueribus & modico ceræ, vel gummi perficitur. Et sciendum, quod pro qualibet vnc. olei, vel succi, debemus ponere dragmam vnam pulueris, vel ad plus drag. vnam & med. cum modico ceræ. Nota tamen, quod vnguentum potest habere triplicem formam, nam quoddam est



## Mathei Curtij

est molle, quoddam mediocre, quoddam grossum. Vnde si voluero ordinare vnguentum sic dicam. Recipe olei de absinthio, nardini, olei de mentha an. vnc. vnam, pulueris gariofilorum, masticis, calami aromatici an. drag. i. ceræ parum, & fiat vnguentum molle, vel ceræ parum, & fiat vnguentum mediocre, vel ceræ quantum sufficit, & fiat vnguentum grossum. Notandum est etiam, quod vnguentum potest fieri cum gummis, vt puta cum armoniaco serapino, sic dicendo. Recipe olei de mentha, olei nardini, olei de absinthio an. vnciam i. pulueris gariofilorum, masticis, menthæ an. vnc. vnam, armoniaci serapini dissoluti in aceto an. q. sufficit, fiat vnguentū, & sic patet dosis vnguentorū.

### De Cerotis.

Cerotum est medicina dura, quæ applicatur membro fortiter adherens, vnde differt ab vnguento, quia vnguentum fit cum cera, & fit cerotum cum resina. Notandum est, quod sicuti pro qualibet vnc. olei, vel alterius liquoris damus drag. i. pulueris conficiendo vnguentum: ita etiam conficiendo cerotum, exempli gratia, si voluero ordinare cerotum, sic dicam. Recipe olei cidoniorum decoctorum, de mentha an. vnc. i. gariofilorum, masticis an. drag. i. resinę quantum sufficit, & fiat cerotum. Notandum est etiam, quod cerotum est multiplex, nam quoddam est cerebrale, & fit in formæ orbiculari, quoddam est stomachale, quod fit in forma triangulari, quoddam est epaticum, quod fit in forma lunæ, vt hæc figura ( quoddam est splenericum, quod etiam fit in forma rotunda, vel, vt quidam dicunt, in forma quadrata. Notandum insuper est, quod ista se habent per ordinem vnguētum, cerotum, &



## De Dosibus.

15

& emplastrum: nam cerotum fortioris oppositionis est, quàm vnguentum: & emplastrum fortioris oppositionis est, quàm cerotum. vnde Medicus debet primum ordinare vnguentem, deinde cerotum, postea emplastrum: & sic gradatim à debilioribus ad fortiora ascendere.

## De Emplastris.

Emplastrum est medicina ex multis composita & confecta, quæ aut bullierint, aut contuse fuerint, & secundum propria corpora super membro posita, & in sua substantia. Notandum, quòd primo Medicus volens ordinare emplastrum, non debet puluerizare ingredientia sicut est radix altheæ, camomille, melliloti: sed ista debet decoqui ad spissitudinem, deinde contundi, quibus contusis debet addi oleum, vel pinguedo conueniens. Notandum secundo, quòd Medicus volens ordinare emplastrum, pro quolibet m. herbarum, vel radicum, debet ponere vnc. vnā & med. olei, vel alterius liquoris, vt butiri, pinguedinis gallinæ, anatis, anseris, porci, & reliqua, exempli gratia. Recipe florum camomillæ, melliloti, sem. aneti an. m. medium, bulliant in aqua ad spissitudinem, deinde contundantur, & cum oleo de camomilla, de aneto, de lilio an. vnciam vnā fiat emplastrum: & sicut dico de oleis, possum etiam dicere de butiro, & de pinguedinibus supradictis.

## De Embrocatione & Fomentis.

Embrocatio est casus aquæ ab alto, in qua bullierint herbæ supra membrum læsum, & quilibet m. herbæ



## Mathei Curtii

bæ vult lib. i. aquæ, & debent decoqui ad consumptionem medietatis, deinde fiat colatura, & postea embrocatio. Ita etiam possemus dicere de Fomentatione, sed fomentatio fit cum spongia madefacta, aut filtro madefacto in prædicta decoctione loco patienti applicata. Et sic Deo duce imponimus huic tractatui finem.

### MATHEI CVRTII SENTENTIA,

An partus ante septimum Mensem  
editus, vitalis esse possit, vel ne.

**D**Vo proponuntur nobis dubia determinanda. Primum de puella 170. die ab hora conceptionis nata, an possit esse vitalis. Alterum an licet omnino vitalis non sit, possit aliquo certo tempore viuere. Pro quibus dissoluendis dicam, in primis apud omnes tam recetiores, quam vetustiores receptum esse, quod annus sit tempus peregrinationis integræ Solis in circulo signifero, ac trecentum sexaginta quinque dies, & horas sex contineat. Annum quoque in Menses duodecim secari, Græci, Aegyptii, Hebræi, Athenienses, Macedones, Cyprii, Bithinii, Cappadoces, & Romani fatentur: licet menses variis nominibus appellentur. Menses aliquando ratione Lunæ dicuntur lunares, interdum ratione Solis nomen accipiunt, solaresque dicuntur. Mensis lunaris est tempus ab vno Solis & Lunæ concursu ad alium, qui dies 29. & horas 12. continet. De quo Gal. 3. de diebus decretoriis non longe à principio sic ait. Quod autem menstruum tempus non omnino triginta diebus cōstet, sed vnius diei ferè dimidio minus Hipp. integro vno libro demonstravit.

Quin



Quin & vulgus propè vniuersum nouit mēsem alium, quem Græci κηλλόν nominant, quasi mutilum & imperfectum 29. dies obtinere, alium nempè absolutum 30. Nam vniuersos duorum mensium dies 59. esse oportet. Siquidem vterque omnino trigiuta minus altera diei parte: Quemadmodum igitur annum integrum Sol absoluit. Ita Luna mentem. Idem voluit Gal. primo de morbis vulgaribus com. 2. Sic habens, vt verè Palestini computant 12. menses, efficiunt dies numero tricenos quinquagenos quaternos. Nam cū tempus à Lunæ cum Sole coniunctione vsque ad aliā quauis coniunctionem supra dies 29. alium præterea diem dimidium assumat: idcirco duos menses continentes quinquaginta nouem dies in partes diuidunt inæquales, atque alterum dierum 30. faciunt, alterum 29. Mensem quoque esse communem amborum, Solis scilicet, & Lunæ circuitum. Dixit Aristo. 4. de generatione animali cap. vlt. quòd est tempus ab vno Solis & Lunæ concursu ad alterum. Mensis igitur lunaris, de quo antiquiores Aristotele & Galeno loquuti sunt 29. dies & dimidium continet: id quod ab Hippocrate lib. de septimestri partu clarè dicitur, quando quinque menses dies centum quadraginta septem, & dimidium alterius diei continere dixit. Dixitque dies 59. duos menses perficere. Huncque lunarem mensem exquisitè, siue exactè mensem appellat Gal. 3. de diebus decretoriis versus finem. Mensis vero solaris est totius anni pars duodecima, siquidem apud omnes annus duodecim mensibus constat, & diebus tercentum sexaginta quinque integrum annum facientibus, sex horis additis, quorum pars duodecima triginta dies excedit. Duodecies namque triginta, tercentum sexaginta faciunt. Quia si ex duodecim mensibus, quinque  
vnum



unum supra triginta dies contineant, & septem triginta tantum totus annus absoluetur, præter horas sex: unde singulis quattuor annis cogimur diem facere intercalarem, siue interpositum. Apud nos verò annum diducimus in menses duodecim, septem unum supra triginta dies continent, quattuor triginta tantum, & quia ad absoluendum tercentum sexaginta quinque, viginti octo dies deerant, mensis vnus 28. obtinuit: alii verò vetustiores menses annum integrantes, vel 30. vel unum supra 30. dies continere volunt: exceptis Paletinis, annum ex 12. mensibus lunaribus constituentibus, qui tercentum quinquaginta quatuor dies faciunt: & quia ad absoluendum tercentum sexaginta quinque dies, & horas sex, defunt dies vndecim, & horæ sex, sicuti cogimur nos singulis quattuor annis diem intercalarem facere: ita coguntur ipsi singulis viginti octo mensibus intercalarem mensem facere: ita vt in octo annis tres menses faciāt intercalares. Et proinde Gal. 1. de morbis vulgaribus de mensibus annum integran-  
tibus, quos solares appellamus: dixit non esse computandos pro Lunæ ratione, sed pro ratione Solis, cum inquit. Cæterum non sunt pro ratione Lunæ menses computandi, quòd iam multis Græciæ ciuitatibus est solène, sed pro ratione Solis apud omnes antiquiores, & nationes quàmplures nenerantur, subiungit quomodo Romani vniuersum annum in menses 12. diducunt, subinde quomodo Palestini, cuius verba superius posita sunt. Postea de Palestinis & eos sequentibus loquens, ait, quare quibus hæc est ratio, mesium aliquem facere intercalarem coguntur, vt præteritorum annorum reliqua cumulent, & tēpus fiat vnus mensis &c. & licet apud Palestinos, & Græcos tempore Galeni omnes lunaribus mensibus constitueretur, & tercentum



tum quinquaginta quatuor diebus absolueretur: apud  
tamen antiquiores, Hippo. scilicet, & multas nationes  
id non obseruabatur: Quum itaque Hippo. & Arist.  
locuti sunt de mense lunari 29. dies & dimidium alte-  
rius diei continente, & de mense solari 30. & plus ob-  
tinente, dubitari poterat de illa conclusionem, quod na-  
tus citius septimo mense vitalis esse non possit: an de  
lunari, an de solari mense intelligerent. Remouet hanc  
dubitationem Hippo. in tractatu de Septimestri partu,  
in primis verbis dicens. Septimo mense natum eum in-  
telligere, qui ultra centum octuaginta duos dies natus  
sit, nec non & ultra anni medietatem, quæ sex mensi-  
bus solaribus absoluitur: est autem anni medietas dies  
182. & horæ quindecim, & proinde de mensibus luna-  
ribus non esse conclusionem intelligendam: sex enim  
mensures lunares 177. dies præcise continent, & si con-  
clusio de mensibus lunaribus intelligeretur, posset na-  
tus die centesimo septuagesimo octauo vitalis esse; id  
quod Hippo. non admittit. Nos autem sumus in casu  
longè clariore, quia puella de qua quæritur, cum nata  
sit die centesimo septuagesimo, siue sententia Hippo.  
dicta, & Arist. 7. de historia animalium cap. 4. de men-  
se lunari, siue solari intelligatur, puella vitalis esse non  
potest, quæ citius 7. mense tam lunari, quam solari na-  
ta sit. Nec ignoro præter dictum mensem lunarem  
Gal. 3. de diebus decretoriis ponere alios duos men-  
ses lunares, vnum integræ peragratiōis Lunæ in circu-  
lo signifero, qui dies 27. & horas octo continet. Alte-  
rum quo Luna manifestè illuminata in hæc agit infe-  
riora, qui diebus 27. vel 26. cum dimidio, secundum  
varios respectus constituuntur. Et si de his mensibus  
Hippo. & Arist. sententia intelligatur, poterit natus  
170. die dici natus 7. lunari mense, & sic vitalis esse:

D

ve-



## Mathei Curtij

verum hoc ad rem nihil facit, quoniam Gal. primus ad inuestigandam causam, cur dies decretorii ponendi sint, illos duos menses posuit, de quibus neque Hippo. neque Arist. nec alii Gal. vetustiores vnquam loquuti sunt, sicut neque de causa dierum criticorum quicquam dixerunt. Non igitur eorum sententia de illis mensibus, de quibus nihil loquuti sunt, intelligi potest. Restat igitur conclusio apud Hippo. & Gal. clarissima, quod puella centesimo septuagesimo die ab hora conceptionis nata, vitalis esse non possit. Id quod alio fundamento diduci potest. Hipp. in tract. de alimentis 2. de morb. vulg. sectione 3. in 6. de morb. vulg. sectione 8. vult tria tempora in foetu considerata, primum formationis, secundum motus in vtero, tertium partus, quum tempori formationis additur duplum ipsius, fit tempus motus, quum verò id duplum, quod additur, triplicatur: tunc totum tempus motus duplicatur, & fit tempus partus. Quemadmodum si foetus 35. diebus, formatur 70. additis erunt centum quinque, & tunc incipiet foetus in vtero moueri: septuaginta verò triplicatis, aut centum quinque duplicatis, erunt dies ducentum decem, & septem menses integri ac tempus partus. Dixit Hippo. foetum formari 35. diebus, 40. & 45. citius diebus 35. non posuit. Auic. 2. 3. cap. 2. minimum tempus formationis masculi dixit esse 30. dies, & minus tempus partus medietatem anni. Foetus autem formatus trigesimo die, nonagesimo mouebitur, citius centesimo octuagesimo nasci non poterit. Quare puella, de qua dubitatur, vitalis esse non poterit, quum citius centesimo octuagesimo die nata sit, opus esse iuxta regulam hanc eam esse formatam citius triginta diebus. Nunquam autem visus est abortus ante trigessimum diem perfectè formatus,

vt



vt habetur ab Aristo. 7. de histo. animal. cap. 3. & 4. degenerat animal. cap. 6. Ad id accedit, quòd puella tardius in vtero quàm masculus formatur. Obiiciet fortè aliquis dicta Hippo. esse verificanda, vt in pluribus. Tamen si absolutè, & tanquam semper vera probata sint, vt clarè habetur à Gale. 7. de diebus decretoriis cap. vlt. & clarius 6. part. aphorif. 58. illa igitur conclusio, quòd natus citius 7. mense non poterit esse vitalis, verificabitur vt in pluribus, & aliquando raro poterit oppositum contingere. Nihil autem prohibet illud rarò contingens in casu nostro verificari. Item Hippo. & Arist. nullam afferunt rationem demonstratiuam ad conclusionem illam probandam, sed tantum quod longo vsu viderunt, asseuerant, ac si dicerent, nunquam visum citius 7. mense natum viuere, igitur natus citius 7. mense viuere non potest. Qui modus nihil concludere videtur, sicut priusquam morbus Gallicus accideret, non sequebatur, nunquam visum est aliquem morbo Gallico laborasse: igitur morbus Gallicus euenire non potest. Dicendum est Hippo. summas in aphorismis, licet non tanquam semper vere dictæ sint, verificari tamen vt plurimum id, quod clarè dicit Gal. locis adductis in libro de septimestri partu, & in aliis, quibus non aphoristicè, sed longiori sermone procedit, aliter tenendum est. Ratio enim diuersitatis est, quia sententiæ aphoristicæ breuissimo sermone sunt explicandæ. Ideo Hipp. in aphorismis non curauit id, quod vt plurimum, ab eo quod semper euenit discernere. In aliis autem libris, & præcipuè in de septimestri partu clarè distinxit, cum nanq; dixisset partum viuere natum 7. mense, & ex consequenti citius natum viuere non posse: subiunxit, quod licet nati mense septimo viuere possint, vt plurimum tamen moriuntur.



## Mathei Curtij

tur. Ideo debuisset dicere Hippo. de natis citius 7. mense, si aliqui nati citius 7. mense viuere possent, sensus itaq; Hipp. est, quod natus 7. mense viuere possit, licet eo tempore nati vt plurimum moriatur. Ad aliud quod obiicitur, respondetur, in Philosophia & Medicina multa esse, quæ solo experimento sciri possunt, nec ratione demonstratiua probari valent, sicut quod omne rhabarbarum bilem trahendi vim obtinet, magnes ferrum, quod omnis ignis calidus sit. Hæc enim scita sunt, sed non alia via, nisi quia semper videmus, & experti sumus ita esse. Nunquam enim vidimus ignem non calidum: Rhabarbarum, quod vim bilem purgandi non haberet: Nec magnetem, qui ferrum non attrahat. Non enim ratione probare valemus ignem calidum esse, magnetem ferrum attrahere, sed id tantum sensu & experimento concludimus, quod aut de morbo gallico dicitur, nihil ad rem facit, quia in his, quæ à casu fiunt, vt morbi, & his quæ ab arte, apertè concedimus aliquid de nouo fieri posse, & videri quod nunquā factum sit, & nunquam fuit. Quis enim dubitat monstrum fieri posse, quod nunquam fuit, & medicinam aliquam compositam ex variis simplicibus fieri, quæ nunquam fuit? quoniam tales compositiones infinitis modis variari possunt: secus autem dicendum est in rebus, quæ fiunt à natura, si vnquam dari posset ignis non calidus, aliquando talis visus esset, & si dari posset magnes sine virtute attractiua ferri, aliquando id experientia deprehendere licuisset, pari modo si fieri posset naturaliter, vt natus citius 7. mense viueret: iam quandoque istud experientia compertum fuisset: propositio namq; vniuersalis inductiuæ in omnibus suis singularibus, cuius oppositum non valet intellectus ratione concludere, pro principio certissimo tenenda est, sicut quod



quod omnis ignis calidus sit, & quod natus citius septimo mense viuere nō possit. Nunquam enim vidimus ignem non calidum, nec intellectus ratione concludere potest, ipsum viuere posse. Igitur tenendæ sunt eæ duę propositiones certissimæ, & tantam certitudinem habebimus, quod natus citius 7. mense, non uiuat, sicut quod omnis ignis sit calidus, vel quod omnis magnes ferrū attrahat, vel quod oē rhabarbarum bilē purget.

Quod ad secundum dubium attinet Hippo. 3. part. apho. 12. in anni quadam constitutione dixit. Mulieres, quibus partus ad ver inest, ex quacunque occasione abortiuntur. Quæ verò pariēt, imbecilles & morbosos pariunt infantes, qua re vel statim intereunt, vel tenues, & valetudinarii viuunt: contra, distinguit Hippoc. abortum à partu, adeò vt quæ abortiunt, non pariant, & quæ pariunt non abortiant, vt abortus sit intēpestius partus, non tamen sit absolutus partus, sicut homo mortuus non est homo. Idem habetur 5. part. aphorif. 54. Gal. vero 15. de usu part. cap. 7. vult partum esse, imò foetus adeo perfectus est, vt ab utero prodiens per os nutrirī valeat. Quando verò nondum in tantam deuenit perfectionem, non partus, sed abortus erit. Quare qui intempestiuē, siue abortiuū ex utero prodeunt, non nutriuntur, nec viuunt, & proinde dixit Aristo. citius 7. mense prodiens, nullo modo viuere potest, si nullo modo constat, quod non per dies, cū nutrirī non valeat. Qui vero in partu viui in lucem eduntur, & debiles admodum sunt, dicit Hipp. vel breui moriuntur, vel tenues & valetudinarii viuunt. Neque vitæ terminus certē dici potest, quoniam secundū quod natus imbecillior, aut minus imbecillis fuerit, ita longiori aut breuiori tempore viuere poterit. Quod verò abortiri, ex utero intempestiuē prodire, non nutrirī,



## Mathei Curtii

triri, non viuere posse se inuicem consequantur, ostenditur ex Gal. qui part. 5. aphorif. 30. 33. 36. 37. 43. 52. 54. id quod Hipp. aborsum dicit, ipse foetus corruptio nem interpretatur, ita vt velit in omni aborsu foetum corumpi, & interire.

Ex his concludendum puto, quòd puella vigesima- sexta Octobris 1539. proximè præteriti circa horam quartam noctis concepta, & die tertiadecima Aprilis anni 1540. hora 14. nata, non potuerit per dies viue- re, & si vixerit, necesse sit fateri, quòd citius concepta fuerit, siquidem citius centesimo octuagesimo secundo die ex vtero prodiens, nec nutrirì, nec viuere possit. Dat. Bononiæ die VIII. Maii M D XL.

## M A T H E I C V R T I I

Ticinensis, Medici Excellentissimi,

De Febrium curatione.

**F**ebbris calor est, non res calida, octauo de Ing. primo & nono eiusdem xiiii. auctus & in igneū mutatus primo Apho. xvi. nō ex duobus compositus: cuius ratio colligi potest 1. Apho. xiiii. siccitati coniun- ctus, 1. Aphor. xvi. 1. regim. acut. xviii. & xii. & ix. de Ing. xiiii. in corde accensus, 1. de diff. Feb. iii. & per totum corpus transmissus viii. de Ing. in principio, 1. de Accid. v. nisi impediatur, sicut est in Epiala ii. de dif- feren. feb. vi. & in Liparia in lib. de inæq. int. lædens operationes, nedum naturales, sed etiam motiuas, quia hoc cuilibet conuenit ægritudini, in lib. Artis medi- cinalis lxxxii. non enim æger est, nisi decumbat 1. de dieb. criticis vi. vnde dicitur viii. de Ing. 1. quòd im- pedit ægrum, & per eam vehementer tristatur. Quæ qui-



quidem caliditas debet esse perseverans, 1. de differē. feb. iii. non sicut caliditas irę & laboris, quando adhuc nō est impressa caliditas in facto esse in corde. Debet enim caliditas febrilis ponere in calefacto esse partem aliquam cordis. Omnis namque morbus debet esse in facto esse, secundo de accidentibus tertio. Hęc autem si salubris sit, quatuor vniuersalia tempora debet habere, sicut de omni morbo dicitur in de vniuersalibus morborum temporibus, verum est, quod aliquam potest habere imperceptionem, quod si sit insalubris, declinationem non habet 2. de Crisi. v. & ix. Ista autem quatuor tempora sunt principium, augmentum, status, & declinatio, & possunt attendi penes digestionem. Et est principium quando apparent signa occultę digestionis: augmentum quando manifestę: status quando completę: declinatio quando fit expulsio, sicut patet primo de Crisibus xvii. & xviii. Penes essentiam vero & accidentia quando incipiunt est principium: quando augentur est augmentum: quando in maximo sunt vigore est status 1. de Crisibus iii. quando declinat, est declinatio. Tempora autem ista coincidunt in morbis reseruantibus, non aut in non reseruantibus iii. regim. acut. vltimo, in non reseruantibus enim tempora quoad essentiam & accidentia, præcedunt tempora quoad digestionem, & sicut sunt quatuor tempora vniuersalia, ita etiam quatuor tempora particularia in illis, quę habent paroxysmos: verum est quod secundū Gal. in de temporibus paroxysmorum possunt fieri sex, numerando totum circuitum, cum in febricitatione, si in principio sit quō pulsus. Nam est principium inæqualitas, augmentum, status, & declinatio, & in febricitatio. Quod si sub augmento ponatur inæqualitas, & nō numeretur in febricitatio, erunt tantum quatuor, sicut



uniuersalia, quod non fit, quia realiter principium ab augmento non distinguatur, & sic sunt tantum tria non numerando in febricitationem, sicut est in illis, quæ ad ipsam non terminantur. Hæc autem à Galeno in lib. de quatuor temporibus paroxysmorum. Cognoscuntur autem tempora ex natura morbi 1. Aphor. xii. 1. de Crisib. ix. ex dispositione materie peccantis, 2. de diff. feb. 8. tempore anni, 2. Apho. xxv. ex anticipatione 1. Apho. 12. primo de Crisibus iii. ex euacuatione, 1. Epid. in commento primi infirmi. In febres autem incurrunt ex causis extrinsecis calefacientibus, maxime in ephemeram, & magis sunt parati cholericis 8. de ingeniis 7. & 8. infrequentius tamen sunt febricitantes sanguinei, quia magis incurrunt putridas, viii. de Ing. 7. & ferè æque similiter in ephemeram, sicut cholericis. Sic Auic. prima quarti cap. de preparatione ad febres præponit corpora calida & humida. Quoniam autem si debet esse febris calor in facto esse inductus esse debet, & quoniam ut dicitur vi. Epid. part. vi. cap. 8. in nobis membra sunt in triplici differentia, scilicet solida, quæ contentia appellantur, humores qui dicuntur contenta liquida, & spiritus, quidem contenta mobilia appellantur: Ideo sunt tres species febris diuersificatæ, secundum subiectum positum in calefacto esse, 1. de diff. feb. 1. licet enim calor in febre debeat esse in toto, tamen sufficit quod in facto esse sit in vna parte cordis, & toto ei correspondente. Si ergo sit in spiritibus, dicitur ephamera: si in humoribus, putrida: si in solidis sit, hectica: dicitur autem quando est in humoribus, putrida, quia humores omnes quando in eis est calor febrilis, putrescunt, excepto aliquando sanguine, sed habet naturam ephemerarum, ix. de Ing. 1. variæ aliæ dantur febris diuisiones ab Hipp. vi. Epid. part. vi. tex. 16.

& à



& à Gal. 1. de diff. feb. 1. Sed istam diuisionem sumptam à Gal. à materia accipiemus, & penes ipsam omnium febrium, secundum mentem Hippo. & Gal. curationes explicabimus. Ab ephemeræ igitur curatione exordiamur.

## De Febre ephemerâ, &amp; eius curatione.

Ephemerâ febris, est calor in spiritibus impressus in calefacto esse, sicut primo de diff. feb. attestatur Gale. quæ si non committatur error, de se vnum diem nō pertransit, tertio de Ing. in principio, & x. eiusdem secundo de causis procatarcticis sit primo de diff. feb. 3. & 2. de Crisi. vltimo. In ipsam incurrere parati sunt, qui complexionis sunt calidæ, & siccæ, s. de Ing. 8. Cognoscuntur autem ephemeræ ex istis signis, primo q̄ sunt à causa procatarctica, secundo q̄ habent ferè urinas similes sanis, & digestas, tertio q̄ pulsus in declinatione sit similis sano, quarto q̄ calor sit suavis ad tactum, quinto q̄ in statu non sint sæua accidentia, sexto q̄ in declinatione appareat quædam irroratio ex superfuitatibus tertiæ digestionis. Et hæc omnia colliguntur à Gal. in primo art. curatiuæ ad Glauco. 2. & secundo de Crisi. vltimo, & primo de diff. feb. septimo & octauo de Ing. quarto.

In eius curatione sic est procedendum, quando principaliter in febribus à tribus indicationem sumamus, à causa morbi, à morbo, quæ de sui remotione indicât, & à virtute, quæ de sui cōseruatione, ut ostēdit Gale. 10. de Ing. 1. Parū de curatione eius curamus cū salubris sit, & omnibus nota, quæ & facile tolli potest, pariter et de virtute, quia ea est salubris, & virtutē nō proster nit. Ideo omnis cura ferè ab ipsa febre sumitur, sicuti  
deci



## Mathei Curtii

decimo de Ing. primo dicit Gal. Quum autem febris, vt febris, sit calida & sicca, sicut primo de regim. acut. 18. 43. & primo Apho. 16. dicit, & quum omnis cura fiat per contrarium 8. de Ing. primo, ideo de infrigidatione, & humectatione indicat, vt de Ing. 14. In hac cura quum principaliter infrigidare, & humectare intendamus. Aer ipse, à quo indicatio sumitur nono de Ing. 14. ostendit, quatum infrigidare debemus vel humectare. Si enim ipse calidus & siccus sit, maiori indigemus humectatione, & frigidatione, sin minus, minori. Quare si ipse calidus sit, debet ad frigiditatem alterari, nono de Ing. 14. Alterato igitur aere ad frigiditatem & humiditatem, si talis non sit, est eligenda domus, quæ talis sit: & Gal. dicit, q̄ debet esse subterranea, & versa ad septentrionem, aspersa cum rebus frigidis, vt rosis, camphora, & similibus: debemus respicere quæ eius causæ fuerint, quæ de sui remotione indicant, decimo de Ing. 2. quæ quidē causæ diuersæ, quomodo possunt cognosci, ostendit Gal. & in primo ad Glauco. 2. & secundo de Crisi. vlti. Si ergo fuerit in causa, Tristitia, debemus curare vt stent læti, si nimium Exercitium, debent quiescere, si Vigilia, debent dormire, & sic omnes causas debemus remouere per sua contraria, sicut octauo de Ing. tertio ostendit Gal. Remota causa (quod facile fieri potest, quum sit procacitica, nisi sit oppilatio vel bubo, quum sæpenumero ista febris in hecticam vel putridam transeat, nisi curetur, vt in prima quarti tract. 1. cap. 5. refert Auic.) ipsi febris est attendendum: Hæc sunt ingenia, quibus vtimur in omni ephamera, sicut septimo Apho. 43. colligere possumus, verum vt dicit Paul. lib. 2. cap. 16. debemus variare & applicare, secundum q̄ à diuersis procedit causis. Nā aliquando in principio cōueniunt, vt si exustio  
ne



ne facta sit, aliquando in declinatione, tamen & facta digestionem ut in catarrho ponitur, aliquando maiori aqua est leuandum, aliquando minori, aliquando magis in vna mansione balnei, aliquando magis in alia debet stare, quas mansiones & virtutes x. de Ing. xi. enumerat Gal. unde sicut aliquando, secundum quod maiori humectatione, vel instauratione, vel sudore indigemus plus, vel minus: potest modo in vna, modo in alia sede stare æger. Sed quoniam nostris temporibus ordinata balnea non habemus, debemus facere ut melius possumus in domibus ordinare, nec ea in Ephemeris (in quibus præsentaneum sunt remedium) dimittere, sicut in primo art. cur. ad Glauc. cap. 2. Præterea post balneum, est inunctio, quam in primo ad Glau. laudat Gal. oleum autem non debet esse frigidum, quia ut patet tertio reg. acut. 42. constipat, & sic esset periculum conversionis in putridam, sed debet esse tepidum, & miscere cum aqua tepida. Sic enim, ut dicitur secundo de Simp. 24. maiorem facit humectationem, & quoniam intentio omnis est resoluendi illos spiritus incensos, laudant Doctores frictiones, quæ diuersæ sunt, ut secundo de tuend. sani. patet, & secundum quod diuersæ diuersos habent effectus, semper tamen aliquo modo conueniunt, sic ergo balnea, frictiones, unctiones, omnibus conueniunt ephemeris. Ultima intentio est de cibo & potu, Gal. primo de diff. feb. ad Glauc. secundo laudat vinum in omni ephemera, & in 8. de Ing. tertio modo fit pauciferum, sic enim magis excretionem expellit: si ergo febris sit in corpore calido & sicco, & cum illis conditionibus, quas enumerat Gal. 8. de Ing. secundo, tunc in principio debemus dare panem maceratum in vino, sicut ibi fecit Gal. quod si non sit tale accidens, prius est balneandus, post dandus cibus primo art. cura. ad Glauco.



## Mathei Curtii

Glauco. secundo : cibi autem, qui conueniunt, sunt primo ptisana, alica cum pauco aceti, non crassa, pisces saxatiles, q̄ si illos habere non possis, sumendi sunt illi maxime qui non sunt in lacu, vel in oribus fluminum. Item perdices, passerēs, pulli gallinacei, phasiani, pulli columborum, & alios possumus dare cibos, quos enumerat Gal. 8. de Ing. secundo. Panis quoque conuenit in furno coctus : dicit ibi Gal. & sic possumus vti his cibis, & dare magis & minus, secundum diuersas causas vnde si sit ex nimio labore, vel inedia, est dandum tantum cibi quantum potest digerere, si ex bubone, parū, si ab aliis causis, est dandus cibus mediocriter, q̄ si fiat ex obstructione, tunc dicit Gal. 8. de Ing. secundo, oportet primo vti phlebotomia, aliter alia remedia essent vana, q̄ si videamus dicit Auic. in cap. 23. q̄ sit potius oppilatio propter crassitiem materiæ, quam propter multitudinem, sic est melius vti aperientibus & incidētibz, sicut dicit Gal. ex oxymelite, & possumus miscere aliquas herbas, vt calamēthum, & pulegium, nisi sit timor nimix caliditatis, & debemus vti semper cibis aperientibus, sic enim curando ephemeram, dicit Gal. primo ad Glau. 2. remanet post 24. horas æger in totū liber cum omnibus dispositionibus sanis, & sic prohibemus, q̄ fiat interpolata putrida, quia in infebricitatione non sunt ægri in totum similes sanis. Hæc sunt, quæ conueniunt communiter omnibus ephemeris, quæ autem conueniunt singulis speciebus, vide apud Auic. hæc sunt procura ephemeræ secundum Galenum, quæ omnia etiam refert Auic.

### De Febribus putridis.

Quatuor sunt in nobis humores, qui sua multitudi-  
ne,



ne, vel crasfitiæ, oppilationem in corpore nostro faciētes, prohibent caloris naturalis transpirationem, quo non transpirante calor noster fit extraneus, eo autem extraneo existente humorem magis aptum putredini, putrefacit: humor autem putrefactus febrem, quæ putrida dicitur, generat. xi. de Ing. 8. sine oppilatione. n. non fit febris putrida, 1. de diff. feb. tertio, nisi præcedat ephamera, vel per attractionem aeris putridi. In his namque casibus potest fieri putrida etiam non præcedēte oppilatione. Isti ergo humores non excitant febrē, nisi putrescant, 2. de diff. feb. 8. excepto sanguine x. de Ing. 3. Quum autem putrescunt vel intra venas, vel extra putrescunt: si intra, faciunt continuas 2. de Crisi. 12. & 2. de diff. feb. vlti. si extra, faciunt interpolatas, 2. de diff. feb. xi. & si intra, venas putrescunt, vel sunt in venis magis propinquis cordi, & faciunt continuas, si ne manifestis excrescentiis, vel in venis parvis remotis à corde, & sic faciunt continuas cum manifestis excrescentiis, 2. de diff. feb. vlt. q. si extra venas, vel est cholera, & sic faciunt tertianā: vel est phlegma, & sic quotidianam: vel est melancholia, & sic quartanam, 2. de diff. feb. 2. Sanguis non putrescit extra venas, solum intra venas, 2. de diff. feb. 9. Sed non facit febrem purā secundo de Crisi. 12. sic. s. quod tantum appareāt signa sanguinis, sed apparent etiam signa cholerae, 2. de diff. febr. 9. Isti quoque humores, vel sic putrescunt, q. tātum vnius humoris signa apparent, & sic fiunt febres puræ, vel apparent signa duorum humorum, & dicuntur nothæ, vel compositæ secundo de Crisi. 12. Accessiones tolluntur, secundum q. per partem post partem materia acceditur & expellitur, sicut patet in exemplo de stercore columbino, 2. de diff. feb. 5. vel secundum q. aggregatur tanta materia, vt possit stimulare virtutem



## Mathei Curtij

tem expulsiuam, 2. de diff. feb. vlt. hinc est, quoniam cholera hæc potest facere de tertio in tertium phlegma, quotidie melancholia, de quarto in quartum: hinc est q̄ febris à cholera est tertiana, à phlegmate est quotidianiana, à melancholia quartana. Variantur autem paroxyismi, & fiunt maiores vel minores, secundum materiæ dispositionem, & virtutum naturalium fortitudinem, vel debilitatem, 2. de diff. feb. xi. Hæ sunt omnes species febrium putridarum, quarum cum rationes explicaturus, à cholericis, & inter cholericas ab interpolatis, & primo à purâ exordiar.

### De tertiana pura, & eius curatione, & in fine de tertiana continua.

Tertiana pura, quæ ex cholera fit extra venas putrescente, 2. de diff. feb. 2. & vlti. per membra sensibilia delata, 2. de diff. feb. 3. quando eius signa tantum apparent non alterius humoris, 2. de Crisib. 12. & de febre tertio in tertium affligit. Primo ad Glauc. cap. de signis febrium intermittentium, cognoscitur, quoniam septem periodos non transit, quarto Apho. 59. inuadit magno cum rigore, cum punctura rei calidæ, non cum magno frigore: terminatur per sudorem, vel per vomitum bilis, vel per vtrunque, calorem habet plurimū & acrem cum siti magna in principio, quæ post sit mitis 12. horas, non transit eius accessio ad perfectam terminatur in febricitationem, pulsus in inuasiōe habet tardos, debiles, paruos, ac raros: nec aliam habent inæqualitatem, nisi quæ communiter est in omnibus febribus, & tandem in statu habet magnos, calidos, vehementes, veloces, & frequentes sine inæqualitate. Tantum habet eum, qui sequitur omnes putridas, scilicet q̄  
sy-



syftole fit velocior diastole, vrina est subrubea, vel sub flaua. Aduenit autem in complexione calida & sicca, regione pariter & statu coeli calidis & siccis, in iuvene exercitato, quādo vigilauit, laborauit, tristatus est, multum cogitauit, & paucō vsus fuerit cibo. Hæc sunt signa, quæ omnia vel plurima tertianam puram sequuntur, sicut colligere possumus à Gal. primo ad Glauc. capite de signis feb. intermittentium 4. Apho. 59. secundo de diff. feb. 3. secundo de Crisi. 3. & hæc febris de se periculo vacat, 4. Apho. 42. Curando ergo tertianam puram sic debemus procedere.

Cū, vt dicit Galenus de constitutione artis medicinæ 13. & 14. in omni ægritudine debeat Medicus elicere intentiones curatiuas : secundo videre an illud fieri possit : tertio cum quibus instrumentis : Ideo primo oportet videre à quo sumantur indicationes curatiuæ in tertiana pura, & quoniam ipsa curari potest, quibus instrumentis vti debemus. Intentiones omnes curatiuæ summuntur à morbo, & à causa morbi, & à virtute, dicit Gal. 10. de Ing. primo virtus indicat de sui conseruatione, quæ fit cum similibus, 9. de Ing. 14. Morbus autem, & causa morbi de sui indicant remotione, 10. de Ing. primo Ceterum quando morbi, ac sui causa sæpe indicant de oppositis remediis : ideo videndum est à quibus primo est incipiendum. Gal. tertio de Ing. & 12. dicit, q̄ tria sunt, quæ indicant q̄ ab eis incipere debemus, scilicet illud quod habet rationem causæ, illud quod magis vrget, & illud sine quō non. Cæterū quoniam in tertiana pura, quum de se fit salubris, quarto Apho. 43. morbus ipse nec sua symptomata plurimum vrgeant, ideo ab ipsa causa ( sine cuius remotione non potest curari febris ) est incipiendum. Quum igitur visum sit à quibus sint sumendæ indicationes, à quibus



## Mathei Curtij

quibus (primo modo etiā supposito, quòd hoc sit possibile) reperienda sunt remedia, primo pro virtute cōseruanda, quæ sunt similia complexioni, ætati, & consuetudini, nono de Ing. 14. hæc quæ sint patebit, quoniam loquitur de rebus non naturalibus. Veniendum ergo est ad remedia, quæ conueniunt ratione causæ: Causa tertianæ puræ, est cholera, sicut patet secundo de diff. feb. vltimo, & secundo de Crisi. 3. & sic est materia: Materia autem in cunctis morbis quædā est putrefacta, quædam in putrefieri, vnde debemus educere eā, quæ est iam putrefacta, & curare ne alia putrescat, xi. de Ing. 9. Duo vero ingenia sunt magna, quibus educimus materiam peccantem, phlebotomia, & pharmacica, 2. Apho. 29. Quum ergo est intentio de phlebotomia, & pharmacica, à phlebotomia est incipiendum, sexto Epid. parti. 1. lib. 5. Cuius rationem reddebat Gale. in lib. de dignosc. affectibus renum, quia sic melius humores per pharmaciam possunt educi, & hoc faciebat Hippo. quarto regi. aut 19. & 28. hoc tamen est interdum non existente maxima humorum inæqualitate, sicut dicit Auic. quarta fen primi cap. 5. quia tunc est incipiendum à pharmacica, sicut faciebat Gal. quinto de Ing. 14. & hoc est, quia virtus in principio oppressa ab humorum cacochymia non constaret, supposito tamen q̃ in tertiana pura non sit ista magna inæqualitas, ab ipsa est incipienda phlebotomia. Quum igitur natura est aggrauata, tunc est fienda phlebotomia, sicut de omnibus putridis dicit Gale. xi. de Ing. 15. Dico quando natura est aggrauata, quoniam non credo, q̃ simpliciter in omni pauca putrida sit fienda phlebotomia, quod ostendunt verba Gal ibi quando dicit, vt natura deoneretur. Quum ergo natura est aggrauata, & æger transit 14. annos, quia prius non conuenit xi. de Ing.



Ing. 14. Quantitas autē sanguinis est sumenda à complexione, ab aeris statu, & regione, quæ enumerat Gale. xi. de Ing. 14. quod si omnia, quæ indicant de non mittendo sanguine, sint simul, nullo modo est fienda phlebotomia: q̃ si aliqua sic, aliqua non, magis & minus fienda secundum dispositionem illarum conditionum, non tamen est fienda vsq; ad syncopim, nec multū copiosa, vt relinquatur aliquid pro virtute, ex quo possumus vti remediis aliis, dicit ibi Gal. Quum igitur fienda est phlebotomia, primum est videndum, an sint pluri succi crudi, indigesti in stomacho, & intestinis, quia tunc non conuenit, 9. de Ing. quinto: illis ergo existentibus, sicut communiter modo fit, quia homines vtuntur inordinato regimine, & non habent beneficiū ventris, tunc primo est prætermittendus clyster cōmunis, vel illud, quo utebatur Gal. x. de Ing. 9. scilicet ex aqua, melle, & oleo, q̃ si etiam post clysterem, aliquid in stomacho remaneat, vel in intestinis superioribus, quia clyster non ascendit ad illas partes, 5. de Ing. xi. xiii de Ing. dist. 3. nono nisi per accidens sexto de accidentibus secundo, tunc quoniam illud quod est in illis partibus educitur per exhibita per os, quinto de Ing. xi. est danda medicina, quam vocant lenitiuam, & danda cassiæ vncia, vel duæ vnc. mannæ, q̃ si videmus, q̃ æger de se non facile soluitur, possumus addere stimulum, vt vnc. i. elect. rosati Melue, & hæc in principio conueniunt, quia non agitant: dare autem debemus talia lenitiua per aliquod tempus ante cibum, puta per horæ vnius dimidium, sicut colligere possumus 2. de alim. cap. de prunis. His igitur remediis, eductis materiis, existentibus in stomacho & in intestinis, stomacho non pleno, sed vacuo, primo regim. acut. 33. est fienda phlebotomia, post per horas duas dandus est cibus

E

cōue-



## Mathei Curtii

conueniens. Deonerata igitur natura per phlobotomiam, possumus vti leuiter prouocantibus sudorem, vrinam, vel vomitum, si natura tentet, vt quod putrefactum est, educatur, sicut facit Gal. secundo de Ing. 9. dando ptisanam, quæ hæc omnia potest facere, pariter mulsam, oxymelli decoctum, apii, & similia. Cæterū si ista non omnem materiam peccantem educere possunt, ad pharmaciam est veniendum. Sed quoniam raro est pharmacandum in principio, 1. Apho. 24. Sed digesta materia 1. Apho. 22. Imo nō apparente signo manifestæ concoctionis non est pharmacandum. Est ergo expectandum signum digestionis sic, q̄ materia appareat manifestè digesta, & hæc digestio fit à natura primo prognost. vltimo, & fit incrassando, secundo prognost. 33. & sic separando bonum à malo, quam tamē poterit etiā iuuare Medicus cum rebus roborantibus calorem naturalem, vt alterando & remouendo calorem præternaturalem, & confortando naturalem. Quum igitur signum manifestæ digestionis apparet, tunc leui aliquo pharmaco poterimus iam putrefactā & digestam materiam educere. Vnde Gal. 1. ad Glauconem de cura tertianæ puræ dabat absinthium cum melicrato, hoc etiā tempore laudat Gal. ibi balnea aquæ dulcis calida, quia aliquid educunt & alterant, quia humectant, & corpora refrigerant, q̄ si fortioribus vti volumus solutiuis, expectanda erit & perfecta materiæ digestio. Cæterum, quoniam vt dicit Hippo. secundo Apho. 9. corpora quum quis vult purgare, oportet fluida facere, & hoc ibi dicit Gal. fit aperiendo vias, & secando humores, & hæc digestio est, Medici, ideo oportet prius ipsam sic digerere materiā, & hoc fit cum rebus aperientibus & incidētibus: poterimus ergo dare decoctum ex apio, ex anetho, sicut in primo  
ad

ad Glauco-  
cundum ibi  
rum quoniam  
da est ma-  
de morbo  
ipsa indit  
dicit Gal  
ribus, quoniam  
miseret  
sumet  
cideret  
res, quoniam  
digeret  
ne feb  
licet  
mori  
cui  
remouet  
corqua  
morum  
mo ad  
mori  
tra pe  
mori  
qua  
eap  
cui  
cui  
cer  
i. ca  
rem  
ple  
in fia



ad Glauco. facit Gal. in cura tertianæ puræ, & post, secundum libitum, alias herbas poterimus miscere. Verum quoniam, vt dicit Gal. 10. de Ing. primo digerenda est materia, si possibile est, etiam habenda est cura de morbo, & quoniam ista febris indicatio sumpta ad ipsa indicat de maxime frigidis, vt in primo ad Glau. dicit Gal. in hac cura, ideo cum aperientibus & incidētib, quæ calida sunt primo Apho. 24. poterimus admiscere aliqua frigida, vnde si volumus facere syrupū, sumemus vnc. i. syrupi de endiuia, cum alio syrupo incidente, iungendo aquas, non tamen maxime incidentes, quoniam iste humor, quum de se sit subtilis non indiget maxima incisione, & eam debemus euitare ratione febris. Facta ergo digestionē materiæ, quando scilicet apparēt signa manifestæ digestionis, referatis humoribus, & apertis viis, tunc si natura materiam euacuat (perfectum enim est, quod quantum ad istam intentionem faciat Medicus, 1. Apho. 20.) quod si ipsam euacuationem tentet, & non perficiat: tunc sequendo motum materiæ, si sit per conuenientes regiones, primo Apho. 21. est euacuaudum. Si ergo ipsa tentet vomitum, vomitiua sunt exhibenda, si secessum, purgantia per secessum, q̄ si ipsa non tentet, licet bilis conuenienter educatur per vomitum, 4. Apho. quarto, tamē quia vomitus est motus præter naturam, melius erit eam educere per secessum, sicut etiam dicit Gal. in hac curatione. Medicamentum autem commodum in hac curatione est rhabarbarum, vt dando eius drag. i. scilicet in infusione, vel secundum diuersas intētiōes vnc. i. cassiæ & drag. ii. electuarii rosati Mesue: Debet autem dari tale medicamentum ieiuno stomacho, & completa digestionē, sicut dicit Paulus lib. vii. cap. vi. puta in summo mane, quo dato, si sit debilitas stomachi, vel



## Mathei Curtii

timeamus ne aliquid inhereat gulæ, danda est subito  
ptisana, secundo regim acut. 22. & in lib. quomodo, &  
quando purg. 9. licet forsan tale periculum non sit in  
istis medicamentis benedictis, q̄ si daremus fortiores  
medicinas, à quibus tamen quantum possumus, est ab-  
stinendum, sunt admiscendæ res odoriferæ, secundo re-  
gi. acut. xi. & in lib. quando purgare oportet, quando  
vero medicina incipit operari, tunc nihil est dandum,  
nisi completa operatione, secundo reg. acut. 12. imme-  
diate tantum debet dormire, vt melius medicina aētue-  
tur dicit Auic. quarta primi, cap. vltimo. Quum vero  
incipit operari, tunc amplius non est dormiendum, sed  
leuiter deambulandum, quarto Apho. 14. perfecta o-  
peratione cibandus est æger, secundo regim. acut. xiii.  
dum autem sit digestio leuibus clysteribus est vtendū,  
dicit Gal. primo ad Glau. cap. proprio, maxime si æger  
non habet beneficium ventris: his autē omnibus per-  
actis cum iunctionibus rarefacientibus, cum frictioni-  
bus, cum prouocantibus sudorem, & vrinam, poterim-  
us curare, vt excernantur etiam superfluitates tertiæ  
digestionis, & si aliqua pars materiæ restiterit, educa-  
tur, quia aliter quæ restarent, possunt facere reciduum  
secundo Apho. xii. & quoniam in istis febribus propter  
decursum flauæ bilis, sæpe patitur stomachus, ideo po-  
terimus vti confortantibus stomachum, vt speciebus  
diarrhodon abbatis. Hæc sunt instrumēta, quibus vti  
debemus indicatione sumpta à causa in hac ægritudi-  
ne. Quantum autem ad morbum, est affectus præter  
naturam, vt dicit Gal. in de symp. diff. primo: Omnis  
autem talis affectus indicat de sui remotione per sua  
contraria, octauo de Ing. 1. morbus iste est calidus &  
siccus primo regim. acut. 18. & 41. Imo indicat de re-  
bus frigidis, & humidis, 9. de Ing. 14. Et quoniam in  
isto



isto morbo est intensa caliditas, secundo de Crisib. 3.  
 & cura fit per contraria equalia in gradu tertio, techni  
 86. Ideo in eius cura uti debemus intense refrigeran-  
 tibus, & humectantibus, sicut dicit Gale. 1. ad Glauco.  
 de cura tertianæ puræ. Sed quo pateat quæ sint conue-  
 nientia in tali febre, percurrendum est per sex res non  
 naturales: Virtus autem de sui conseruatione indicat,  
 9. de Ing. 14. quæ conseruatur etiam cum debito regi-  
 mine sex rerum non naturalium: ideo pro complemen-  
 to curationis est deueniendum ad sex res non natura-  
 les. Sex sunt res, quas Medici non naturales appellât,  
 quæ si debite applicentur sanitatis causæ sunt, si indebi-  
 te ægritudinis. Quarum qualitas, & quantitas, & tē-  
 pus in quo conueniunt, oportet Medicum considerare,  
 sicut dicit Gal. in lib. artis medicinalis octauo: harum  
 autem primus est aer, ut dicit Gale. nono de Ing. 14.  
 quum semper nobis occurrat, nec vlllo pacto ipsum cui  
 tare possumus, & est vnus de illis, à quo sumuntur indi-  
 cationes curatiuæ: ideo maximam curam de ipso ha-  
 bere oportet: quum igitur in egroto illam intempe-  
 riam tollere intēdamus quod fit per contrarium, ut di-  
 cit Gal. in lib. de artis med. 86. & affectus iste fit cali-  
 dus & siccus: Vnde debet declinare aer versus frigi-  
 dum & humidum. Si ergo naturaliter fit talis, debe-  
 mus illum eligere, q̄ si non habemus sic, ut communi-  
 ter est, quando fiunt istæ febres, debemus ipsum artifi-  
 cialiter facere, & hoc fit, ut dicit ibi Gal. eligendo do-  
 mos subterraneas versus septentrionem, & spargendo  
 eas cum rebus frigidis & humidis, sicut cum rosis, cam-  
 phora, & similibus: & tamen debemus aduertere ne  
 ille aer occurrat toti corpori immediate, quia sic au-  
 geret oppilationem, & per consequens febrem, sicut  
 dicit Gal. decimo de Ing. 8. Secūdo est motus & quies  
 E 3 quū



## Mathei Curtij

quum motus sit causa caloris secundo Cœli 42. & in de morb caus. secundo, ideo his maxime intendimus euitare motum, ideo laudatur quies, potest tamē æger leui vti exercitio, ventre vacuo maxime in die meliori vt excernātur superflua tertiæ digestionis. Tertio est somnus & vigilia, quoniam somnus maximè facit ad digestionem, referente Arist. in de somno & vigi. Imo debemus curare, vt æger dormiat, quia ista ægritudo de se reddit hominem vigilem: debemus tamen curare ne dormiat in principio paroxysmi, sicut dicit Gale. secundo Apho. 1. Quarto est cibus & potus, duæ sunt res in ægritudinibus materialibus, quæ quantū ad cibum requirunt opposita morbus scilicet, & virtus, secundo regim. acut. 36. Virtus enim quum de sui conseruatione indicet, & aliquid semper à corpore nostro resoluitur, quod restauratur cum cibo: ideo ipsa de dādo cibo indicat, primo regim. acut. 43. Morbus autem quum de sui remotione indicet, 9. de Ing. 14. & hoc facit per digestionem, clysteres, fomenta, phlobotomiam, & pharmacum, 1. regim. acut. 43. cuius opus à cibo impeditur, ideo de non dando cibo indicat, 1. ad Glau. De cura tertianæ nothæ, vidēdum est quid magis referat Apho. 9. & taliter ordinanda est diætā, vt virtus stet per totum morbum, & in statu possumus vti tenuissimo victu: oportet ergo in principio crassius reficere, 1. Apho. decimo, ne post cogamur reficere in statu, quod perniciosum est, vt patet 2. regim. acut. 40. & infra: in ipso enim oportet vti tenuissima diætā, 1. Apho. 7. considerandæ tantum sunt conditiones, quas ponit Gale. primo regim. acut. 43. quia sic aliquando est cibandum, aliquando non: in ista ergo febre, quoniam de se nō transit 15. dies, vti poterimus subtili diætā, quia durabit vsque ad statum, primo crassius reficiēdo,



do, & semper attenuando, quando procedimus versus  
statum, & tunc parum vel nihil dabimus cibi, ergo cō-  
uenientes debent esse humidi, quia hoc est cōmune om-  
nibus febribus, primo Apho. 16. non tamen tantum, si-  
cut in aliis propter temperaturam quæ habet seruari,  
tunc, vt 9. de Ing. 14. & id habet fieri cū subtili, in lib.  
art. med. 86. Debemus ergo hæc examinare, & dare  
cibos tantum, declinantes versus frigidum & humidū,  
1. ad Glaucionem de cura tertianæ puræ, quantitas au-  
tem sit tanta, vt concoqui possit, sic quod duret virtus  
cibi, ergo qui dandi sunt, vt dicit Gale. ibi ex oleribus  
sunt atriplex, bliton, lapathum, malua, lactuca, cucurbi-  
ta, possumus tamen nos eligere, quæ sunt in vsu, succū  
ptisanæ, sorbitiones ex halica, pisces saxatiles, volu-  
cria quæ habent molles carnes aliarum auium alas,  
etiam gallorum testiculos dare possumus, & cerebrū  
suillum, contusum ex carne paruorum animalium, oua  
sorbilia maximè eorum vitellos. Ex fructibus possunt  
gustare illos, qui non sunt difficilis concoctionis, vt fi-  
cus in lib. de cibis boni & mali succi, & vuam bene ma-  
turam: Oportet etiam vt abstineant ab omnibus cibis  
maximè calidis & siccis, & hoc intelligitur in homine  
delitioso, qui habet parū caloris naturalis, & si sit for-  
tis complexionis, ac virtus sit fortis, tunc sufficit dare  
succum ptisanæ vsquam ad crisim, dicit ibi Gal. vinum  
in principio nullo modo conuenit, post autem potest  
dari vinum aquosum, & tenue iu pauca quantitate in fi-  
ne tantum, potest tamen dari in maiori quantitate, di-  
cit ibi Gale. ab aqua est abstinendum, & si est danda o-  
portet q̄ sit cocta, quia de se nullum præstat iuuamen-  
tum, sed multas noxas, vt dicit Hipp. tertio regi acut.  
cap. de aqua. Hi sunt ergo cibi, & potus huic febri cō-  
uenientes. Debemus etiam aduertere ne sumantur di-



uerſi cibi, tertio regim. acut. 37. q̄ ſi ſint diuerſi, qui ſint  
facilioris digeſtionis, ſunt permittendi, 3. regim. acut.  
24. & ſecundo de alim. cap. de perſicis, & plus dandū  
in coena, quā in prandio, ſicut reddit rationem Gale.  
6. de Ing. in principio autem paroxyſmorum à cibo  
penitus eſt abſtinendum. & in tota acceſſione, primo  
Apho. 2. imo nec ante principium, ſicut ampliat Gale.  
primo Apho. vigefimo, ſed in declinatione, vel melius  
tempore in febricitationis, quia in hac febre eſt longū,  
& quando eſt intentio, vel phlobotomiā, vel pharma-  
ciā, vel clyſteris, vel ſedandi aliquem dolorem, ſi eſſet  
abſtinendum eſt à cibo dum hæc fiunt, poſt eſt cibandū  
ſi eſt neceſſarium, primo regim. acut. 33. quod ſi ſit in  
æſtate, ſicut plurimum fiunt iſtæ febres, & æger diffi-  
le ferat cibum, oportet in pluribus vicibus exhibere, &  
parum, 1. Apho. 18. tertio regim. acut. 36. Quinto  
ſunt ea, quæ retinentur, & excernentur, ſed de iſtis di-  
ctum eſt, loquendo de intentionibus ſumptis à cauſa  
morbi, debemus omni cura attēdere, vt por ſint aper-  
ti, & in tempore debito vti mollibus frictionibus, &  
inunctionibus, quæ vim habent euaporandi, & in tem-  
pore debito vtendum eſt exercitatione. Hæc .n. ſunt  
quæ faciunt tranſpirare corpus, vt dicit Gal. 6. de tuen-  
da ſanitate. Habent autem abſtinere à coitu, quia mul-  
tum nocet tempeſtaturis calidis & ſiccis, ſicut ſexto de  
tuenda ſanitate dicit Gal. Cætera autem, quæ conueniūt,  
iam dicta ſunt. Vltimo ſunt accidentia animi, debent  
qui tali febre febriunt, cauere ab omni immodico ani-  
mi affectu, quia ſic alteratur ſtatus naturalis, vt dicitur  
in lib. artis medicinalis 85. maxime ab ira, furore, &  
inuidia, quæ calefaciunt & exiccunt, ſed debent medio-  
criter lætari, quia ſic confortatur calor naturalis, & ex-  
panditur, & ſic ſuas perficit operationes. Hæc autem  
ſunt



sunt, quæ agenda sunt inter res sex, quas non naturales appellant. Restat vltimo correctio accidentium, symptomata aliquando tantum in morbis faciunt, vt dicitur 12. de Ing. in principio, q̄ oportet eis tãquam magis vrgentibus attendere. Cæterum quum istæ febres de se sint salubres, quarto Apho. 43. non habent ideo sæua accidentia tamen quæ hic sunt consideranda, sunt rigor fortis, sitis, & calor mordax, qui etiam ab ipsa p̄det essentiam. Quantum ad rigorem quoniam habendo curam ad ipsum remouendum, impeditur sæpe motus naturæ, imo pro ipso non est vtendum fortibus remediis, possumus tamen curare, vt æger sit in lecto bene coopertus, & caleseat ante aduentum paroxysmi, quia sic calor naturalis est fortior, & nō tamen retrahitur, debemus aduertere, ne dormiat in principio, quia sic augetur rigor, secundo Apho. 1. curare etiam vt adueniat, ventre vacuo, 1. Apho. 19. pariter in ipso non est cibandum, primo Apho. 11. possumus etiam ponere circa ægrum pannos calidos. Sed reliqua omnia fortia remedia sunt omittenda. Quantum ad sitim, licet æger de se debeat euitare aquam quantum potest, tamen propter sitim aliquando concedenda aqua cocta vel cum hordeo, vel cum seminibus melonis, & similibus, quæ habent vim humectandi, & refrigerandi: potest autem aliquando degustare aliquos fructus, si non sint difficilis coctionis, primo ad Glau. in cura tertianæ puræ: possunt etiam vti aliquibus iulep. vt iulep rosato, & similibus. Debent tantum quātum possunt vitare narancia, granata, & similia quæ habent vim stypticam, quia cum eis augetur oppilatio, & per consequens febris. Quantum ad calorem, quia est de essentia febris, remitti non potest, nisi remouendo febrem, vnde debemus quantū possumus, euitare frigida actua-

lia,



## Mathei Curtii

lia, applicata extra, urgente tamen necessitate aliqua epithemata cordi applicare poterimus, eaque frigida, ut ex camphora, sandalis, & similibus iam apparentibus signis manifestæ digestionis. Sed hæc dicta sunt in intentione sumpta à morbo. Ibi enim debet de hoc esse sermo. Quod si est, est etiam prostratio appetitus est propter humores currentes ad stomachum, quibus ablatis per pharmacum, poterimus uti confortantibus stomachum, & extra iniungere factis, scilicet euacuationibus. Hæc sunt, quæ in cura tertianæ puræ, iuxta mentem Galeni, videbantur ponderanda.

### De cura tertianæ continuæ.

Tertiana modo continua, quæ fit ex cholera putrescente in parvis venis, sicut dicitur secundo de diff. feb. ultimo, & cognoscitur, quia habet eadem accidentia, quæ habet tertiana pura, sed intensiora, eodem quoque modo curatur sicut interpollata, sicut prima quarti tracta. secundo cap. 40. dicit Auicenna. excepto, quod maiorem debes habere curam eius in infrigidando, & digerendo, sic ergo eadem remedia, quæ valent in pura, valent in continua, sed debent esse fortiora.

### De tertiana notha & eius curatione.

Tertiana notha, quæ fit ex admixtione cholerae, & phlegmatis, quando ad unam formam reducuntur, sic quod non servatur modus præcisus affligendi cholerae, vel phlegmatis secundo de diff. febr. 7. cognoscitur, quoniam eius paroxysmus duodecim horas, & septem periodos transit cum gravitate capitis, & extensione accedit: Rigorem habet longiorem, quam pura, ne c  
adeo



adeo auctum. Tarde in ea apparent signa digestionis, non eradicatur cum sudore copioso. Aliquando etiam non incipit cum rigore, caliditatem non habet multum augmentum habet inæquale in libro de quatuor temporibus morbi, accidentia minus habet sæua quàm pura. Hæc omnia colligit Auic. prima quarti tract. secundo cap. 4. Videndum est, quantum sit febris proxima puræ, & remota, & sic magis vel minus est varianda cura, à cura puræ, si enim sit remota parum, ab ipsa parum est deuiandum. Quantum ergo ad remotionem causæ, suppositis quæ dicta sunt in cura puræ, & sic ab ipsa incipiemus. Quoniam si istis febribus est etiam flegma quod peccat, cuius est magna copia in stomacho, & in intestinis, ideo i. ad Glauco. de cura tertianæ nothæ, est utendū non leui clysteri, ut ponendo in clysteri cassiæ, sicut dicit Auic. drag. 6. vel virtutē turbithi, ut vnc. mediam diapheniconis, velelect. Indi, facto clystere, sequenti die poterimus dare lenitium, quoniam multæ sunt materiæ in stomacho educendæ, puta vnc. i. cassiæ, & si voluerimus adiungere stimulum, quia materiæ sunt crassæ, poterimus adiungere dra. i. vel electua. Indi maioris, vel agarici præparati, quod etiam habet prouocare vomitum, qui quidem maxime in hac cura confert, sicut dicit Gal. primo ad Glauco. de cura tertianæ nothæ, vnde maxime si natura tentet, poterimus ipsum in principio prouocare, propter phlegmata, quæ sunt in stomacho, ut dando vnc. 6. aquæ hordei calidæ cum pauco aceti, vel syrupi acetosi, vel cum pinna intiucta in oleo, & cum similibus leuibus, quia fortia in principio non conueniunt, & si de se sequatur vomitus post cibum, optimum est. Quod si necessaria est phlebotomia, ut quando natura est aggrauata, & sunt aliæ conditiones, quæ indicant de phlebotomia, est fienda,



## Mathei Curtii

da, & quanto citius, eo melius : oportet tamen præmit-  
tere clysterem, & maxime si non habet beneficium vē-  
tris, & lenitium, si sint plurimi humorum crudi in sto-  
macho. Quantitas autem cibi, dicit Gal. sit tanta, quā  
tam exigit status coeli, considerando ea, quæ de mente  
Gal. dicta sunt in cura puræ, facta phlebotomia venien-  
dum est ad digestiua, quæ debent esse fortia propter  
materiam multam & crassam possumus, ut dicit ibi  
Gale. facere decoctum ex origano, hyssopo, & spica de  
coquendo in debita quantitate mulsæ, & dare, verbi  
gratia vnc. 5. vel ptisanæ succum cum pipere. Possu-  
mus quoq; dare, ut dicit Auic. puta sumēdo syrup. ace-  
tosi vnc. i. syrupi de duabus radicibus vnc. i. aquarum  
apii, & foeniculi an. vnc. i & med. Sic ergo proceden-  
do semper, si eger non habet ventris beneficium, pote-  
rimus uti clysteribus. In die infebrecitationis, appare-  
tibus signis digestionis, nō in principio, poterimus uti  
balneo, dicit Gal. oppositum tamen dicit Auicē. Gal.  
forſan intelligit, quando non est multum remota à pu-  
ra. Auic. quando est multum remota, quia sua ratio tūc  
valet. Nos poterimus securē procedendo, omittere  
penitus, vel tamen uti in declinatione, sed in hoc tem-  
pore scilicet apparentibus signis manifestæ digestio-  
nis, poterimus uti prouocantibus vrinam, & sudorem  
leuiter, sicut sunt illa, quæ sunt posita pro digestiuis, vel  
addendo semina melonis, maiora, communia, vel uten-  
do oxymelite, sicut dicit ibi Gal. & quum deuētum est  
ad septimum diem, quia iam est consonum, & aliqua  
pars sit putrefacta pro eius educatione, poterimus uti  
leui pharmaco, laudat Gale. & Doctores alii comam  
absinthii, vel eius decoctionē: quoniam ut dicit Auic.  
confortat stomachum, & educit materiam peccātem,  
post iterum poterimus redire ad digestiua, & uti eis  
do-



## De Feb. curatione 31

donec appareant signa digestionis completæ. Hoc interim poterimus vti calefacientibus, confortantibus, quando prolongatur ægritudo, dicit Auic. vt vngendo stomachum cum oleo absinthii, vel menthæ, vel actua liter applicando calida stomacho, vel faciendo emplastrum ex eis cum ligno aloes, pariter etiam poterimus applicare hepati oleum squinanthi, capparum, foeniculi, saluię, & similium, vel ex similibus facere emplastra & etiam tollere tensionem hypocondriorum, si fuerit apparentibus vero signis manifestæ & completę digestionis, & natura non completæ educente, tunc dicit Auic. oportet euacuare, & vtemur medicamentis educentibus choleram, & phlegma, puta dando drag. i. s. rhabbari, agarici trochilcati vel in infusione, vel in substantia vnc. i. addendo parum spicæ, post drag. vi. cassiæ cribellatæ, & drag. ii. elec. Indi, vel diapheniconis poterimus vti. Poterimus quoque conficere pillulas ex rhabbaro, agarico, & dare puta drag. ii. Cæterum quoniam virtus est debilis, & ægritudo longa: ideo non vna vice damus medicinam, quę materiam peccantem totam debeat educere, sed damus medicinam, quam vocant fortem debilem, & quę trahit à remotis, sed sit in pauca quantitate, puta in forma pillularum dando scrup. ii. chochiarum, & aurearum scrup. i. vel faciendo vt mastificent drag. ii. rhabbari. His datis medicinis, sequenti mane poterimus dare vnc. i. zucchari rosati, vel aromatici rosati, vel ex sandalis cum speciebus aroma. rosati conficere confectionem in morsellis, & dare omni mane morsellum vnum per horam ante cibum cum paucio vino aromatico, sic etiã cum frictionibus, cum debitis exercitiis, cum vnctionibus aperientibus, cum aliquibus aquis factis cum radicibus communibus, cum seminibus maioris communibus:



## Mathei Curtij

bus poterimus curare, vt insensibiliter, vel per sudorē,  
vel per vrinam excernantur superflua tertiæ digestio-  
nis, & hæc quantum ad causam remouendam.

Restat modo ordinare in sex rebus nō naturalibus.  
Quantum ad cibum, dicit Gale. 1. ad Glauco. de cura  
tertianæ nothæ, q̄ cum cibo est prouidendum ne mor-  
bus augeatur, & tamen est etiam aduertendum, ne vi-  
res prosterantur, quoniam ista febris de se est longa,  
& hoc est difficile. Nam inedię quantum profunt co-  
ctioni morbi, tantum nocent viribus, cibi vero quan-  
tum vires augment tantum coctionem impediunt, opor-  
tet ergo Medicum cogitare vires ægri an sint validæ,  
vel debiles, & morbi magnitudinem, sic viribus existē-  
tibus fortibus, minus est dandum, si ægritudo sit ma-  
gna, si uero virtus sit debilis, plus est dandum. Vnde  
non limitata potest dari regula, sed saluatis conditio-  
nibus vniuersalibus, quas de mente Gal. adduximus in  
cura tertianæ puræ, quoniam in veritate morbus est lō-  
gus. Ideo oportet, q̄ diu seruetur virtus, & sic crassius  
poterimus reficere quā in pura: oportet ergo, dicit  
Gale. non quotidie cibare, sed alternis diebus, vt bis in  
die infebrecitationis, tamen poterimus etiam cibare se-  
mel in die paroxysmi, & in declinatione, leuiter tamē,  
vt dando aliquam sorbitionem vel parum ptisanæ, vel  
panatellæ. Cibi etiam dicit Gale. ibi, nō debent esse  
aquæ frigidi, sicut in pura, quia est maior intentio inci-  
dendi, & aperiendi, & minor remittendi calorem febrilem.  
Oportet quoque, dicit Auic. in principio crassius  
reficere, quā in pura, quia est longior. Cibi autem  
qui dari debent in die infebrecitationis erunt, sicut oua  
sorbilia, contusum ex carnibus volatilibus, & illi om-  
nes quos enumerat Gal. in tertiana pura, sed in maio-  
ri quantitate. De vino nihil, dicit Gal. Paulus, & Auic.  
Cre



## De Feb. curatione 32

Crederem, quum in principio non conueniat, apparen-  
tibus tamen signis digestionis, potest dari, & in maio-  
ri quantitate, & aliquo modo magis vinosum, quàm in  
pura, quia cibi conueniunt, & potus, qui iuuant excre-  
tiones, & magis vergunt versus calidum, quàm in pu-  
ra, poterimus tamen uti etiam aqua dummodo sit co-  
cta, ut cum aliquibus incidentibus, ut cum radice apii,  
vel foeniculi. Aer non debet tantum in frigidari, sed  
fit temperatus: vergat tamen magis versus frigidum,  
& humidum, quàm versus calidum & siccum. Somnus  
fit temperatus, ut si est possibile, plus solito, quia iuuat  
concoctionem, quietem laudat Gal. in primo ad Glau.  
cap. proprio, quia facit ad concoctionem, & tunc debe-  
mus uti calefacientibus, & calefacere hypochondria,  
& curare ut pori stent aperti, & excernantur superflua  
nec retineantur excrementa, vel urinae, vel sudores, ac-  
cidentia animi, quæ aliquo modo calefaciunt apparen-  
tibus signis manifestæ digestionis, possunt concedi, quia  
tamen omnis motus animi non est in potestate nostra,  
& aliquando accidentia sunt maiora, quàm velimus: de-  
bemus curare, ne æger irascatur, dolore afficiatur, non  
invidia crucietur, & similia, quæ possunt maxime agita-  
re. Sed aliquo modo lætetur, & sine tristitia viuat, sym-  
ptomata non sunt magna, nec sæua in hac cura, ideo de  
his pauca est habenda cura.

### De Causo, & eius curatione.

Causus febris est ardens, quarto regim. acut. 14. pu-  
ra, quæ fit ex flaua bile, 3. regim. acut. ultimo, putrescē-  
te in magnis vasis, 2. de Crisi. 6. Et hæc est, quæ ardē-  
tissimam habet sitim, & calorem intensissimum, quar-  
to regim. acut. 13. non pura potest fieri ex phlegmate  
falso,



## Mathei Curtii

falso, & dicitur spuria, tertio reg. acut. vlt. & quarto re-  
 gimi. acut. 13. & hæc accidentia non habet adeo seua,  
 potest etiam fieri ex cholera admixta phlegmati, quia  
 vt dicit Gal. quarto Apho. 59. causus fit ab eodem hu-  
 more, à quo tertiana q̄ si fit tertiana notha ex cholera  
 admixta phlegmati, fit etiam causon nothus eodẽ mo-  
 do. Cognoscitur ex duobus signis propriis insepara-  
 bilibus, præcipuè scilicet, quia cum eo est semper inten-  
 sa febris, & clamosa sitis, dicit Gal. 4. regi. acut. 13. &  
 hoc in summo in pura, remissius, in spuria. Pariter fe-  
 brem habet continuam, & nunquam ad infebrecitatio-  
 nem definẽtem, 2. de Crisi 3. & seprimo, ex istis signis  
 hoc est signum proprium, & inseparabile causonis, ve-  
 rum est, quòd sunt ista signa intensiora in vero causone  
 quàm in spurio, 4. regi. acut. 13. Verus autem causon  
 facit, q̄ corpus laborat lassitudine vlcerosa, 4. regim.  
 acut. 2. & sequitur longum iter, longamq̄ sitim 4. re-  
 gim. acut. 3. linguam habet asperam, siccam, & nigrã:  
 ventrem morfu dolentem, deiectiones liquidas, & pal-  
 lidas, vigilias, & aliquando alienationes, 4. regi. acut.  
 quarto, causon vero spurius habet aluum solutum, si-  
 tim magnam, linguam asperam, siccam, & salسام, 4. re-  
 gim. acut. 13. vrinæ defectus, vigilias & refrigerata  
 extrema. Hæc sunt signa ponentia differentias passio-  
 nes, fit autem causon verus, maxime in iuvene, tempe-  
 raturæ calidæ & siccæ. tempore calido & sicco, exerci-  
 tato quãdo ieiunauit, regime calido & sicco, qui fue-  
 rit vsus cibis calidis & ficcis, secundo de Crisib. 30. &  
 de se septem dies non transit, 4. Apho. 59. hæc sunt si-  
 gna causonis. In cuius cura, maxima in cura puri, sic  
 est procedendum, res omnes, quas considerare debet  
 Medicus in alicuius egritudinis cura in triplici sunt dif-  
 ferentia. Nam quædam sunt res naturales, quædam  
 non



non naturales, quędam præternaturales, sicut dicit Gale. 3. de Caus. pul. primo, ergo de istis in hac cura loquendo incipiemus à præternaturalibus. Res igitur præternaturales tres sunt, scilicet causa morbi, morbus, & symptomata, tertio de acc. 1. quę omnes de sui remotione indicant. lib. de constit. artis med. 19. in horum autem remotione à magis vrgente esse incipiendum, 7. de Ing. 12. Symptomata aliquando morbum augent, & virtutem prosterunt, & tunc ab ipsis est incipiendum, 12. de Ing. primo, quum tamen principalis, & regulara cura sit incipere à causa, si est possibile, vt etiam ibi dicit Gal. Ideo supposito, q̄ in hac cura, licet accidentia sæua sint, quę tamen penitus virtutem non prosterant, ab ipsius causę remotione est incipiendum, post de remotione affectus demum de ipsis loquendum symptomatibus. Remedia, quibus vtimur in causa sunt phlebotomia, consistente virtute, cataplasmata, purgationes, digestiua, & similia, sicut dicit Gale. primo regi. acut. 43. quę harum præcedere debeat, dictum est. Quum ergo Medicus adit febrientē hac febre, primo si sunt retētę feces, ante cibum debet præparare clysterem, quem laudat Gale. vndecimo de Ing. nono, ex oleo scilicet, & aqua mellis, puta sumendo vnc. 6. olei, & tres vel quatuor aquę mellis. Iste .n. clyster omnes habet intentiones, quę in clystere desiderantur, intendimus enim remollire feces induratas, lubricare intestina, stimulare expulsiuam, infrigidare & humectare in istis febribus, oleum stimulat & lubricat: aqua mellis abstergit, & remollit feces, & in ea nihil est, q̄ inflammet: facto clysteri in sero, sequenti mane, si sunt aliqui humores crudi vel indigesti in stomacho, & in superioribus intestinis, vel meseraicis per mediam horam ante cibum potest exhiberi medicamē



## Mathei Curtii

rum, quod lenitium vocant, puta vnc. 1. cassiæ, vel vnc. 2. mannæ quod si volumus stimulare, possumus addere vnc. 1. elect. ros. Mesue. Possumus quoq; dare diapruni non solutiui vnc. 1. vel octo pruna cū aqua mellis, post bibendo decoctionis fructuum vnc. 3. syru pi violati, vel decoctionem mercurialis, vel infusionē tamarindorum in fero, post debet fieri phlobotomia per horam ante coenam, q̄ si non sint retentæ feces, nec repletus stomachus, melius est subito vti phlobotomia, 9. de Ing. quinto, si igitur virtus sit fortis, & ætas patiatur, quia morbus est acutus, fienda phlobotomia sic, vt patet ab Hip. quarto regim. acut. 17. & Gal. in lib. de phlobotomia, q̄ si sit æger ante annos 14. tūc non est fienda phlobotomia, 11. de Ing. 14. tertio de Ing. dist. 3. cap. 5. in sene autem etiam septuagenario modo virtus constet est fienda, sicut fecit Gal. in lib. de phlobotomia, verum est q̄ in ipsis, quia calor naturalis est debilis, vt plurimum virtus non constat, quarto regim. acut. 17. & in lib. de phlobotomia, q̄ si virtus non constet, etiam penitus à phlobotomia est abstinendum, sicut in lib. de phlobotomia dicit Gal. si ergo est possibile, quando fieri debet, est fienda in hac febre ardenti vsque ad syncopim, primo Apho. 23. sic enim dicit ibi Gal. rotus habitus corporis refrigeratur, & febris extinguitur, & sudores emanant, & aluus citatur. Quare plurimum signatur, vel saltem vehementia febris abscinditur, quod si tantam copiam mittere nō volumus, saltem debemus copiosè phlobotomare.

Quantitas autem sanguinis mittendi deprehenditur à regione, complexione, statu coeli, tempore annui, quod si omnia indicent de non mittendo sanguine, vt in complexione debili, regione calida vel sicca, tempore calido & sicco, tunc nō est fienda phlobotomia, 11. de  
de



11. de Ing. 14. & primo ad Glau. de cura continuariū,  
 q̄ si omnia, quæ indicant de mittendo sanguine adsint,  
 tunc, vt dixi, vel est mittendum vsque ad syncopim, vel  
 copiose saltem, vt saltem mittendo lib. 1. sanguinis.  
 Si vero aliqua adsint, non est mittendus, sed magis &  
 minus, secundum diuersitatem conditionum. Istæ .n.  
 conditiones, vt dicit Gale. in lib. de phlobotomia non  
 indicant per se de mittendo, vel non mittendo sangui-  
 ne, sed de maiori vel minori quātitate: sunt enim tres  
 tantum conditiones, quæ indicant per se de non mittē-  
 do sanguine, virtus scilicet debilis, etas non florens, &  
 morbus non indicans de sanguine mittendo, verum est  
 q̄ si illæ aliæ omnes simul iungantur de non mittendo  
 sanguine indicant, quas sub aere posuit Gal. quarto re-  
 gi. acut. 17. Si autem sit maxima cholere abundantia,  
 vel cum diminutione sanguinis, vel humorum crudo-  
 rum copia, etiam non est fienda phlobotomia, quia sic  
 virtus non constat, sicut in lib. de phlobotomia dicit  
 Gal. sed est intentio de pharmacia. Quod igitur ad  
 pharmaciam attinet, vel materia quæ peccat, est furio-  
 sa vel non. Est autem furiosa quando est in motu in-  
 differenter, vel ad loca expulsionis, sicut dicit Gal. octa-  
 uo de med. comp. quando confecit hieram Themiso-  
 nis, vt dummodo sit cum periculo, 4. Apho. 10. si ergo  
 materia sit talis, indigesta debet educi, 1. Apho. 22. &  
 24. & secundo Apho. 29. & 4. Apho. 10. si tamen est  
 possibile, oportet vti digestionē. Medicum aperiendo  
 scilicet vias, & ressecando humores, & quoniam hæc  
 habent fieri in paucio temporis spacio, ideo oportet vti  
 multum calidis, etiam q̄ noceamus feбри, quia maius se-  
 quitur iuuamentum nocumento, & hæc fit cum deco-  
 ctione pulegii, origani, calaminthæ in melicrato, facta  
 ista digestionē, si materia turgēt, est dandum medica-



## Mathei Curtij

mentum, & cum præmeditatione dicit Hipp. 1. Apho. 24. non semper sic ad pharmaca solutiua in principio est recurrendum, dicit ibi Gal. bene omnia examinando, vt naturam infirmi, vtrum scilicet sit idonea purgationi, aut laboret multa cruditate, an habeat crudos, & tenaces cibos in stomacho, an habeat ilia extensa, & nimis calida, quia istis existentibus conditionibus, etiã si materia sit furiosa, à pharmaco est abstinendum, vt ego censeo. Quare melius est egrum mori ex malignitate morbi, quam pharmaco eum interficere: in eis .n. vtendo pharmacis, & ars, & medicinæ vilescunt, sicut dicit Gal. 11. de Ing. nono, q̃ si istæ non adsint conditiones, apertis viis, & refecatis humoribus, si est possibile, dabimus medicamentum. v. g. rhabbarbari drag. 2. cassiæ drag. 6. elect. rosati Mesue drag. 2. hæc omnia educunt choleram, non tamen cum maxima agitatione, q̃ si esset etiam admixtum phlegma, possumus addere drag. 1. & sem. agarici trociscati, faciendo infusionem in aquis endiuivæ & cichoreæ, sicut communiter fit, & possumus magis & minus fortiora vel debiliora pharmaca dare, secundum q̃ vires fuerint: tantum .n. est pharmacandum, quantum vires fuerunt, 1. Apho. 23. quod cognoscitur ex qualitate eorum, quæ excernuntur, si talia sint qualia esse debent, & egri facile tollerent, 1. Apho. 2. & 22. & quarto Apho. 2. & cognoscitur si eger ferat grauiter purgationem, 4. Apho. 39. Sic etiam aduertendæ sunt aliæ conditiones, quas enumerat Hippo. ibi in 4. parti. Apho. & videbimus quando fortiora, & quando debilia sint danda pharmaca, & per quã viã, & hæc omnia colligit Gal. 1. ad Glau. de cura continuæ cum accidentibus, q̃ si materia furiosa non sit indigesta educi non debet, 1. Apho. 22. & octauo de medic. vbi refert hieram Themisonis aliter sequen-



sequeuntur illa inconuenientia, quæ refert Hippo. primo regi. acut. 2. hoc autem est interdum de materia faciente morbum. Nam quando timemus de alio morbo futuro, quod periculosus sit, etiam indigesta materia est pharmacandum, sicut fecit Gale. ult. de Ing. 14. in timore phthiſeos 13. de Ing. cap. 16. in cura oculorum 14. de Ing. octauo. in cura tremoris linguæ, quarto regi. acut. 16. in angina, istam digestionem facit natura, primo prognost. ultimo, semper incrassando, 2. prognost. 33. & separando bonum à malo, & malum ad educendum aptum reddendo: materia enim digesta facilius educi potest, 1. Apho. 22. Istam digestionem poterimus iuuare cum confortantibus & roborantibus virtutem digestiuam: nos autem faciemus corpora fluida, hoc interim sicut est necessarium, secundo Aph. 9. & hoc faciemus cum decoctionibus, quæ sunt minus calidæ quàm illæ, quibus utimur in materia furiosa, quia longius est tempus, verbi gratia, radicum capil. veneris, foliorum buglossæ, endiuia ana m. 5. radicum cicoreæ, & apii wundararum ana numero 8. fiat decoctio secundum artem usque ad consumptionem tertie partis, vel medietatis aque. Deinde fiat colatura, de qua capiat mane vnc. 6. calidæ, addendo parum zucchari, sic etiã prouocamus sudores & vrinas, quod eo tempore conuenit, 11. de Ing. 9. Possumus quoque dare oxymelitem estate frigidum, hyeme vero calidum, 1. regi. acut. 42. oportet dare quod multum non sit acetosum, quia abradit intestina, tusſim excitat, & neruosa lædit: pariter non oportet dare in multa quantitate, 11. de Ing. 11. vel si volumus dare in forma syrupi, poterimus dare, puta oxymeli vel acetosi simplicis vnc. 1. quoniam etiam aliquo modo digerendo oportet habere curam etiam infrigidandi propter intesum



## Mathei Curtii

calorem febris, syrup. de endiuiā vnc. 5. aquarum endiuiā, & cichoreā ana vnc. 1. & sem. sic igitur digerendum, & prouocanda vrina, & sudor, si natura tentet vomitum, poterimus eam cum aliquo leui vomitiuo iuuare, puta cum aqua hordei calida, & pauco, vel syrup. acetosi, vel cum penna in oleo intincta. Quum autem deueniemus ad tempus perfectę digestionis, quoniam est aptum pro Crisi. naturę est aduertendum, si ipsa natura totam materiam euacuet, & sic nihil quo ad istam intentionem debet facere Medicus, 1. Apho. 20. & 22. in commento, & hoc sæpe facit per fluxum sanguinis narium, 4. regim. acut. 10. vel mittendo materias extra venas, & sic faciens rigorem, post sequitur eum solutio per sudorem, velut in 4. Apho. 58. aliquando etiam soluitur per vrinas, 4. regim. acut. 10. q̃ si ipsa aliquid relinquet, quia quæ talia sunt solent facere recidiuam, 2. Apho. 12. tunc Medicus debet iuuare per eam regionem, per quam incēpit euacuare natura, primo Apho. 2. & sequi eas condiciones, quas de euacuatione diximus in cura tertianę purę. Pharmacum vero, quo vti debemus, est illud de quo supra, quando loquebar de materia furiosa. Exhibitio pharmaco, si aliqua sit impressa caliditas in membris ab ipso, vel debilitata membra principalia, sequenti die dabimus species triasandalorum, vel diarrhodon abbatis, faciendo morsellos cum zuccharo, & dando singulo mane morsellum vnum, vel dabimus zucchari rosati vnc. 1. vel syrupi rosati vnc. 1. cum vnc. 3. aquę boraginis. In istis temporibus cum frictionibus, cum vnctionibus refacientibus, cum debitis exercitiis, si erit possibile, eum curabimus, vt si aliqua superflua tertię digestionis restiterint, excernantur semper, non omittendo clysteres, si aluus sit sicca, donec æger bene habeat ventris bene-



beneficium, hæc quo ad causam morbi. Veniendum modo est ad morbum, duo sunt præcipua remedia in cura febrium ardentium, phlobotomia scilicet, & exhibitio aquæ frigide, primo Apho. 23. 9. de Ing. nono, postquam ergo iam est dictum de phlobotomia, est dicendum de exhibitione aquæ frigide: intentio enim de ipsa exhibendo, sumenda est præcipuè à morbo. Causon enim quum febris ardentissima sit, quæ secus trahit intensissimum calorem, & intensissimam siccitatem hinc indicatione sumpta ab ipso, intentio est de exhibitione maxime frigidorum & humidorum. Quum autem huiusmodi maxime sit ipsa aqua, intentio igitur sumpta ab ipsa, quæ maxime conuenit, est aqua frigida, primo regi. acut. 42. Hinc dicit Gal. 4. regim. acut. 12. q̃ omnes febre ardenti laborantes, quibus exhibuit aquam frigidam sanauit, idem nono de Ing. 6. Hinc crederem, q̃ (licet hoc remedium modo non sit in usu) optimum esset, eo uti: apparentibus igitur signis manifestæ digestionis, quando est maxima flamma, est dāda aqua frigida, 9. de Ing. quinto, si status cœli sit calidus & siccus, & omnes vires egri valeant, nec sit senex, 11. de Ing. 9. maxime si æger sit assuetus, quod si non sit assuetus, dabis, sed non adeo audacter, 9. de Ing. 5. Aduertendum tamen est si plurimi indigesti, & glutinosi sint humores in stomacho, si inflammatio in interioribus, si sit aliquod mēbrum neruosum debile, quia nec tunc aquam dare oportet, 9. de Ing. 5. nisi sit periculum mortis, vel hec ticæ, quoniam si esset apostema in interioribus, & indigesta materia liceret dare ipsam sicut fecit Gal. 10. de Ing. 6. quantitas autem dicit Gale. primo regi. acut. 42. debet esse tāta quod extinguat febrem, & hoc est quantum egger vno haustu potest bibere, vel quantum voluerit æger, 9. de Ing. 5. & sunt



## Mathei Curtij

duę cotyle, decimo de Ing. 5. scilicet vnc. 18. & debet  
dari vacuo stomacho. Nec etiam sunt admiscenda,  
quę postea refrigerant, quia sic nimium forsan restarēt  
frigida, & cū de hoc nihil dicat Gale. consonum est,  
q̄ non sint miscenda, pariter nō est danda in pauca quā  
titate, quia sic febrem non extinguit, nec sitim, & mul-  
tum nocet, sicut tertio regi. acut. cap. de aqua dicitur,  
eo tempore etiam, & illis stantibus conditionibus po-  
terimus balneare in aqua dulci, dicit Gal. 11. de Ing. 9  
vnctiones pariter frigide eo tempore conferunt, & po-  
terimus inungere eum infrigidante, quod describit Ga-  
le. 10. de Ing. 9. quo est etiam vtendum in causone, vt  
dicitur in lib. de tabe, sic etiā poterimus applicare alia  
epithemata frigida, vt ex sandalis, ex camphora, nisi  
non sit maxima vigiliarum instantia, ex succo planta-  
ginis, & similibus infrigidantibus, nec est necessarium  
admiscere calida, quia vt in alterando exterius nō mul-  
tum est periculum, & indifferenter possunt applicari  
omni membro, 7. de Ing. 8. & vltimo, & quando iam  
sunt calefacta à calore febrili debent remoueri, & ite-  
rum applicari frigida, 10. de Ing. 9. Aduertendum est  
tamen, si aliquod sequeretur nocumentum alicuius par-  
tis proximę, tunc non debent amplius applicari, vel  
non multum frigida, sicut fecit Gale. septimo de Ing.  
8. in secundo infirmo. Hęc sunt præcipuē tria reme-  
dia, quę valent humectando & refrigerando. Alia di-  
cemus in sermone sex rerum non naturalium. Venien-  
dum modo est ad symptomata, quę etiam de sui remo-  
tione indicant. Sunt enim præter naturam accidentia,  
quę morbum sequuntur, sicut vmbra corpus, 3. regim.  
acut. 1. & hęc sunt in triplici differentia, scilicet corpo-  
ris affectus, actio læsa, & exiens mutatum, 12. de Ing.  
primo, 3. de accid. secundo, hęc etiam de sui natura,  
indica-



## De Feb. curatione 37

indicationem non præbent curatiuam, nisi in quantum induunt naturam causæ, vel virtutem prosterunt, 12. de Ing. primo. Quum igitur talia sint, ab ipsorum remotione est incipiendum. Ceterum quoniam sepe morbus ipse, & causa diuersam exigunt curam, in cura symptomatum, 11. de Ing. 11. ideo videndum est, an tale posset reperiri remedium, quod ad vtrunque valeat, & tunc erit directa cura, 12. de Ing. primo. Quod si tale non reperimus, debemus attendere vrgentiori, altero non neglecto, 7. de Ing. 2. sicut etiam est faciendum in symptomatibus: quando enim duo infestant, semper vrgentiori attendendum est, altero non neglecto, primo ad Glauco. de cura febris continuæ cum accidentibus. Symptomata ergo, quæ sequuntur febrem ardentem sunt, primo sitis intensa, quarto regim. acut. 13. lingua sicca, & nigra, ventris morsus, & eius fluxus cum materiis pallidis, & liquidis, vigiliæ, & aliquando alienationes, quarto regim. acut. 4. Quod si sit causon à phlegmate falso, linguam habet salsam, quarto regim. acut. 13. Quantum ergo ad sitim ipsam quantum sit inseparabilis à causone, remedio Medici auferri non potest, nisi & ipsa tollatur egritudo, sed quoniam, vt dicit Gal. primo de dieb. crit. quum est sitis adeo intensa & clamosa, non oportet cruciare egrum, poterimus dare aquam mellis, sicut facit Hippo. 4. regim. acut. 5. Sed quoniam aqua mellis, ratione mellis inflammatur cito & sic nocet feбри, 11. de Ing. 11. Imo debet esse cum pauca mellis quantitate, magis tamen laudat ibi Gal. cremorem hordei, quem possumus facere modo, quia grossius reficimus, nisi timeamus, q̄ accrescat in stomacho, 1. ad Glauco de cura feb. cōtinuarum cum accid. Aquam quoq; exhibere possumus, sed coctam, quia sic multæ tolluntur noxiæ ipsius aquæ, 4. regim. acut. 5. & est



## Mathei Curtij

est bonum in ipsa decoquere radicem apii, sicut dicit Gale. nono de Ing. 9. sic enim prouocabimus sudorem & vrinam, possunt admisceri semina communia, quia refrigerant, & vrinam cient: potest etiam fieri aqua hordei, quæ licet non habeat omnes intentiones ptisanæ, humectat tamen & refrigerat, & sic aliquo modo sitim tollit, quod si est possibile, oportet aquarum harum magnam dare quantitatem, sed raro, 4 regim. acut. 5. quia in pauca quantitate sitim non sedat, & in bilem cōuertuntur. Potest quoque eger tenere in ore pruna sicca, vel macerata in aqua frigida. Sic enim faciendo eger melius transit ipsam sitim: quo vero ad linguam, debemus curare vt mundetur, abstergatur, puta lauando os cum aqua mellis, & radendo ipsam cum aliqua re aspera, & curando vt eger parum loquatur. Fluxus autem si immodicus sit, debet curari, quod si non sit superfluus, quoniam forsan est criticus, si habuerit conditiones ad crisin, quas enumerat Gale. primo Apho. 2. non est impediendus, superfluus autem curatur, primo vtendo clysteri, quem vocāt lauatiuum, scilicet ex brodio, zuccharo, & vitellis ouorum, vt non radantur intestina, & sequatur dysenteria, quod si sequitur, poterimus vti clysteribus faciendo decoctionem, vt cum balauistiis, cum carabe, mespilis, cum elect. de sorbis, & similibus: item etiam poterimus applicare cērata styptica, vngendo cum oleis stypticis, puta cum oxyrhodino, & similibus. Quod si sequatur sic, q̄ faciat dysenteriam, tunc dicit Gal. 12. de Ing. 1. omnis cura est adhibenda ad symptomata, & tunc per clysterem induimus, vel tragi succum, vel seuum hircinum, vel rosaceum, vt vires quiescant, donec habeamus tempus sanandi vlcerationem, quam post sanamus imponendo per anum res consolidantes, quod si sit cum ea dolor immodi-



immodicus, sic vt prosteratur virtus, auferendus est dolor, si est possibile cum rebus quę morbo, & sympto-  
 mati conueniunt, & videndum ne quid nimis agas, di-  
 cit Gal. ibi. 12. de Ing. primo. quod si non cessat dolor,  
 tandem veniendum est ad opiata, potiusquam egrum  
 relinquere mori ex doloris vehementia, vt dando phi-  
 lonium, quod sit quatuor annorum. Quod si etiam se-  
 quitur syncope, primo aspergendo egrum aqua frigi-  
 da, nares apprehendendo, & os ventriculi perfrican-  
 do curari debet, dicit Gale. primo ad Glauco. de cura  
 febr. continuę, oportet quoque prouocare vomitum,  
 ligare manus forti ligatura, & si sequatur syncope ex  
 alia causa curanda est, vt dicit ibi Gal. Quo vero ad vi-  
 giliam dicit Gal. 12. de Ing. 1. vigilię tantę sunt ali-  
 quando, vt virtutem prosterant, ideo debemus cura-  
 re, vt eger tunc dormiat. Ceterum quoniam somnife-  
 ra vt plurimum sunt morbum augētia, & eius causam,  
 ideo debemus ea euitare, quantum possumus: debe-  
 mus ergo primo curare, vt eger quiescat, quantum po-  
 test, sit camera clausa & obscura, sine hominum concur-  
 su, quod si adhuc non potest dormire, possumus facere  
 decoctionem ex rebus frigidis, vt ex rosis, nenuphare,  
 portulaca, lactuca, endiuia, addendo parum mandra-  
 gorę, vel apii: post ex ipsa decoctione lauare egri ex-  
 tremia, & facere, vt odoret vapores illius aque, quod  
 si adhuc hoc non iuuat, possumus, dicit Auic. in hac cu-  
 ra dare syrupum de papauere, puta per horam post cœ-  
 nam: possumus quoque iungere tempora vngueto po-  
 puleo. Verum est, qđ vt dicit Gal. 12. de Ing. primo,  
 debemus omni ingenio curare, vt non vtamur istis fri-  
 gidis, quia frigidum multum nature inimicum. Sed  
 quando est necessarium vti, saltem ipsis est vtendum  
 cum maxima cautela, bene examinando naturam infir-  
 mi,



## Mathei Curtii

mi, & vrgentiam doloris, vel vigiliarū. Quod si etiam  
sint alienationes, quia tunc est periculum phrenetidis  
si in principio sint, possumus applicare capiti oxyrho-  
dinum, sicut dicit Gal. 13. de Ing. cap. 15. Item quan-  
do illa alienatio est propter vapores eleuatos, maxi-  
me à corde, poterimus facere epithemata cordi, maxi-  
me si sint factæ vniuersales euacuationes, ex rebus fri-  
gidis, & cor confortantibus vt ex sandalis, croco, suc-  
co boraginis, & buglossæ, cū aqua rosata. & similibus.  
Item poterimus facere frictiones, trahendo deorsum,  
& satis fortes, post sunt applicandę dorso cucurbitule,  
& sic confortando membrum mandans, reprimendo,  
& diuertendo à membro suscipiēte, alienatio curatur,  
hec sunt quę sunt dicēda quo ad remotionem trium re-  
rum præter naturam. Veniendum modo est ad res na-  
turales, quas quantum ad curam modo considerare de-  
bemus sunt virtutes, complexio, ætas, & consuetudo,  
quæ de sui conseruatione indicant, quod sit cum simili-  
bus in lib. art. med. 85. considerandum est ergo qualis  
sit virtus, & quanta, & videndum quomodo poterit  
durare vsque ad statum, & sic pro eius conseruatione  
est dandus cibus, sic q̄ cōseruetur, vt possit restare pro  
pugna contra morbum, sed de hoc dicam loquendo de  
sex rebus non naturalibus. Considerandum & qualis  
sit complexio ægri, vt sciamus quantum alterare debe-  
mus, dicit Galenus nono de Ing. 14. Quum enim  
corpora ægra in naturali complexione conseruare in-  
tendamus, octauo de Ing. nono, tantum est alteran-  
dum, quantum est necessarium pro naturalis comple-  
xionis conseruationem, & sic dabimus cibos, vel alias  
res secundum complexionem ægri: ætatem pariter o-  
portet considerare, & talia exhibere, qualia illi ætati  
conueniunt, & ita in pueris, ratione ætatis, laudabat  
victum



## De Feb. curatione 39

victum humidum Hippo. primo Aphorif. 16. consue-  
 tudo quoque quum sit altera natura seruari debet in  
 ægris, vt cibando hora consueta, curando vt dormiat  
 hora consueta, vt vtantur cibis quantum possibile est  
 consuetis, etiam q̃ essent parum deteriores, secundo  
 Apho. 5. pariter in educationibus debemus videre, an  
 sit solitus euacuationibus: consuetudo enim dicit Gal.  
 primo ad Glau. de cura cōti. cum accid. non parum est  
 momenti ad omnia peragenda, maxime ad euacuatio-  
 nes. Quod si aliq̃ sunt res, quę inter naturales repo-  
 nantur, ferè ad has tres reducuntur, & omnes de simi-  
 libus exhibendis, & de sua conseruatione indicant. Ul-  
 timo est dicendum de sex rebus non naturalibus, quę  
 conseruant sanitatem, vel amissam recuperant, si debi-  
 tè administrentur, & eam destruūt si indebitè. Primo  
 ergo est Aer, à quo maxime sumitur indicatio, 9. de  
 Ing. 14. q̃ si calidus sit & siccus febrem auget, si frigi-  
 dus & humidus eum curat, si ergo naturaliter possit  
 haberi Aer frigidus & humidus, ipsum eligere debe-  
 mus, q̃ si eum non habemus, debet taliter fieri artificia-  
 liter, eligendo domos subterraneas, quę frigidissimæ  
 sint, & maxime perflatę ad arctum versæ cum aliqui-  
 bus auris, ibi sint alicui fontes, qui si non sint, aqua de  
 vase in vas transfundatur: sic n. somnū ciemus, quod  
 maxime confert. Camēra sit aspersa aqua frigida, rosis  
 capreolis vitium, aut lētisci ramis, aut aliis herbis, quę  
 refrigerent & humectent: prohibendū est ne turba ho-  
 mīum in cameram ingrediatur, debemus tantū aduer-  
 tere ne talis aer toti corpori occurrat, quia sic auget et  
 opilationē, sed eger debet stare coopertus, excepta fa-  
 cie, hęc oīa dicit Gal. 9. de Ing. 8. Secundo est cibus &  
 potus, Gal. 1. ad Gla. de cura tertianę nothę, & 1. regi.  
 acut. 43. dicit, q̃ virtus indicat de cibo dādo, ægritudo  
 quæ



## Mathei Curtii

que est malum, de non dando cibo: si ergo egritudo sit brevis, & vehemens, & virtus fortis, nihil dare debemus. Quum ergo caupon de se in septima terminetur, 4. Apho. 59. vehemensq; sit morbus, ideo si virtus sit fortis, quia durabit vsque ad septimum nihil est dandū, sicut dicit Hipp. primo regim. acut. 43. Verum est, vt in eo com. dicit Gal. quod raro est qd virtus sit fortis tantum, vt possit sine alicuius rei exhibitione durare vsq; ad septimam, & tunc oportet dare ptisanam. Quum ergo & nos tempore nostro non sciamus præcisum terminum status, & si sciremus, sæpe impeditur propter errores, quos sæpe astantes, & egri committunt, & si tenuissima diæta vteremur, esset forsan necessarium cibare in statu, quo nihil perniciosius est, 2. regim. acut. 46. tunc enim tenuissima diæta vti debemus, primo Apho. quinto, & sic est melius aliquid dare, & error est minor. Verum est, qd in ipso principio, quando volumus videre constantiam virtutis, vsque quo poterit durare vti possumus tenui diæta, si ignoramus ægritudinem, qd si erit nimium tenuis, poterimus corrigere, ipsam in grossando, secundo regi. 37. sed cognita natura egritudinis, & virtutis, ordinando regimen vsque ad statū, est melius declinare versus grossum, quàm versus tenuem, primo Apho. 5. Debemus autem præscripta diæta in ordine ad statum semper procedere attenuando, & in statu vti tenuissima diæta, sicut in cura tertianæ ex authoritatibus Gal. dictum est, cibi autem sunt dandi hora minoris afflictionis, si paroxysmi habent aliquos tepores, quod si semper eodem modo affligant, est eligenda hora consueta, maxime si sit pars frigidior diei, 11. de Ing 5. in inuasiōe autem morbi non est cibandum, primo regi. acut. 45. Cibi autem, qui debent dari, sint humidi, si est possibile, vel saltem in potentia, pri-



primo Apho. 16. conuenientior cibus, qui dari possit, est ptisana, quia omnes habet intentiones, quæ considerantur in febribus acutis, primo regim. acut. 18. modo præparetur, sicut docet Gale. secundo de alim. cap. de hordeo, & in libro de ptisana, q̄ si eger illam abhorreat, poterit vti farre cum modico aceti, primo regim. acut. 43. vel panatella, primo regi. acut. 18. & primo ad Glauco. de cura feb. continuæ cum accid. pariter dicit Gal. ibi poterit sumere sorbitionem ex halica, verū est q̄ valent tantum vt cibi, dicit ibi Gale. ex oleribus poterit dari lactuca post ipsam, quarto de tuend. san. laudat Gal. cucurbitam post blitum, possunt dari pisces saxatiles, primo regim. acut. 27. Acetosa omnia non conueniunt, excepto oxymelite, primo regi. acut. 18. nisi esset fluxus ventris, vel febris pestilentialis, pariter non sunt danda salsa, nec acria, quarto regi. acut. octauo Aph. carnibus, ab ouis, & similibus cibus maioris nutrimenti est abstinendum, nisi esset virtus multū debilis, quia tunc possumus dare contusum ex pullo gallinaceo, vel perdice. Vinum non est dando, nisi sit in declinatione, vel sit aliquod accidens, quod vrgeat, sicut syncope, & quæ narrat Gal. primo ad Glauco. de cura feb. continuarum cum accid. Quod si vrgens, & clamosa sit sitis, est danda aqua mellis, cum paucis tamen melle, & zuccharo, modo non bilescat in stomacho, primo ad Glauco. de cura continuarum sine accidentibus conueniunt postmodum alia, quæ diximus, quando loquebamur de siti auferenda. Tertio est motus & quies. Debet æger, quantum potest, quiescere, quia quies facit ad digestionem, & minus se mouere quàm sit possibile, quia sic etiā impeditur somnus, qui est necessarius, vt dictum est in declinatione debet vti debito exercitio, ventre vacuo, vt excrementa tertiæ di-



## Mathei Curtii

digestionis excernantur, quòd si non possit deambulare, supplendum est cum frictionibus. De vigilia & somno dictum est, quoniam maxime somnus cōuenit, ideo quando excedunt vigiliæ, debemus ipsum somnū prouocare cum his quæ dicta sunt. Quinto sunt ea, quæ excernuntur, de quibus etiam dictum est, curando q̄ omne superfluum excernatur, & si sit superfluus fluxus sanguinis narium, vel ventris, debemus eum sistere, vt dictum est. Sexto sunt accidentia animi, quæ si sunt immoderata, virtutem prosternunt, ideo ea omnia vitare debemus, maxime quæ exiccant, & calefaciunt, sicuti ira, tristitia, & similia, & hæc quo ad curam sufficiunt.

### De cura Febris sanguineæ.

Febris sanguinis, quæ synocha dicitur nono de Ing. secundo, à sanguine fit, vel tantum ebulliente, non putrescente, & sic synocha sine putredine dicitur, & inter ephemeræ reponitur, nono de Ing. in principio, vel fit ab ipso sanguine putrescente, & dicitur synocha cum putredine, 9. de Ing. 4. & hæc fit cum tota massa sanguinea putrescente, 9. de Ing. 3. & quod hanc febrē à sanguine putrescente concedat Gal. patet, secundo de diff. feb. 9. & sic ipsam docet curare, 9. de Ing. quarto. Verum est, q̄ esse pura & simplex non potest, sic quòd etiā cū aliquibus signis cholere non appareat, secundo de Crisi. 12. & hoc decepit Auic. in prima quarti tract. secundo cap. 43. sunt tamē simplices istæ febres eo modo quo sumit Hippo. 3. prognost. secundo, scilicet puræ, & sine sequis accidentibus, sicuti ibi vocabulum exponit Gal. quod dicit Gal. secundo de diff. feb. nono, & istæ cum aliis non complicantur febribus, sicuti colligere possumus, secundo de diff. feb. 8. Sunt autem in triplici



plici differentia, quædam enim semper augendo procedunt, & dicuntur epacmasticæ, quædam eundem servant tenorem vsque ad finem, & dicuntur homotonæ, quædam semper procedunt declinando, & dicuntur paracmasticæ, 9. de Ing. 4. secundo de Crisi. 6. Fiunt autem istę febres in corpore sanguineo, corpulento, carnosio, calidis excrementis redundante in ęstare, & natura calida, non in gracili, & frigido corpore, ęrate & complexione frigidis, 9. de Ing. tertio, & hæc vt plurimum in septem diebus terminantur, 2. de Crisi. sexto. Cognoscitur autem istę febris, q̃ pulsus habet maximos ęquales, vehementes, secundum q̃ maior est febris, 9. de Ing. 30. Item est continua vniformis, 9. de Ing. 4. calorem habet mitiorem, quàm febres cholericę & etiã alia accidentia, 2. de diff. feb. 9. maxime ea quę sine putredine, in qua non est multum mordax calor, nec à naturali remotus, 9. de Ing. 4. inuadit sine rigore, quia hoc est commune omnium continuarum, 2. de Crisi. 6. vrinam habet nõ plurimum in crassitie, & colore à naturali recedentem, 9. de Ing. 4. & hæc omnia signa sunt inseparabilia à synochis, & ex eis fit vnum signum proprium, & inseparabile, & conuenit vtriq; synochę, excepto q̃ si nõ sit synochus cum putredine, addit notas putredinis, quod cognoscitur ex lotio, pulsu, & calore: ea enim habebit lotium magis à naturali remotum, pulsum frequentiore, & secundum systolem, calorem mordaciorem, 9. de Ing. 3. in cura huius febris quum non differat à causone, nisi q̃ remissiora habet accidentia, & nisi secundum magis & minus, 2. de Crisi. sexto ideo parum à cura causonis est variandum, sic tamen est procedendũ, sicut fecit Gal. 9. de Ing. quarto, quũ synocha de remotione causę indicet, & de infrigidatione, indicatione sumpta à morbo, quę sepe contraria

G

indi-



## Mathei Curtij

indicant remedia, 9. de Ing. quinto, ideo optimum remedium in huius febris cura est phlebotomia vsque ad syncopim, 9. de Ing. quarto, quæ si non fiat, male possumus vti aliis remediis, 9. de Ing. quinto, hæc enim, vt dicit Gal. primo Apho. 23 & 9. de Ing. quinto, causam aufert, & totum corpus refrigerat, quam post sepe sequuntur bilis vomitus, sepe alui fluor, & sudores totius, hinc sepe ex hoc solo remedio tollitur febris, quare ea nihil est naturæ iocundius, nec utilius. Quum ergo occurrit talis febris, si eger beneficium habet ventris, nec humores in stomacho crudos, vel materias in meseraicis corruptas, quia tunc deberet vti clysteri, vel lenituo, vt in causone fienda est phlebotomia vsque ad syncopim, si vires sint ualide, & corpus robustum, vnde debemus videre, an sanguis mutet colorem an velociter & cum impetu fluat, & tenendo pulsum in manu videre an virtus constet. Sanguine enim colore non mutante, fortiter exeunte, & virtute perseverante, est perseverandum, mittendo sanguinem vsque ad syncopim, vt etiam dicit Gal. in lib. de phlebotomia, q̃ si non sic fortiter exeat, vel timeamus ne virtus labatur, sic q̃ leuari amplius non possit, tunc est melius vires multiplicare, sicuti 9. de Ing. quarto, dicit Gal. aliter forsan non febrem, sicut fecit Gal. sed egrum iugularem: facta phlebotomia post duas horas, vt virtus restauretur, dandus est cibus, & post curare oportet, vt eger quiescat, demum tertia die potest lauari. Sic enim faciendo, sicut ibi fecit Gale. in primo egro, forsan sine alio remedio eger liberabitur, dando cibos conuenientes, & vtendo eo regimine, in sex rebus non naturalibus conuenienti, & præsertim in cura causonidis, & quoniam hic nō est humor putridus, qui forsan reduci potest ad benignum si peccat, & hoc facere debemus



bemus, vt patet in libro de constit. artis Med. 19. & hoc fit attenuando humores si nimium grossi sint, vel in crassando si sint tenues. Ideo hoc in ista cura facere debemus, vt hic dicit Auic. Attenuabimus etiam grossum sanguinem, vtendo incidentibus, vel subtiliantibus, vt oxymelite, vt syrupis, & aquis aperientibus, vt faciendo syrupum sic, Recipe oximelitis simp. vel syrupi acetosi vnc. 1. syrupi de duabus radicibus vnc. 5. aquarum foeniculi & cichoreę ana vnc. 1. & sem. q̄ si sint tenues, ingrossentur, vtendo cibis crassi nutrimenti, sicut fecit Gale. 11. de Ing. sexto, & si declinant ad igneitatē, vtendo rebus frigidis, vel intus sumptis, vel extra applicatis. Quod si sit synocha cum putredine, etiam premissio clysteri vel lenitiuo, idest necessarium, deinde viribus valentibus, & etate consentiente veniendum est ad phlebotomiam, quę vsque ad syncope fieri debet, sicut in secundo infirmo fecit Gal. nono de Ing. 5. Verum est, q̄ ipse 9. de Ing. 14. dicit, quod non adeo copiosa phlebotomia est fienda in putridis, vt restet sanguis, pro digerendis alijs humoribus, & vt alia remedia possint applicari (forsan id dicit) quando dubitamus de viribus, est tamen tutē procedendū, fienda quidem copiosa, vel iteranda, facta phlebotomia, dabat Gal. mulsam, post per horam, ptisanam, vt eger reficeretur: ea autem febre perseuerāte, apparentibus signis manifestę digestionis, danda est aqua frigida vsq; ad saturitatem, sicut iubet Gale. decimo de Ing. 6. & quoniam pars sanguinis putrefacta iam ferē habet naturam cholere: ideo febre perseuerante post phlebotomiam est procedendū cum prouocantibus vrinam & sudorem, cum clysteribus, & tandem apparentibus signis completę digestionis, si natura non tentet euacuare, procede cum iuuantibus eam, post cum confortantibus



## Mathei Curtij

cantibus stomachum, cum vnctionibus, cum frictionibus, & reliquis sicut dictum est in cura causonis. Regimen quoque in sex rebus non naturalibus eodem modo sit, sicut in causone, vel differt secundum magis & minus, secundum intensiorem vel remissiorem febrem. Accidentia quoque, quę hęc febrem sequuntur, vt sitis, vigilię, & aliquando somnus, fluxus sanguinis narium & similia, sunt curanda sicut accidentia causonidis, & hęc pro ista cura sufficiant.

### De Quotidiana pura, & eius curatione.

Quotidiana pura intermittens febris est ex phlegmate, 2. de diff. feb. secundo, putrescente, quia aliter non faceret febrem, 2. de diff. feb. quinto, transmissio à venis, extra venas, 2. de diff. feb. vlt. vel ab vna parte corporis ad aliam, primo epid. in secunda anni constitutione, affligit quotidie, 2. de diff. feb. 4. aduenit autem etatibus, naturis, anni temporibus, & temperamentis humidioribus, pueris, & maxime infantibus pituitosis, habitibus crassis, otio deditis, pariter & crapulis, & ebrietatibus, balneis assiduus, præsertim post cibum, aduenit quoque temporibus hybernis, locis humidioribus, in constitutionibus humidis, & aliquando populo communicatis, primo ad Glauco. cap. de signis quotidianę intermittētis, secundo de Crisi. 5. aduenit quoque exercitatis post cibum, 1. epid. in secundo infirmo. Raro est, quę ea adueniente os ventriculi & hepar non patiantur, 2. de Crisi. 5. accenditur autem sicut ignis in lignis viridibus, inde accessionis spatium est longius cessatione, raro ad perfectam terminatur in febricitationem, 2. de diff. febr. 4. Huius febris signa sunt, caliditas humida cum quadam acredine, quando perseue-

rat



rat tactus, fumosa, commixta cum multo vapore, 1. ad Glauco. de signis quotid. intermittentium, quæ cum difficultate incenditur, & suum augmentum est longum, 2. de diff. febr. 4. non est intensa, sic q̃ corpus adurat, vel qui denudare cogat, 2. de Crisi. 5. & est inæqualis, sic q̃ videtur per cribrum exire vapor, 2. de diff. feb. 9. & 10. Incipit hæc febris cum extremorum frigiditate atque horrore, potiusquàm rigore, 2. de diff. feb. 4. 2. de Crisi. 5. qui eam patiuntur, non magnam habent sitim, linguam habent humidam, vomitus pituitosos, & quæ excernuntur, sunt frigida, humida, & cruda, aquosa & pituitosa, & vniuersum corpus abūdat his superfluitatibus, non terminatur cum sudore saltem in primis paroxysmis, vrinæ in principio sunt albæ, & tenues aut crassæ, aut turbulente, aut turbide, 1. ad Glauco. de signis quotidianæ intermittētis præcedunt acidi ructus præcordia tumescunt & inflantur. Color cum palliditate fit albus, à stomachi & hepatis lēione non absoluitur, 2. de Crisi. 6. Et quoniam phlegmatis quatuor sunt species, vitrem scilicet, dulce, acidum, & salsum, 2. de diff. feb. 6. & ab istis omnibus potest prouenire ista febris: ideo omnia talia phlegmata faciunt sua signa significantia differentiam passionis. Hæc tamen, quæ secundum Gal. posita sunt, significant ipsam passionem. Cuius curam in vniuersali componamus, ad particularia non descendentes, sicuti nec fecit Gale. Sed qui naturam phlegmatis nouit, eorum etiam signa cognoscet & curam. Curando hanc febrem sic est procedendum, quum vt dicit Gal. 1. 1. de Ing. decimo, in putridis omnis indicatio sumatur, vel à febre, vel à putredine. Indicatione sumpta à febre debemus curare, vt quæ facta est auferatur, & quæ futura est non fiat: pariter indicatione sumpta à putredine debemus curare,



## Mathei Curtij

vt quod iam putridum est auferatur, & quod imputre fieri est aptum, non putrescat. Cum hoc est consideranda constantia virtutis an valida sit, sic q̄ durare possit in applicatione remediorum, 11. de Ing. 9. & quando est valida, audacter sunt applicanda remedia: ab horū igitur cura est incipiendum, modo non sit aliquod symptoma, quod ad se totam curam trahat, quoniam tunc ab ipso esset incipiendum, 11. de Ing. 11. vt si in hac febre esset syncope, sicut sepe aduenit esset incipiendū à remotione ipsius, quia ipsa magis vrgeret, supponendo tamen q̄ tale symptoma vt ordinatè procedamus, non adsit à febre, & à putredine incipiemus, post de ipsis dicemus symptomatibus, Febris ipsa, vt febris est de frigidis indicat & humidis, 9. de Ing. 14. Ceterum, quoniam vt dicitur primo ad Glauco. in cap. de signis quotid. intermittentium, quū corpus ista febre febriēs, sit humidum & abundet superfluitatibus humidis & pituitosis quę frigide sunt: ideo pauca sumitur indicatio ab ista febre, sed tota ferè cura sumitur ab ipsa putredine, quę huius febris causa est. Putredo, vt dicit Galenus 11. de Ing. octauo, fit à præternaturali calore quando corripit humidum corporis. Arripitur autem, quando calor naturalis debitam non habet euentationem, densitas pororum, constrictio corporum, humoris abundantia, vel eius crassitudo, & lentitia, quum res istę præter naturam sint: ideo de sui remotione indicant, quod cum suis sit contrariis, 11. de Ing. 3. opposita autem densitati, sunt rarefacientia, constrictioni scindentia, humoris abundantię, euacuantia, crassitudini rescantia, lentiori abstergentia. Si ergo causam putredinis auferre volumus, his vti debemus: est ergo intentio principalis auferendi istam obstructionem: auferitur autem obstructio, dicit Gal. 11. de Ing. 11. curando

vt

vt quod est  
quod est  
do humo  
intencio  
tio. Ali  
facere  
res non  
secundo  
ter. Ide  
di. sic q̄  
modu  
fudon  
& sic  
& de  
intenc  
muri  
fi aliq  
educe  
materi  
ros ape  
mus vt  
falsis  
Gai  
vult  
nat  
qu  
mo  
qui  
mal  
mal  
vero  
gou  
tur. q̄



ut quod est obstructum deobstruatur, & propulsando, quod est facturum obstructionem, quod fit compescendo humorem obstructum, & sic quod fuit ultimum in intentione, est primum in opere, scilicet humorum ablatio. Alioquin non solum non iuuaremus, sed maiorem faceremus obstructionem. Ceterum quoniam humores non debent educi, quin sint rescati, & apertæ viæ, secundo Apho. 9. & in lib. quos & quando purg. oportet. Ideo primo sunt rescandi humores, & abstergerendi, sic q̄ viæ etiam aperiantur, 11. de Ing. decimo, post modum euacuandi sunt per vomitum, per vrinam, per sudores, euacuatis humoribus auferenda est obstructio, & sic euentatur calor naturalis, & tollitur putrefactio & demum febris. Sic igitur febris quæ erat prima in intentione, erit vltima in remotione. Primo ergo utemur incidentibus & aperientibus & abstergentibus, & si aliqui sint humores, qui sint in viis, qui adduci possunt educemus: post apertis viis, & rescatis humoribus materiam aliquam euacuabimus,educta materia, poros aperiemus, & obstructionem auferemus, sic curabimus ut calor naturalis euentetur: quare primum putrefactio, demum ipsa febris auferetur, & quoniam ut dicit Gal. 11. de Ing. 11. est semper curandum ut virtus stet valida, ideo post ordinabimus regimen in sex rebus non naturalibus. Vltimo quoniam sæpe hanc febrem sequuntur multa symptomata, non parui facienda, quomodo corrigi debeant, dicemus: quum igitur humorum qui peccant in nobis, quidam multitudine, quidam alia malignitate peccant, & sic eorum qui multitudine, vel malignitate peccant quidam sunt corrigibiles, quidam vero non: qui corrigibiles sunt si est possibile, ad benignum reduci debent, & hoc fit quando taliter reducuntur, quod nutrire possunt: qui autem incorrigibiles sunt



## Mathei Curtij

educi debent, lib. de constit. art. 19. & quoniam phlegmata, quæ in stomacho generantur, vt in de cholera nigra cap. 8. in sanguinem conuertuntur in hepate, & sic nutriunt: ideo in ista febre, quoniam aliqui etiam possunt esse humores qui peccant multitudine, ideo si corriguntur in bonum conuertuntur nutrimentum. Ideo Doctores iubent vt primis tribus diebus, vtêdo tenuissima diætâ, videamus, medicamêta nō exhibêdo, an humores ad benignū reduci possunt, sic q̃ ægritudo tollatur. Quādo ergo dicit Auic. nō scimus præcisum statū possumus primis tribus diebus nihil dare, & videre an ægritudo sola diætâ possit curari. Vnde Gal. nō dat oxymelitē, & prouocâtiâ vrinā, nisi post tres dies, 1. ad Glau. de cura quotid. intermit. Poterimus ergo, iudicio meo sic procedere primo, quoniā multa sunt phlegmata in vêtriculo, vti clysteribus, vt inde diuertatur faciêdo, & in eorū decoctione addêdo cartamū: in potu quoq; dabimus aquā mellis cū hyssopo, sicut faciebat Gal. 12. de Ing. 3. sic enim parū dabimus, vt si erūt materię aliquę abstergendę, & educêdę educatur, tūc etiā poterimus vti frictionibus, sicuti faciebat Gale. 12. de Ing. tertio, vt quę sunt in partibus cutaneis resoluantur, & digestio confortetur, non propter educendam eam materiam, quę est in venis, vel in stomacho, quia ratione earum non cōuenirent frictiones in principio: frictiones autem debent fieri incipiendo à partibus inferioribus, ad partes superiores cum panno aspero, vt caro calefiat, & satis longē, q̃ si videatur sequi lassitudo, possumus inungere oleo aliquo rariscente, vtebatur Gale. oleo sabino, possumus vti oleo in quo fuerit decoctum anethum in duplici vase: aliter enim resoluitur virtus rei decoctę, octauo de Ing. 5. vel oleo chamomelino, post inunctiones oportet eas deter-



tergere, & iterum fricare, incipiendo deorsum, ascendendo, & demum ipsam fricando, sic enim etiā diuertitur materia quæ posset facere syncopim. In hoc tempore, si virtus sit fortis, & videamus multam materiam in stomacho, in intestinis, in meseraicis, quæ per clysteres educi non possit, possumus vti lenitiuo, puta dādo vnc. 1. cassiæ cribellatæ. Sed quoniam materiæ sunt rebelles, & sic facile educi non possunt, possumus addere stimulū puta drag. 1. 5. elect. indi maioris, vel drag. 1. Agarici trocischati quod si natura tentet vomitum, quoniam, vt dicit Gal. quarto de cura quotidianæ intermittētis, vomitus maxime conuenit in hac febre, debemus ipsum non impedire, imò iuuare dando leuia vomitiua sicut cū aqua hordei calida miscendo vnc. 1. syrupi acetosi vel aceti, vel ponendo digitū in gulam, vel tingendo pennam in oleo, & imponendo in gulam, his factis, si virtus sit fortis quoniam in omni putrida, vbi materia est multa debet alleuiari cū phlebotomia 11. de ing. 14. Ideo poterimus mittere sanguinem, non tamen in multa quantitate, vt relinquatur sanguis pro digestionē aliorum peccantium humorum, poterimus mittere vnc. 6. vel magis, vel minus secundum conditiones, de quibus iam est dictum. His peractis, quoniam est intentio de apertione viarum, & refectione aliorum restantium humorū. Ideo ad digestiua procedendum, & ad prouocantia vrinam, sicuti dabat Gal. oximel, primo ad Glauc de cura quotidianæ intermittētis. Conuenit etiam mel rosatum, sicuti dicit Auic & syrupus acetosus, & aqua endiuix, & apii, vnde tunc poterimus sic dare syrupum, recipe oxymelitis simp. vel syrupi acetosi. vnc. 1. mellis rosati collati vnc. 5. Aquarum endiuix, & apii ana vnc. 1. & semp. misce pro syrupo, sic enim digerimus humores,



## Mathei Curtij

res, & prouocabimus sudorem, & vrinam vsque ad septimam, & consonum erit, quod tunc transactum sit principium. Quod apparebit, si apparebunt signa, manifestæ digestionis, verū est vt dicit Gal. in de quatuor temporibus paroxysmorum, quod istę febres habent etiam tempus inæqualitatis inter principium & augmentum: transacta ergo septima, est habenda dicit Auic. cura de stomacho, quia vt plurimum qui febriunt hac febre, habent læsionem stomachi, & tunc poterimus intus dare aliqua stomachum confortantia vt miuam cotoñcorum, vel syrupum de mentha, vel facere masticationem ex mastiche, mentha, & aniso: hoc etiam in tempore incipient vti fortibus digestiuis, & tunc poterimus facere decoctionem ex foliis apii, fœniculi, ex capillis veneris, cum radicibus squinanthi, dicit Auic. & vt Gal. primo ad Glau. de cura quotidiana puræ. In hac cura debemus vti efficaciter incidentibus, poterimus addere pulegiū, origanum, calamentum, hyssopum, ana man. i. in sufficienti quantitate aque, & facere decoctionem vsq; ad consumptionem tertiæ partis, & post facere colaturam, & de ea aqua dare vnc. 6. calida, cum paucō zuccharo. Possumus quoque dare in forma syrupi acetosi, vel oxymel. simp. ponendo syrupum de duabus radicibus, puta, Rad. syrupi de duabus radicibus vnc. i. mellis rosati vnc. 5. Aquarum Apii, fœniculi, Absinthii propter stomachū, vnc. i. misce pro syrupo. sic semper fortificando digestiua, procedemus vsque ad statum. Apparentibus autem signis manifestæ digestionis, si æger sit promptus ad vomitum, maxime si eam viam tentet natura, poterimus vti vomitiuis, & facere vt vomat, cum debili vomitiuo si est possibile vt cum aqua hordei calida, cum vnc. i. syrupi acetosi, possumus post deuenire ad fortiora



tiora vomitiua. Debemus ergo vt dicit Gal. ad Glauc. in hac cura, primo vti cibis incidentibus, post radicibus, & post cibum, prouocare vomitum, vt post cibū dando infusionem raphani, & similia: vomitiua enim conferunt in hac cura. Poterimus quoque sic facere vomitiuum, Recipe feminis anethi vnc. 2. radicum raphani. vnc. 3. bulliant in sufficienti quantitate aquæ, & de ea bibat vnc. 4. tepida. possumus quoq; addere paucum olei communis, sic quoque procedēte ægritudine versus statum, poterimus vti fortioribus clysteribus, addendo vnc. 5. hieræ simp. vel benedictæ drach. 3. diaphiniconis drach. 2. in decoctione ponendo turbitum, vel hyssopum vel cartamum. Quod si etiam videtur materia multa, & appareat manifeste digesta, tunc etiam leui pharmaco licet vti, vt drag. 1. Agarici trocischati, drag. 1. Rhabarbari, drag. 6. cassiæ, verum si est possibile, melius est expectare completam digestionem. Quando autem versus statum procedimus, factis iam istis euacuationibus dicit Galen. primo ad Glauc. in hac cura est habenda cura de ventriculo, præsertim de eius ore, & quoniam vt dicit Galen. 11. de ing. 15. emplastra, cataplasmata, iunctiones, & similia localia, in principio non sunt applicanda, aliter materia trahitur ad locum, & fiunt apostemata, ea tamen digesta, & in parte educta hæc possunt applicari. His autem factis poterimus inungere stomachum cum oleo Nardino, vel de mastice, pariter possumus facere emplastra, & applicare extra quæ calefaciunt, & resoluunt, si febris sit nō intēsa. Cōpleta aut digestionē possumus dare Theriacā, vel Mithridationē si in proposito reperiuntur. Quātitas aut theriacæ debet esse sicuti vna auellana, vel faba agrestis, dicit Ga. & dabimus ad plus drag. 1. per horas duas ante accessionē, sicuti dicit Gal.



## Mathei Curtii

Gal. in lib. de Theriaca ad Pisone, de quartana. In hoc tempore si non euacuat perfecte, vel per vomitum, vel per secessum, vel per sudorem, vel per urinā sic quod sequatur declinando, & tollatur febris, nihil est quod, quo ad hoc, facere debeat medicus, dando solutium, puta drag. 1. & sem. Agarici trociscati drag. 1. Rhab. infundendo in aqua cichoreæ, addendo parum vini albi drag. 1. spicæ, & post 12. horas, faciendo leuem decoctionem, & fortem expresfionem & colaturam, in qua dissoluendæ sunt drag. 6. cassiæ cribellatæ an drag. 2. elect. indi maioris, ponendo in fundo vasis vnc. 1. iulebrosati, & seruando omnes regulas, de quibus supra. educta autem materia his ingeniis, restat vt curemus, ne alia materia putrescat, & hoc fit vt dicit Gal. 11. de ing. 18. faciēdo vt æger faciat debita exercitia, quod si ipsa facere non possit, supplebimus cum aliis vt dictum est, & confortabimus membra principalia, vt calor putredinalis in totum auferatur & naturalis recuperetur, & confortetur. Hæc quantum ad indicationem sumptam de remouendis causis putridis, cum medicinalibus, & de hac cura multa diximus sumpta à Gal. 11. de ing. dum curat synocham cum putredine, quoniā vt melius explicaremus in cura synochi cum putredine, processimus sic fecit in actu practico ipse, nono de ing. & quoniam habemus pauca à Gal. de cura huius febris, illa quæ dicit ipse de synocha cum putredine possunt vt plurimum applicari aliis putridis, idcirco quæ ipse in synocha cum putredine dixit hinc febris applicuimus, pariter cum ista febris ab eadem causa fiat, à qua syncopalis humorosa, ideo multa, quæ de ea dicit Gal. 12. de ing. hic retulimus. Restat modo vt sex rerum non naturalium regimen perscribamus. Aer primo non debet alterari versus frigidum & hu-  
mi



## De Feb. curatione 47

midum, quoniam complexio ipsa frigida est, & humida. & febris non est multum intensa, & quoniam intentio est resoluendi, ratione causæ melius est ut declinet versus calidum, & siccum, quàm contra. Nam si est possibile, debet esse temperatus. Cibi dicit Auic. non debent esse pulli, vel panis, nisi sit dubium de virtutis imbecillitate, quoniam tunc concedi possunt oua, & contusum. Possumus ergo sic procedere, in primis diebus quoniam sunt phlegmata, quæ forsan per inædiā corrigi possunt, uti tenui diætā, ut dando tantum panis, vel ut dixi de mente Gal. 12. de ing. tertio aquam mellis cum hyssopo, vel ptisanam cum modico piperis, transactis autem primis diebus saltem septima, videro quod ægritudo est multum duratura, poterimus dare carnes parvorum animalium, & pullorū, & oua forbilia: debent autem dicit Gale. primo ad Glauc. in hac cura omnes cibi esse incisui, unde possumus condere ferculum cum mentha, cum apio, cum foeniculo, cum rebus salis, & similibus, debemus autem post primos dies ingrossare, & semper post attenuare, versus statum procedendo, & seruare omnes regulas, de quibus in de cura tertianæ puræ, hora autem cibandi est post tempus in febricitationis, saltem per quatuor horas ante principium paroxysmi. Quod si non sit tantū tempus debemus videre an peior sit status, vel principium, & cibare in hora meliori 11. de ing. ultimo, in ista febre quia semper peius est principium, est melius cibare in fine status. Potus autem vini apparentibus signis manifestæ digestionis, concedi potest debilis, & aquosus, post procedente digestionem, dari potest fortis. Potus aquæ frigidæ non conuenit, potest coqui addendo res incidentes, & subtiliantes, ut radicē apii, vel foeniculi, & quoniam hic non est intensa febris, vel  
fitis



## Mathei Curtii

fitis purum debemus dare. Somnus, & vigilia dicit Gale. 12. de ing. tertio conueniunt, somnis enim concoquit, vigiliæ digerunt, & istis intentionibus indigemus in hac cura. Motus quoque, & quies conuenit, quies ratione digestionis, motus ratione resolutionis, & ideo in tempore debito debet vti debito exercitio, quod si ipsum facere non potest, supple cum frictionibus, vt dixi: debet autem pati inædiam, quoniam multum confert, vt dicitur 12. de ing. tertio. Ista corpora patiuntur longum ieiunium, & sic curare debemus, vt omnia superflua excernantur sicuti supra dictum est. Accidentia animi tamen cōueniunt quæ calfaciunt, vnde ē q̄ æger aliquo modo irascatur non multum refert, quia tamen quum accidentia excedant, virtutem prosternunt, ideo debemus curare, vt ea euitet æger. Veniamus modo ad correctionem accidentium, quæ istā febrem sequitur, quoniam ista febris multum durat, & materiæ crudæ, & frigidæ membra principalia debilitant, nam sæpe in ista febre sequitur debilitatio stomachi, præcipue oris eius, vnde eius maximam habere curam debemus, sicuti dicit Galen. primo ad Glauc. de cura quotidianæ intermittentis, maxime quando propinquatur status, tunc ergo quia factæ sunt plures euacuationes, & corpus non est plenum, per interius, & exterius poterimus confortare stomachum, puta cum oleo chamomelino, vel de mentha, vel de mastice, vel ex illis faciendo emplastra, per intus poterimus vt dixi dare syrupum de mentha, & exhibere quæ confortant digestionem, vt cinamomum, piper, & poterimus condire fercula cum istis speciebus, & cum mentha, & applicare extra absinthium, & mentham, secundum artem. Sequitur quoque aliquando hepatis debilitas, poterimus quoque in declinatione post omnes  
eua-



euacuationes confortare cum speciebus tria sandalorum, diarhodon Abbatis, Aromatici rosati cariophilati, faciendo ex istis cum zuccharo morsellos, & dando omni die ante cibum, post dando vnc. 3. aquæ boraginis, buglosæ. poterimus dare zuccharum rosatum, sicuti etiam poterimus fomentare alia membra, si ea videamus debilitata. Vomitus in ista febre multum confert, vt dixi. Vnde si non excedat, impediri non debet, q̄ si excedat, debemus confortare stomachum cum eis, quæ nunc diximus: & tunc poterimus etiam eo perseverante, facere frictiones, trahendo deorsum, ligare extrema cum ligaturis dolorosis, maxime pedes, & ipsa calefacere: sequitur quoque aliquando superfluous fluxus ventris propter membra, quæ debilitata sunt, & tunc dicit Galen. 12. de ing. tertio oportet plus decoquere mulsam, q̄ si plus durat loco mulsæ est dandus cremor ptisanæ, quod si etiam perseverat, nutriet cum sorbitione halicæ, oportet post videre defectu cuius sit fluxus & confortare membrum mandans, & vti clysteribus, & aliis quæ adducunt doctores in cura fluxus. In istis quoque febribus, aliquando est dolor capitis, & tunc si nimium infestat debemus, vti fortibus frictionibus trahendo deorsum, ligare extrema, quod si perseverat, oportet applicare cucurbitulas siccas spatulis, & ponere extrema in aqua calida, & eo adhuc perseverante, dicit Auicen. maxime si factæ sint euacuationes, oportet embrochare caput cum aqua camomeli, & cum talibus resoluentibus. Aliquando quoque in harum febrium principio est frigus maximum maxime quando est à phlegmate vitreo, & tunc oportet ante paroxysmum per duas horas vti bonis frictionibus, & dare in potu aquam calidā, & possumus inungere corpus cū oleo de costo post frictiones.



## Mathei Curtij

nes, & post abstergere quia aliter faceret, opilationes. Quod si sit prostratio appetitus, oportet confortare stomachum cum eis, quæ dicta sunt, & dare cibos qui placeant ægro, etiam q̄ aliquo modo sic ægro non cōueniant, debemus dare capones, oliuas conditas, pisces salitos & similia quæ appetitum incitant, sed in pauca quantitate. Quòd si sequitur oppilatio debemus uti appetitiuis, si cachexia & inflatio eis, quæ adducunt Doctores in propriis curis, & hæc dicta sufficiant.

### De Quotidiana continua, quæ dicitur Latica.

Febris Quotidiana continua, quæ dicitur Latica ex phlegmate fit intra venas putrescente, secundo de Crisib. 6. quæ ea habet signa, quæ intermittens, nec cum rigore incipit secundo de Crisib. 6. & 12. & est similis hectice, dicit Auic. prima quarti tract. 2. cap. 5. Quantum ad curam non differt, ait Auicē. nisi quòd ista non requirit res adeo subtiliātes sicuti interpollata, & ideo cibi primo debent esse minus calidi, & in minori quantitate, quoniam ægritudo erit breuior, pariter & rebus aliis non naturalibus debemus uti, sic q̄ resoluant, sed minus quàm in intermittente, non dabimus cum potu hyssopum vel foeniculum, sicuti in intermittente, digestiua quoque non debent esse adeo fortia, ideo sufficit facere syrupum sic: Recipe syrupi acetosi, vel oxymel simp. vnc. i. mellis rosati vnc. 5. aquarum foeniculi, & apii, vel radicum eorum ana vnc. i. & sem. & sic cum istis syrupis debemus digerere: clysteria quoque sufficiunt communia. Conueniunt lenitiua sicuti in intermittente, ac demum solutiua. Crederem quoque, quum ægro ista magis referat, quàm intermittens, quum materia sit intra venas, q̄ audacius & in maiori quantitate



tate deberemus mittere sanguinem, modo virtus debilis, vel ætas non patiatur, vel alię conditiones simul non impediunt, in reliquis nulla est differentia, nisi secundum magis & minus: ideo quę dicta sunt in intermittente, hic etiam applicentur. De syncopi, quę sequitur in cura syncopalis humorosę dicemus.

## De cura Epiale, &amp; Liparię.

Diuerso modo sumit hos terminos Gale. & Auicē. Galenus enim secundo de diff. feb. 6. & in lib. de inęquali intemperie cap. 2. de istis loquitur, & in summa videtur velle, quod istę febres fiant maxime à phlegmate, quod Praxagoras vitreum appellat, quando pro parte putrescit, & pro parte non putridum mouetur, & hinc per totam accessionem pars putrefacta facit, vt sentiatur calor, pars non putrefacta facit, & frigus, & horrorem, quod si hoc fiat in partibus paruis alicuius partis sic, quod sensu non possumus discernere, quę sit pars, in qua fit calor, & in qua est frigus, tunc dicitur Epiala, sic quando simul ponimus mel & absynthium in lingua, & non possumus discernere subitum dulcedinis, à subito amaritudinis, sicut dicit Gale. tertio de simpl. 15. quod si partes sint diuersę, sic quod præcisa cognoscemus, vbi est caliditas, & vbi est frigiditas, sic dicitur Liparia, vt si interiora calecant, & exteriora frigescant, vel manus caleseat & pes frigescat, vt patet in lib. de inęquali intemperie cap. 2. & oportet q̃ in istis febribus per totam accessionem duret rigor, & calor: aliter cholericæ diceretur, etiam de tertio genere, dicit Gal. ibi, est ergo secundum Gal. febris Epiala, quando in vnaquaq; corporis parte sentitur calor, & frigus per totam accessionem, sic quod sensus non potest

H test



## Mathei Curtij

est discernere in qua parte substantiue sit frigus, & in qua sit calor: quum tamen hoc in veritate debent esse in diuersis substantiis, quia duo contraria esse non possunt in eodem subiecto precise: Liparia autem est quando discernimus subiectum caloris à subiecto algoris, & sunt istæ febres præcipue à phlegmate vitreo, pro parte non putrescente, sed moto per membra sensitiua & faciètem rigorem, qui fit tempore nostro, licet hoc non viderint antiqui, qui utebantur moderato regimine, sicuti ibi, & secundo de diff. feb. refert Gal. Secundum Auicem. vero fit Epiala, quando est phlegma vitreum in partibus interioribus, & eius pars incipit putrescere, alia non putrida, modo ratione partis putrescentis eleuatur vapor ad cor, & fit febris; & post modum descendunt ad partes exteriores, & illas calefaciunt: illa autem quæ non putrescit, & frigida est, modo occurrit aliis partibus, & eas sic refrigerat. Quare interiora apparent frigida, exteriora calida: Liparia vero fit ex phlegmate, vel ex cholera grossa, quando putrescunt in partibus interioribus, sic quod faciunt febrem, & propter eorum vaporem interiora redduntur calida, sed illi vapores non possunt partes exteriores calefacere, maxime quando in illis partibus sunt phlegmata, quæ ipsas infrigidant, & prohibent vapores calidos penetrare, pariter si eleuanter vapores frigidi à phlegmate vitreo, non putrescente, & illi calidi non sunt pauci, tunc frigidi extenduntur ad partes interiores, calescunt, & exteriores frigescent, nec est necessarium, quod in ista febre extédatur caliditas per totum corpus, quoniam illud dictum est in definitione febris, quod calor debet extendi per totum corpus, debet intelligi, modo nihil impediat. Sed hic vt dicit Auic. sunt illa phlegmata vitrea in partibus exterioribus, quæ



quæ impediuntur, vel illi vapores illorum phlegmatum, qui sunt frigidi qui extinguunt calidos, & ideo in hac febre non expanduntur per totum corpus. Post Auic. ponit aliam febris speciem, quando in vnoquoque locorum est caliditas, & frigiditas, & ista est quâ Gal. appellat epialam. Sed epiala, & liparia Auic. apud Gal. sunt lipariæ, est ergo tantum differentia in assumptione terminorum, satis tamen est quòd istæ febres, vt plurimum fiunt à phlegmate vitreo, & quòd in eis per totam accessionem durant calor, & frigiditas. Verum est quòd epiala apud Galen. differt à liparia, quoniam caliditas, & frigiditas in ipsa sunt in partibus adeo proximis, vt sensus eas distinguere nequeat: in liparia vero calor sentitur separatus à frigiditate, & sunt in diuersis partibus. Epiala vero secundum Auic. differt à liparia, quoniam in ea interiora sunt frigida, & exteriora calida, & ideo in ipsa sunt fortiora signa frigiditatis, vnde in ea vt dicit Auic. est vrina cruda frigida, & pulsus rarus & tardus, & vt plurimum aduenit omni die, & aliquando conuertitur in quartanam & tertianam, eius paroxysmus durat à quatuor horis vsque ad xxiiii. In febre vero liparia interiora calefcunt, & exteriora frigescunt, vnde non apparent signa adeo frigida ratione operationum membrorum interiorum, & ista durat plusquam hemitriteus, dicit hic Auic. & hoc videtur etiam dicere Galen. primo. Aphorif. xii. & per typhoidem intelligit istam lipariam Auic. Cura harum febrium non differt à cura aliarum phlegmaticarum, excepto quòd quum sint à phlegmate vitreo, quod est intensissime frigidū, vt dicit Galen. lib. secundo, cap. 26. quòd indigemus fortioribus calefacientibus, ideo digestiua debent esse fortiora, pariter clysteria, item solutiua debent maxi-



## Mathei Curtij

me respicere phlegma vitreum, & dari in maiori dosi, & fortiora, quia est materia difficilis educationis. Quā tum ad alia omnia conuenit cum aliis, ideo eadem remedia eodem modo quæ fuerunt adducta in cura quotidianæ intermittētis, hic sunt applicanda, & est habenda cura membrorum sicuti in ea diximus, semper tamen calidiora debent dari, vnde Paulus laudat diacalamentum, & confectionem diatrion pipereon. quum ergo quæ conueniunt dicta sint, hæc pro curâ sufficiant.

### De syncopali humerosa & ipsius curatione.

Syncopalis humerosa, fit ex humoribus multis phlegmaticis crudis qui opprimunt os stomachi. 12. de ingen. tertio sic quod sequitur syncopis primo ad Glanc. de cura continuæ cum accid. sua multitudine, vel quando incepit putrescere, & mouetur, tunc eleuātur vapores frigidi ad cor. qui faciunt syncopim dicit Auic. prima quarti tract. secundo cap. 55. & hoc maxime fit in principiis accessionum primo ad Glanc. de cura continuæ cum accid. eius signa sunt dicit Gal. xi. de ing. tertio præcordia inflata, & totus corpus inflatum magis quàm ægri naturalis dispositio exigat, color albidus, similis colori laborantium aqua inter cutem, nonnullis niger aut liuidus, scilicet plumbeus, pulsus obscurus & iuxqualis semper, secundum se totum, ali quando etiam in systole. Paroxysmus eius est sicut quotidianæ dicit Auic. cap. proprio oculi sunt virides, accidit nocte vel vesperi 12. de ing. quinto, ea enim est hora phlegmatis sexto epid. particula prima tract. 13. verum est, q̄ ea quæ est in vespere est peior, quia phlegma anticipat horam suam, & sic arguit maiorem multitudinem



titudinem huius febris. Cura quidem est difficilis, quoniam virtus est debilis, & euacuationes quæ essent necessariae, non suffert, hinc si educitur materia, virtus prostermitur, pariter si materia restat, virtutem prostermit: est ergo difficile eam curare, in eius tamen cura sic est procedendum, quando incipienda est cura, vel æger habet phlegmonem, vel aliquod aliud apostema in interioribus, vel non: si habet, iam est desperata salus, dicit Gal. 12. de ing. tertio. unde oportet mortem prædicere ad euitandam ignominiam, & non est vtendum aliquo genere medicamentorum: pariter si humores sint crudi & putrefacti, & coqui non possunt, eorum salus est desperata: si vero nec phlegmone sit, nec humores de eo putridi sint, tunc est spes salutis, & tunc potest curam adire medicus, & quando adit, vel est tempus syncopis, vel non, si est tempus syncopis, quoniam magis vrget quam febris, ideo ei est attendendum, principalis ergo intentio tunc est releuare virtutem oppressam, nihil autem est, quod magis & citius hoc faciat, quam vinum, secundo Aphor. xi. Ideo subito est dandus panis infusus in vino, xii. de ing. tertio. Vinum autem debet esse calidum natura, quod decoctionem in corpus promouet, & sic debet esse colore fuluum, substantia tenue, ætate vetus, & boni odoris xii. de ing. quarto, si in tempore, regione, & statu coeli calidis promixtum sit cum aqua frigida, si vero frigidis, cum aqua calida, & post cum calida est perseuerandum. xii. de ing. tertio quod si non sit syncope, videndum an succi crudi sint multi, & crassi, sic quæ exiguos animalis meatus obstruant, tunc illi succi nisi concoquantur, nutrire non possunt, sed virtutem grauant, & in syncopin deducunt, & sæpe homines opprimunt. Quod si non tantum grauant, quod obstruât,



## Mathei Curtij

nec onerent, sic syncopin non faciunt, sed tamen lipo-  
thymiam. 12. de ing. quinto, considerandum quoq; est  
an virtus in se sit fortis, vel debilis, vt fortioribus vel  
leuioribus vti possimus medicamentis, virtute ergo  
existente debili, & succis existentibus multis, tunc non  
est possibile mittere sanguinem, nec dare pharmacum.  
Ideo Galen. 12. de ing. tertio, iubet, vt tantum persi-  
stamus in frictionibus cum panno aspero, incipiendū  
à partibus inferioribus ascendendo, & post si sit peri-  
culum lasitudinis, inunguendo sicuti in cura quotidia-  
næ intermittentis, diximus. In hac ergo dispositione  
non vult Galen. quòd aliud faciamus, & quoniam ta-  
lia corpora possunt pati inedia multam, & illi succi  
possunt cōcoqui, & post nutrire, ideo per primos tres  
dies iubet Gale. quòd demus aquam mellis cum hyss-  
sopo vt iuuetur concoctio, & abstergantur materiæ  
multæ, & educantur virtute hyssopi, quòd si mulla fa-  
stidiat dat succum prisanæ vel oxymelitem, vel modo  
hoc, modo illud, & perseuerante constantia virtutis si  
est possibile vltra tres dies vtatur eadem inedia vsq;  
ad septimam. Sic etiam nos secundum maiorem, vel  
minorem constantiam virtutis cibabimus, tantum dā-  
do, quantum virtus potest durare, & si dubitamus de  
virtutis constantia, dabimus panatellam, vel ferculum  
ex farre semper iniungendo secum res calefacientes,  
& incidentes, quòd si virtus non sit adeo debilis, fa-  
ciendo frictiones, etiam dicit Galen. xii. de ing. tertio  
vtimur clysteribus, quòd si etiam videbimus maiorem  
virtutis constantiam, quoniam materiæ, quæ peccant,  
sunt vt plurimum in stomacho, & in venis meseraicis,  
à quibus non potest educere clyster, crederem quòd  
tunc possemus dare vnciam vnam cassiæ, vel vnc. 2.  
mannæ, quia in veritate, non multum agitant, & for-  
san



san si eas cognouisset Gal. dedisset. Crederem quidē,  
quòd istis crudis nullo modo esset fienda phloboto-  
mia, licet secus dicat Alex. lib. sexto cap. proprio, his  
rebus in principio peractis, poterimus dare oxymel  
æstate frigidum, hieme calidum, & sic cum tenui diæ-  
ta, cum clysteribus, cum digestiuis poterimus procede-  
re vsque ad septimam, in primis tribus diebus non dan-  
do cibum, nec sorbitionem, nec aquam, nec permitten-  
do, vt æger multum bibat. Post autem vt credo, quan-  
do dubitamus de virtute, est ordinanda grossior diæ-  
ta, etiam post semper attenuando, sic quòd in statu èt  
tenui diæta vti possimus & virtus possit durare, sic pro-  
cedendo dicit Gal. debemus euitare aerem, vel nimis  
calidum, vel nimis frigidum, sed sit temperatus, vel in  
æstate declinans ad frigidum, in hyeme ad calidum,  
quod poterit fieri artificialiter, puta in æstate sternen-  
do cameram cum frigidis, in hyeme accendendo ignē  
in camera, balneum quoque prorsus non cōuenit, pro-  
cedente quoque ægritudine, iam factis dictis euacua-  
tionibus poterimus applicare calefacientia, maxime  
si non sit multum intensa febris, vt inunguendo cum  
oleis calidis, vel temperatis, vt cum oleo chamæme-  
lino, debemus tamen semper, dicit Galen. primo ad  
Glauc. de cura continuæ cum accid. concoquere absyn-  
thium, & confortantia stomachum, quoniam est habē-  
da maxima cura de stomacho: victus autem, vt dixi, sit  
in principio tenuis, & debemus dare quæ habent vim  
incidendi, vnde Galen. primo ad Glauc. ibi dat piper  
diatrion pipereon, & diaspoliticon. Nos autem dan-  
do aquam mellis aduertamus, si sit nimis fluxus ven-  
tris quare tunc magis decoquamus mulsam, vel dabi-  
mus prisanæ cremorem, vel sorbitionem ex halica, sic  
poterimus iungere cibum, secundum quod apparebit

H 4      neces-



## Mathei Curtij

necessitas pro sustinenda virtute. Somnus, & vigilia ambo conueniunt moderate, tertio, de ing. tertio, quiescant, quoniam agitatio membrorum, dicit Auic. facit ad syncopim. Vtemur tamen frictionibus, vt dictum est, & sic est curandum, vt saltem excrementa tertie digestionis excernantur. Accidentia autem animi conueniunt, quæ calefaciunt, sed non immoderata, ne virtutem prosteruant. hæc omnia sunt facienda quando est timor syncopis, secundum Galen. 12. de ing. tertio, & quarto, & primo ad Glauc. de cura continuæ cum accid. quod si non sit materia tanta, vt timeamus syncopim, sed tantum lipotymiam, & virtus sit fortior, tunc dicit Galen. 12. de ing. quinto, quod istos magis cibare debemus vnde iis dat vinum post cibum maxime si sint senes, quod non fecit in capit. 3. quando est dubium syncopis, nec in primo ad Glauc. Cibi autem debent esse tantum calidi, & extenuantes quantum febris potest sufferre, oportet autem euitare eos cibos qui sint frigidi, & crassi nutrimenti. Medicamenta etiam iis possunt dari, vnde vtemur fortioribus clysteribus, & audacius lenituo in principio, & tandem procedente ægritudine, apparentibus signis completæ digestionis, in hoc vna essem cū Alexandro vt possemus vti medicina soluente, & forsan phlebotomia vti in principio. Nec esset adeo necessarium vti tenui dieta nec tot frictionibus, nec hoc negat Galen. & si sic Alexander intelligit de isto, forsan non est contra Galen. qui primo curat quando est periculum syncopis secundo in cap. 5. in fine quando tamen periculum lipotymix, & sic in principio non dat vinum, sicuti facit in secunda, potest etiam venire syncopæ ex materia biliosa 12. de ing. tertio, & his conueniunt frigida, sed hanc curam nunc omitamus.

De



Syncopalis Minuta, est febris, quæ fit ex humoribus tenuibus, qui facile exhalant, maxime si retentrix sit debilis, & expulsiua fortis, & pori lati, sic q̄ tñ resoluitur virtus, quòd incidunt in syncopin, 12. de ing. sexto, à sanguine autem nec ab alio humore fieri non potest per se, sed ex cholera, sicut colligere possumus primo prognost. 10. & 11. Addit etiam Auicen. quòd fit ex materia ventosa, est autè febris continua, quia aliter non esset exitiosa, aduenit autem in ætate, complexionē, regimine. calidis, & siccis, sicut colligere possumus 10. de ing. 3. in illo iuvene qui laborabat hac egritudine sicut testatur idem Galen. 12. de ing. sexto, eius signa sunt, ex loco nunc citato, nasus acutus, oculi caui, & alia quæ de facie. Hippocratica dicit Hypp. Primo prognost. octauo, nono, & decimo, siue multum excernant, siue vigilent, siue tristentur, siue non cito nutriantur. Si in principio talis facies appareat, huius febris est signum, verum si appareat cum istis, est minus periculum 12. de ing. sexto, sicut etiā dicit Hypp. primo prognost. Quòd si appareat sine istis, est maius periculum, quia tunc est signum, quod est tantum ex malignitate materiæ. Aduenit autem syncopis in ista in tempore maioris resolutionis, & ideo in statu, & in hoc differt à syncopali humerosa. Huius febris cura est etiam multum periculosa, & quum opposita sit ad humoralem, opposita quoque exigat remedia, si ergo in ea virtus sit debilis, & sit apostema in membris interioribus, iam est desperata salus. Quod si non sit apostema vel actu est syncope, vel non, si est, oportet dare cibum, puta panem infusum in vino, sicut fecit Galen. in illo iuvene 10. de inge. tertio, quod si non sit syncope,



## Mathei Curtij

syncope, est videndum an possumus curare causam, & præuidere, ne sequatur symptomata, & ea erit optima cura, modo non sit aliud symptoma, quod impediatur: quum ergo curam addimus, si virtus sit debilis, & sæpe pariter, ter, vel quater cibabimus, sed parum pro vice, quòd si virtus sit fortior, tunc rarius cibabimus, sed & plus dabimus, & tunc forsan licebit vti aliquo lenituo, vt dare cassiam vel mannam. Sic igitur procedendo, omni cura studebimus vti cibis, & medicinis densantibus corpus, vt applicando corpori olea astringentia, dando cibos grossi nutrimenti, & procedente ægritudine vigorata virtute, ingrossatis humoribus, densato corpore, forsan poterimus dare aliquod soluens, quod educat materiam cholicam, & confortet membra, vt Rhabarbarum vel Myrabolanos citrinos in substantia, post procedendo cum rebus confortantibus membra, demum poterimus in declinatione vti leuibus frictionibus, quando non est amplius timor syncopis. Aer autem debet esse frigidus, & astringens, cibi ingrossantes & qui conueniunt, panis, sorbitio ex halica, fructus austeri, qui non facile corrumpantur, & per se, & cum pane, item halica cocta in aqua, possumus dare oua, præcipue vitellos, testiculos gallorum, suillum cerebrum assatum, non cruentum, in albo iure elixum, & demum conueniunt omnes cibi qui sunt crassi nutrimenti, & qui densant, & exhalatione prohibent. Vinum in principio aquosum, post cibum conuenit, & post quartam apparentibus signis concoctionis, potest dari caro pullorum gallineaceorum. Etiam somnus conuenit, quia in ipso non fit tanta commotio sicuti in vigilia. Quies pariter. Ideo debemus euitare nimiam vigiliam, & motum, inanita quoque non conuenit nec nimia repletio. Accidentia animi, quæ



## De Feb. curatione 54

quæ resolvunt, ideo euitent. Hæc est cura sincopalis minute, vt ipsam, à Gal. 10. de ing. tertio, & 12. de ing. sexto colligere potui.

### De febre Diurna & Nocturna.

Auicenna vltimo ponit caput de febre diurna, & nocturna, & diurna est quando febris inuadit in vespere, quando citius inuadere non potest, quoniam syncopalis humorosa 12. de ing. 5. quæ ex maiori multitudine quæ fieri possit in phlegmaticis, tantum vel in vespere, vel in nocte adueniat. Dicitur ergo diurna, quæ semper in vespere aduenit, nocturna quæ semper in nocte, est autem differentia inter eas, vt etiam habetur primo epid. quia diurna est peior, & longior. Quum enim phlegma de nocte inuasionem facere debeat, quando facit de die, est signum maioris malitiæ, & maioris multitudinis. Item est mala, quoniam in nocte, quum inuadit in vespere, non potest æger dormire, primo quoniam in primis horis est principium, & augmentum febris, in quo tempore non conuenit somnus, in fine autem est declinatio, & tunc oportet dare cibum, & non dormire, & ideo sic parum dormiunt, vel si dormiunt, ducunt vitam vespertilionis, dicit Galen. primo epid. quod tamen de die dormiunt, hinc est periculum, ne ad hæcticam producantur & sic febris diurna est multum difficilis. Istæ autem febres vt dicit Auic. non requirunt diuersam curam ab interpollatis. Ideo quæ ibi dicta sunt, hic applicetur, & de febribus phlegmaticis satis.

De



Mathei Curtij  
De cura Quartana Periodica.

Quartana pura intermittens ex humore melanco-  
lico fit secundo de diff. febr. quinto, putrescente extra  
venas, transmissio ibidem, & hic humor est naturalis,  
& præternaturalis tertio Aphor. 22. Naturalis est  
pars grossior sanguinis quæ eius fex dicitur, & præter  
naturalis est qui atrabilis appellatur 14. de ing. nono.  
Fit autem ea, quæ est præternaturalis, vel ex adustione  
flaue bilis, vel melancholiæ naturalis, sexto Aph. 59.  
ex phlegmate vero putrefacto, ac adusto secundum Ga-  
len. non fit melancholia, quia semper est album, ut pa-  
tet de phlegmate gypseo, verum est quod forsitan tantum  
potest indurari quod faciet quartanam, & sic affliget  
de quarto in quartum, & hoc voluit Auicenna. hic, quan-  
do autem iste humor facit quartanam, & semper, est  
atra bilis, secundo Aph. 22. & secundo, de diff. febr.  
quinto. Quoniam si fit à melancholia naturali, fit tan-  
tum, quando putrescit, secundo de diff. febr. quinto, &  
quando putrescit, fit atra bilis, quarto Aph. 2. fit quo-  
que ex successione aliarum febrium, tertio Progn.  
33. & raro à nocumento splenis absoluitur, primo  
epid. & quæ absoluitur primo est salubrior, primo epid.  
particula tertia, & de se est salubris, & liberat ab epi-  
lepsia, quinto Aph. 59. sexto, epid. particula sexta. in fi-  
ne, ut plurimum autem aduenit in autumno, tertio Aph.  
22. Maxime si frigidus sit, & ficcus, vel inæqualis se-  
cundo, de crisi. quarto. Aduenit quoque in complexio-  
ne atræ bilis primo ad Glauc. de signis quartanæ ma-  
xime si transit ætatem consistentiæ quando est usus ci-  
bis, & regimine facientibus atram bilem, & quando  
atra bilis abundat, secundo de diff. febr. quinto, pari-  
ter si locus, talium febrium sit productivus, & tunc  
com-

communit  
ferior prim  
nocumet  
ro, huius  
secundo  
post huius  
& aquola  
paulatim  
in rebu  
to, non  
cessatio  
ad peti  
simile  
diff. fe  
do de  
cio acc  
cundo  
rana he  
ex bile p  
tur hacc  
maxi, v  
ergoni  
dicat  
rem in  
sus, id  
est ne  
& quo  
est erg  
ribus  
riam  
sine via  
tione, e  
tomiam



communiter vagentur, vel febres inordinatæ præcefferint primo, ad Glauc. de signis quartanæ, & sequitur nocumentum hepatis, vel lienis secundo de Crisi. quarto, huius febris signa sunt pulsus tardi, & in principio, secundo de Crisi. primo, ad Glauc. de signis quartanæ, post fiunt veloces & frequentes, urinæ tenues, albæ, & aquosæ, in principio secundo de Crisi. quarto, calor paulatim accenditur, & increfcit sicut ignis accensus in rebus frigidis, & ficcis, secundo de diff. febr. quinto, non aliquod fumidum relinquit, longiores habet cessationes, vnde non affligit, nisi de quarto in quartum, ad perfectam terminatur infebrecitationem. Rigorẽ similem habet eis, qui maxime frigescent, secundo de diff. febr. quinto, non tamen multum magnum secundo de Crisi. nono, spatium accessionis est simile spacio accessionis tertianæ, aliquando etiam longius, secundo de diff. febr. quinto, Gal. vt dixi, vult quod quartana fit tantum ab atra bile, quæ tamen potest fieri, vel ex bile putrescente, vel ex melâcholia, vnde nõ variatur hæc cura ratione diuersitatis materiæ, nisi secundum magis, vel minus, licet secus velit Auicen. procedendo ergo in ista febre ad mentem Galen. pauca sumitur indicatio à febre, sed omnis ferè ab eius causa, causa autem huius febris est humor frigidus, & ficcus, & grossus, ideo si ipsum auferre, & educere volumus, sicuti est necessarium oportet euacuare, sed prius incidere, & quoniam viæ non sunt apertæ, oportet eas aperire: est ergo intentio principalis de incidentibus, aperientibus, & subtiliantibus, & post de educentibus materiam melancholicam. Sed ante, educere oportet, quæ sine viarum apertione, & eorum incisione, vel subtiliatione, educi possunt, hæc autem sunt quæ per phlebotomiam educuntur. In qua non expectamus coctionem



## Mathei Curtij

nem 11. de ing. 15. oportet ergo, dicit Gale. primo ad  
 Glauc. leuiter tractare, nullum forte medicamentum,  
 aut euacuationes exhibentes. videndum autem est, an  
 sanguinis superabundet, & si superabundet, seruatis  
 regulis iam dictis, est incidenda vena interior, vel me-  
 dia sinistri brachii, quod si sanguis exeat niger, & cras-  
 sus, est mittendus satis copiose, quod si flauus statim  
 est suppressendus, nec educendus. Curandum post est,  
 vt cum rebus solitis in sanitate venter sit lubricus, si  
 hoc non possit fieri, vtendum est clysteri cōmuni, post  
 fortiori, vt ponendo in eo drag. 2. diaphiniconis, vel  
 vnc. 5. diacatholiconis, vel confectionis Hamech, &  
 quoniam lenitiua in principio, vt dictum est, conue-  
 niunt, si sint materiæ redundantes in stomacho, vel in  
 meseraicis, tunc ratione ipsarum, etiam in principio  
 possumus dare aliquod lenitiuum, vt dando vnc. 1. cas-  
 siae, & 3. i. confectionis Hamech, dissoluendo cum  
 aqua lactis, quæ licet sit frigida, vt patet, quarto de  
 simp. 16. habet tamen aliquas partes calidas, vt colli-  
 gitur, tertio de alim. cap. de lacte acetoso, ideo ratio-  
 ne earum deducit melancholiam, sed sine agitatione,  
 quod si natura tentet vomitum, quoniam multæ mate-  
 riæ melancholicæ à splene ad stomachum transferun-  
 tur, ideo leui vomitiuo debemus iuuare, vt cum aqua  
 hordei tepida, & syrupo acetoso, fortiora autem vo-  
 mitiua in principio non conueniunt, si æger de se faci-  
 le vomat, oportet dari vomitiuum ante cibum, quod  
 si non, post cibum, quoniam cibum iuuat vomitum, ma-  
 xime si sint cibi valentes in stomacho, his factis in ip-  
 so principio restat, vt ad subtiliationem, & incisionē  
 alterius materiæ deueniamus, hic est opposita inten-  
 tio scilicet humectandi, quæ conuenit ratione materiæ  
 siccae, & febris, & vti rebus siccis, ratione incisionis,  
 apertio-



apertionis, & subtiliationis, hæc enim fieri debent cū rebus siccis, imò humida eorum virtutem retundunt, & sic quum principalis intentio sit incidendi, aperiendi, & subtiliandi, quod habet fieri cum rebus siccis, sic ca magis conueniunt, vnde Galen. primo ad Glauc. in hac cura nō dicit, quòd debeamus vti humidis, sed subtiliātibus &c. licet secus dicāt omnes moderni. Crederem tamen quòd scilicet primo debemus permiscere humida, ne materia nimium terrestrificetur. Poterimus ergo facere hæc, & cum decoctionibus, & cum syrupis, incipiendo à debilioribus, & mitioribus, primo laudat Auice. mel rosatum, & syrupum acetosum, ideo poterimus sic formare, recipe syrupi acetosi vnc. i. Mellis rosati vnc. 5. Aquarum cichoreæ, & lupulorum ana vnc. i. & sem. Poterimus cum isto syrupo per aliquot dies procedere, post venire ad fortiores, vt recipe syrupi de pomis, vel de epithimo, vel de fumoteræ vnc. i. si aliquo aliter etiam sit intentio educēdi, oxy mel, simp. vnc. 5. aquarum tamarisci scolopendriæ & fumoterræ vnc. i. Milce pro syrupo. Poterimus quoque digestiū in forma decoctionis conficere, vt Recipe radicū capparū, polypodii ana vnc. i. foliorū tamarisci & scolopendriæ ana m. 5. seminum anethi, & ameos ana vnc. i. Passularum vnc. 2. decoquantur in sufficienti quantitate aquæ vsque ad consumptionē medietatis aquæ, & deinde fiat colatura, & accipiat summo mane vnc. 6. Cum istis igitur digestiuis procedendo, si non habeat beneficium ventris non deficiemus à clysteribus, semper faciendo eos fortiores, quanto magis ad statum erimus proximi, pariter dabimus cibos, & medicinas, vrinam prouocantes Apparentibus autem signis completæ digestionis, incisis humoribus, apertis viis, tunc est dandum pharmacum, quod



## Mathei Curtij

quod atram bilem possit educere, & quoniam sæpe humores qui peccant sunt difficilis educationis, sic quod vna die educi non possunt, ideo dicit Galen. primo ad Glau. de cura quartanæ, est iterandum medicamentum. Galen. ibi dat elleborum album, nos ipso non utimur, possemus tamen securè uti elleboro nigro, sic formando medicinam, Recipe radicis ellebori nigri minutim incisæ drag. 1. infundatur in aqua mellis, decoctionis anethi, & ameos ana drag. 3. florum violborag. & nenuph. ana drag. 2. maneat in infusione per diem integrum, & inde fiat leuis ebullitio, & collatura, quæ detur in aurora, poterimus in ea dissoluere vnc. 1. & sem. mannæ, vel drag. 5. cassiæ, & sic dare. Medicamentum autem dabimus in vna die infebrecitationis, post dicit Galen. poterimus dare theriacam puta drag. 1. vel Mithridatum, vel diatrion pipereon, vel piper cum aqua quotidie, & sic confortabimus membra, & iuuabimus digestionem post cum prouocantibus vrinam, & sudorem, cum exercitiis debiti curabimus, ut reliqua resoluantur. Quo vero ad sex res non naturales, Aer non sit frigidus, sed declinans ad caliditatem, quia sic abbrevietur quartana, unde secundo. Aph. 25. dicit Hyp. æstiuæ breuiores. Cibi debent esse ex rebus optimis, non ex flatuosis, & tenacibus. Unde dicit ipse arcendi sunt à carnibus porcorum, & similibus, si est possibile dicit Auic. stet per primas tres hebdomadas sine carnibus, post possumus eas dare, post tamen quanto magis versus statum procedemus, plus debemus subtiliare, dicit Gale. quod si non possit tolerare tantum carniū in ediam, & si oportet dare carnes ante tres septimanas, dandæ sunt carnes paruorum animalium in diebus infebrecitationis, dicit Auic. sic tollitur quædam contradictio, quæ videtur esse



se in eorum dictis, Abstineant à cibo in die paroxysmi, vtatur ergo pro carnibus, & pullis gallinaceis, & aliis volatilibus quæ sunt boni succi, & similibus. Concedant cibos incidentes & calefacientes, vt synapi, cap-pares, & ita vtantur cibis tenentibus mollem aluum, maxime si sint soliti, vt vtendo brodiis carniū, rebus conditis cum oleo, pisces quoque comedant qui sunt facilis digestionis, & mollium carniū, vinum autem bibant tenue, album, & mediocriter calidum. quod si bibant aquam sit decocta cum radice apij, foeniculi, capparum &c. Istis autem cibis vtendo seruent regulas vniuersales iam superius datas. Somno vtantur moderato, vigilia moderata. Quo ad motum, & quietem vtantur dicit Galen. frictionibus, quod si sit accessio breuis, diebus interpollatis vtantur solitis exercitiis in sanitate, curent vt superflua omnia excernantur, fugiant omnino tristitiam, quia est vna de causis humorum melancolicorum, stent læti, & viuant in choræis, audiant cantantes, & pulsantes instrumenta, auditum delectantia, audiant tantum quæ delectant: hæc quantum ad regimen, in sex rebus non naturalibus. quo vero ad correctionem accidentium tria sunt membra, quæ præcipue leduntur in quartana, stomachus, splen, & hepar, & quoniam stomachus expellit, splen nutritur, hepar generat humorem melancholicum ideo de eis habenda est cura, stomacho sunt applicanda confortantia cum rebus calidis, sicuti applicando absynthium, masticem, spicam aloen, rosas, vel ex eis faciendo ceratum, si volumus magis confortare, addenda sunt cydonia 13. de ing. cap. nono. Sic ergo confortamus stomachum cum exterius applicitis, & interius cum eis, quæ dicta sunt post exhibitionem pharmaci, ideo ipse melius potest digerere, & si sint

I mali



## Mathei Curtij

mali humores in eo, expellere. Splen, & hepar de facili indurantur 13. de ing. cap. 10. hepar quidem quia tunc continet sanguinem grossum, lien vero quia ipsum trahit ad se. Ideo per intus debemus dare res abstergentes, aperientes, & euitare viscosas, hæc quæ sint, quātum ad medicinam dictum est, in loquendo de digestiuis. Quantum ad cibos, loquendo de cibis, exterius oportet applicare res calefacientes, & mollificantes, oportet tamen semper addere res confortantes, vt absinthium 13. de ing. cap. nono & decimo, & quoniam isti sunt tristes sunt applicanda cordi, vt flores boraginis, & similia quæ spiritus habent confortare, & hæc pro cura quartanæ periodicæ.

### De cura Quartanæ continuæ.

Quartana continua, fit ab humore melancholico, contento in venis, ideo easdem habet causas, & eadē signa, quæ habent interpollatæ: differunt tamen secundum magis, & minus, & ista nunquam ad infebri citationem terminatur, in cura quoque dicit Auicen. non differt ab interpollatis, tantum differt, quoniam in continua non debemus vti rebus adeo calidis sicuti in interpollata & in continua quoniam materia est intra venas, est magis necessaria phlebotomia, & non æque debemus vti carnibus in continua, sicut in interpollata quia est breuior, & egemus subtiliore diætā.

### De cura Quintanæ Septenæ, & Nonanæ.

Circa has febres videtur esse aliqualis diuersitas inter Hippocratem & Galenum. Hyp. in primo epid. sectio-



sectione tertia, dicit dari istas febres, Galen. ibi dicit  
 quod nunquam vidit septenam, & nonanā, quod qu in  
 tanam nunquam vidit manifestam, idest durantem, in  
 suis paroxysmis, sed aliquando occultam, idest mutan  
 tem paroxysmos, sic quod veniebāt aliquando duo pa  
 roxysmi quintanæ, post mutabantur, & si venit septe  
 na nō est dicendum quod id ex terminato humore sit,  
 sed ex inordinato regimine, vt si adueniat vnus paro  
 xysmus, qui amplius de se non rediret, & q̄ æger vta  
 tur inordinato regimine, potest esse in alia septena  
 alius reuertatur paroxysmus, sed id non est ex natura  
 humoris, sicut videtur dicere Auicen. nam sic esset ex  
 humore apto pro quartana sed pauciori, quare sicuti  
 datur, quintana, septena, & nonana, ita non datur sex  
 tana, octena, & dena? secundum quod erit maior, vel  
 minor quantitas materiæ. Item tunc non videtur q̄  
 septena sit salubrior quintana, quia sic in ea erit maior  
 adustio: non possumus ergo dicit Galen. ratione deci  
 dere istam quæstionem, sed est decidenda experimen  
 to. Credendum est quidem Hyp. qui dixit quod da  
 tur, sed ego eas non vidi, & quoniam hoc tantum ex  
 perimento comprobari potest, ideo ex me nō possum  
 dicere quod dentur, sicuti Galen. in totum negat has  
 febres, nec contradicit Hyppocrati. Sed conuenit q̄  
 ex se non potest dicere quod dentur, & quoniam hoc  
 est decidendum experimento, non ratione: & quoniam  
 ipse eas vnquam manifeste vidit ideo non potest dice  
 re, quod dentur, credendum tantum est Hyppocrati,  
 qui dicit quod dentur. Quintana ergo dicit Hyp. est  
 mortalis, & reperitur cum phthisi. hoc Gale. dicit esse  
 verum vniuersaliter, Auicen. indefinite septena est lon  
 gior, sed nō mortalis, nonana iterū est lōgior, Secundū  
 Gale. ergo non possumus dicere, ex qua materia fiant



## Mathei Curtij

istæ febres, & earum curam nullo in loco posuit. Ideo secundum ipsum earum curam non possumus explicare. Auice. autem quum velit quòd fiant ex eadem materia, ex qua quartana maxime phlegmatica, ideo dicit, quòd eius cura est sicuti cura quartanæ phlegmaticæ, ideo quantum ad cibum debemus primis tribus diebus subtiliare regimen, post iterum ingrossare, & demum, quando versus statum procedimus, subtiliare. Cibi autem debent esse boni nutrimenti, & velocis digestionis, non grossi, & viscosi, ita in aliis rebus non naturalibus, debent regi, sicuti in aliis quartanariis dictum est. Quantū ad medicinas, debemus procedere. Primo cum digestiuis, & similibus iam dictis, & post uti educentibus, & maxime per vomitum, & poterimus, cum hieris appropriatis educere humore peccantem, poterimus post exhibere theriacam, & in reliquis uti eis, quæ diximus in cura quartanæ.

### De cura Febris hecticæ.

Tres sunt corporis particule spiritus scilicet, humores, & pars solida, quòd si febris esse debet in aliquam partem in calefacto esse, positum, est esse necessarium, primo de diff. febr. primo quòd si sit illa caliditas in parte solida impressa, tunc est febris hectica. primo de diff. febr. octauo, verum est quòd, quoniam hectica dicitur, idest habituata vel habitum occupans primo de diff. febr. septimo, quando est in ipso principio, & adhuc ipsum habitum non firmiter occupauit, dicitur potius schetica, octauo de ing. primo, quando occupauit dicitur hectica, calor autem ille in solidis existens, vel tantum ponit humores & humiditates, in ebullitione, & tunc dicitur principium, vel exiccat membra solida,



da, & tunc dicitur tabes, vel quoniam vt dicitur sexto de ing. septimo, decimo de ing. vltimo, exiccationes sic procedunt, quòd primo exiccentur humiditates, & hoc duobus modis, vel illæ quæ sunt adhuc in paruis venis, vel quæ sunt extra venas, vel adipem & pinguedinem, vel membra solida, si exiccatio fiat non in membris solidis, sed in aliis est medium, sic in tres partes diuiditur ista febris à Gal. primo de diff. febr. nono. Ista autem quæ in medio est habet latitudinem, secundum quæ fiunt diuersæ exiccationes. Illa in qua exiccantur humiditates inuenis est proximior principio, post in qua exiccentur, quæ sunt extra venas per ordinem, post illa in qua exiccetur, & adepes, & caro, & ista est proximior tabi, vera ergo tabes est in qua corruptæ sunt humiditates nutrimentales, & exiccantur humiditates radicales, & ista est penitus incurabilis decimo de ing. vltimo, primo de diff. febr. octauo, principium facile curatur, medium facilius & difficilius curatur, secundum quòd magis accedit ad tabem, quæ enim est proximior tabi, est difficilioris curæ. Quum tamen omnes humiditates, excepta radicali, quæ est membrorum solidorum, sint reparabiles, ideo omnes partes heclicæ, in quibus tantum consumuntur humiditates nutrimentales, sunt curabiles, & quoniam humiditas radicalis reparari non potest, (aliter enim esset remedium morti.) Ideo tabes exquisita, est incurabilis, hæc omnia colliguntur, septimo de ing. sexto, decimo, & vltimo, sic ergo diuersificatur heclica, quam secundum speciem distinxit Auicenna. hæclica, potest fieri incipiendo primo de diff. febr. octauo, tertio, de prognost. ex pulsu, tertio, sed fit cum ephemera, quando est fortis causa primo de diff. febr. octauo, per se sola fieri non potest incipiendo, in principio tamen cognosci potest



## Mathei Curtij

test minime, quia habet signa etiam ephemeræ, sic intelligere Galen. debemus secundo, de Crisi. ultimo, si ergo fiat incipiendo habet omnes partes, verum si sequitur putridas, sicuti in plurimis est, primo de diff. febr. octauo, non est necessarium quod præcedat principium, nec omnes partes per ordinem, sicuti ibi ostendit Galen. Aduenit autem non in complexione humida, sed sicca, maxime si sit iuncta caliditas, si vita sit in laboribus, in vigiliis, in curis, cum victo pauco, in æstate, ac statu coeli calido, & sicco, regione pariter calida, & sicca, & loco simili, & ista febris maxime solet inuadere ex ira, tristitia, hæc omnia habentur, primo de diff. febr. nono. Signa hecticæ quando adhuc non est tabes, sunt similia præcedentibus causis procatarcticis, facientibus caliditatem, & siccitatem, vt esset ira, tristitia &c. & æger febrit, & eo transacto die caliditas nec augetur, nec minuitur, & ariditatem representat, tunc suspicandum est de hectica, quod si permanferit vsque ad quartam diem, & nihil pariter fuerit immutatum, & permaneant ariditas cum caliditate, quæ primo tactu appareat mitis, post acris, mordax, & arida, tunc certe est dicendum quod est hectica, si calor post cibum per horam, aut duas augeatur, & pulsus fiant maiores, & velociores, sic q̃ videtur noua accessio, tunc est signum indubitatum hecticæ, tertio progn. sexto. Item caliditas est æqualis sine excrescētis, excepta illa quæ est post cibum, pulsus est debilis, paruus, durus, & frequens, caliditas est maior in arteriis, hæc sunt signa hecticæ à Gale. collecta primo de diff. febr. nono, quod si transeat in tabem, tum oculi sunt immodice concaui, exhausto eorum liquore, sicci, flos vitalis extinctus, siccitas immoderata, habent inopiam vigilandi nec vere dormiunt, collapsa sunt tempora, ita  
appa-



apparent in visceribus, & intestinis, & tandem nihil aliud sunt quàm pellis & ossa, cutis est arida, & pulsus tenuis, durus, debilis, & frequens, caliditas mordacior apparet quanto magis tangitur, & sic ex istis signis tabidos facile cognoscimus, hæc Gale. primo de diff. febr. nono, de hectica, quoniam tantum calor sit cum siccitate in membris solidis impressus sine humoribus. Si pura sit, ideo in ea à causa nulla sumitur indicatio, omnis igitur indicatio, in eius cura ab ipsa sumitur febre, febris autē est morbus calidus, & siccus primo reg. acut. 42. Ideo in ea est tantum indicatio de frigiditate, & humiditate 10. de ing. septimo, complexio autem, & aer indicant de applicatione rerum magis, vel minus frigidarum & humidarum, nono de inge. 14. Res autem frigida & humida quibus utimur in cura hectica, vel sunt exterius applicanda vel interius sumenda, exterius applicanda sunt aer, medicamenta, & balneum, interius autem sunt quæ eduntur, & bibuntur, & hæc sunt in secunda differentia vel ut cibi vel ut medicina, hæc non exprimit Galen. sed colligitur ab Auicen. & Aetio. in iis ergo dicit Galen. 10. de ing. octauo, est omnis cura hectica. Cæterum ut dicitur de ing. septimo, quoniam humida non transeant secundum gradum, quinto de simpli. sic sunt minoris actiuitatis quam frigida, ideo est maius periculum in infrigidando, quam in humectando, sed citius inducimus frigiditatem, ideo cum maiori cautela debemus applicare frigida, tertio de ing. octauo, sed quum semper sit intentio de infrigidando, & humectando, debemus curare ut quæ dantur sint frigida, & humida, quod si frigida sint & sicca debemus miscere humida, si humida & calida, debemus miscere frigida. Dicendum ergo de his sex rebus ab exterioribus, & primo ab æ-



## Mathei Curtij

re sicuti facit. Galen. decimo de ing. octauo, exordiar.  
Aer si temperatus sit dicit Galen. debemus cum talem  
eligere, & si sit nimium calidus, vel frigidus eum cor-  
rigere, si ergo nimium calidus sicuti æstate esse solet,  
tunc eligendæ sunt domus subterraneæ, transpirabiles,  
asperse aquis, & rebus frigidis, arcendo turbam homi-  
num, & faciendo omnia pro infrigidatione eius, sicut  
in superioribus dictum est, qd si sit aliquo modo frigidus,  
eum debemus eligere, si vero nimium frigidus conue-  
nit quidem ratione transpirationis, quia sic refrigerat  
cor, maxime, si principalis causa sit cor, nocet tamen  
ratione cutis, cui si occurrat eam constipat, & vapo-  
rum exhalationem prohibet, maius tamen est iuuamē-  
tum nocumento, quod si volumus etiam illud euitare  
nocumentum, poterimus aliquo modo alterare illam in-  
tensam frigiditatem, quæ tamen solet esse in hyeme,  
accendendo ignem leuem in camera, vel quoniam ille  
aer multum conuenit, si volumus eum eligere, debe-  
mus cooperire corpus, excepta facie cum pannis cali-  
dis, & prohibere, ne ille aer ita frigidus occurrat cor-  
pori, hæc omnia habet Galen. decimo de ing. octauo,  
post aerem sunt applicanda per exterius, vt iniunctio-  
nes, cataplasmata emplastra, aquæ, ista dicit Galen.  
decimo de ing. nono, possunt refrigerare, & humecta-  
re sine astrictione, sed difficile est talia reperire, opti-  
mum ergo quod applicari possit, est vnguentum, quod  
dicitur infrigidans, Gal. modo ordinatum, sicut deci-  
mo de ing. nono ordinat Gal. Multa alia sunt, vt su-  
mendo succum herbarum frigidarum sicuti polygoni,  
lactucæ, intybi, & rosarum, cum polenta, vel per se,  
item oleum rosarum ex oliuis immaturis, hæc omnia  
applicari possunt, & ea miscendo, & separatim, & quo-  
niã vt dicitur de ing. octauo, sæpe hectica habet origi-  
nem



nem ab aliquo membro particulari, vt à pulmone, & stomacho, ideo hæc remedia non omni corporis parti sunt applicanda, sed parti illi, à qua procedit hectica decimo de ing. nono, debent autē talia remedia actu frigida esse, non miscendo res calidas, sicut patet ibi à Galen & quando sunt calfacta à calore febrili, oportet ea remouere, & iterum illa, vel alia eiusdem virtutis applicare, & indifferenter possunt applicari membro siue principali, siue non, septimo, de ing. vltimo. Aduertendum tamen est ne membrum propinquum lædatur sicut Galen. accidit, septimo de ing. octauo & refert ipse decimo de ing. nono. Tercio sunt balnea, quibus, & si non sunt in vsu in sanitate, si oportet, vti debemus. Nam etiam tempore Hyp. non erant in vsu, tertio regim. acut. 42. & tamen eis ipse utebatur, tertio regim. acut. 59. & quoniam, quod maxime conuenit in hectica est balneū, decimo, de ing. decimo, ideo balneis etiam tempore nostro in hecticis, licet nō sint in vsu, vti debemus, & licet etiam aliquando balneare ægrum etiam aqua frigida, nisi periculum sit nimie in frigidationis, tamen dicit Galen. ex thucididis sententia, decimo de ing. decimo, quando vnica est spes salutis, melius est ea vti cum periculo, quam relinquere ægrum sine remedio mori. Sunt autem balnei secundum quod antiqui eis utebantur, sedes quatuor, decimo de ing. vltimo, prima est aeris calidi, quæ virtutē habet calefaciendi, liquandi, & æquandi materiam, relaxandi cutem, & multa retenta euacuandi, secunda, sedes est, aquæ calidæ. hæc humectat & calefacit, tertia est aquæ frigidæ ista refrigerat, cutim densat, & virtutem roborat, quarta est in qua fit sudoris absterfio, & ista corpus per sudores euacuat, sedes omnes balnei conueniunt hecticis, secundum omnes virtutes



## Mathei Curtij

excepta calefaciente, quæ repugnat omnibus febris: iuuamenta autem, quæ ex balneis sequuntur, sunt quod quicquid fuliginosum, & humidum est, educitur caro, ossa, & cutis, in naturali dispositione ponuntur, ariditas solidorum membrorum corrigitur, calor præternaturalis remouetur, quod si hæc à balneis sequuntur iuuamenta, (quis est qui balnea hec tics non concedat?) conuenit tamen maxime lauacrum aquæ frigidæ, & sine ipso ferè nihil facerent cæteræ virtutes, nec secus sanari potest hec ticus ratione balnei, vt ibi ostendit Galen. verum quoniam in hec tics est parum sanguinis & est carne nudus, pinguedinis expers. Ideo si foret iuuenis causone laborans, posset subito in balneo aquæ frigidæ lauari, debet tamen ipse prius poni in aqua calida post in frigida. Sic enim corpus post aquam calidam, magis resistit frigiditati, nec membra solida, & eorum virtutes adeo læduntur: sunt ergo omnes hec tici, si non sit putrida, vel phlegmone in partibus interioribus, balneandi, ponit Galen. 11. de ing. vltimo modum, quæ seruare debemus in balneis, circa omnes sedes, quoniam vt dicit ipse, septimo de ing. sexto, omnes ferè diuites suis temporibus habebant balnea domi, sed quoniam nostro æuo nec domi, nec alibi habetur omnes sedes balnei, ideo crederem, quod non penitus omittendum tam salubre & tam necessarium medicamentum, sic possumus procedere, vtre vacuo, in camera ægri reddito aere temperato, vel magis ad calidum declinante, vt sit similis prime sedi, debent portari duæ tineæ plenæ aqua, vna calida altera frigida, & quoniam in aqua Galen. nihil concoquit, ideo eam puram reciperem, post facerem vt quatuor homines in vno linteo versus calidum vrgente ægrum sumerent & ipsum à lecto leuiter pertractando lenātes



tes facerent, vt in aquam calidam immergerent, maxime si vterque sit fortis, curarem post vt æger ibi staret aliquantulum, Galen. tamen in ea sede stare permittebat donec caro intumesceret, septimo de ing. sexto, quia erat tantum intemperies sicca, nec erat periculum propter caliditatem aquæ sicut est in hectica. Quum æger post aliquantulum temporis in ea tina stetisset, facerem, vt eum in aqua frigida immergerent, & tantum ibi stare permetterent quantum virtus sufferret, quod cognoscitur ex tolerantia ægri. Curarem postmodum, vt illi quatuor homines ægrum in lectum, qui debet esse proximus, & calidus portarent, & post primo cum spongia, deinde cum panno lineo leuiter, & blande pertractando ipsum abstergerent, factaque de terfione cum oleo comuni, vel alio appropriato eum inungerent, debet autem oleum esse tepidum, quia aperit, frigidum constipat, & hoc in isto casu esset perniciosissimum, tertio regim. acut. 44. & secundo de simpl. cap. 6. quod si timemus de virtute, & corpus esset multum exiccatum, prima aqua debet sumi tepida, alia aliquantulum frigida, sed non pure frigida, decimo de ing. 10. sic quoque æger potest stare in vtraque aqua secundum dispositionem virtutis. Possumus autem vel bis, vel ter reiterare in die, si æger sit assuetus, septimo de ing. sexto, forsan æuo nostro est satis semel balneare, in mane ante prandium, propter inassuetudinem, quod si marasmus esset confirmatus, tunc quoniam impossibilis est cura 1. de diff. febr. 9. 10. de ing. 10. morituri autem sunt solis prognosticis relinquendi, primo Apho. 8. aliter detur pampus medicamentum, quæ alteri possunt esse salubria 10. de ing. nono. Ideo in tali casu nec balneis vti debemus, quod si esset secunda mors, tamen astantes vellent vt aliquanto plus viueret, tunc facta pro-



## Mathei Curtij

testatione impossibilis sanitatis, potest lauari, quoniā  
ex marasmo potest induci hectica senectutis, quā mor-  
bum senium Philippus appellabat, quæ licet etiam in-  
curabilis sit, tamen plus cum ea potest durare eger Ga-  
len. decimo de ing. vltimo dicit, se conseruasse viuum  
laborantem tali ægritudine, non tantum per dies, sed  
per menses, hæc de balneis, & sic de rebus exteriori-  
bus. Restat vt ad res interius sumendas deueniamus.  
Res omnes, quæ interius sumi debent, oportet vt fri-  
gidæ sint, & humidæ & vt sint medicinæ, vel cibi, & po-  
tus, vel aer, Gal. septimo, de ing. sexto, & decimo, de  
ing. decimo non ponit medicinam quæ valeat tantum  
vt medicinæ. Sed quæ valent vt medicinæ, & cibi. Aui-  
cen. tamen aliqua ponit quæ tantum inter medicinas  
adnumerari debent, sequendo tamen Galen. quia ibi  
possumus cū cibis medicinalibus procedere tutius est  
quā cum puris medicinis procedere, naturæ enim sunt  
magis conformes. Duo sunt præcipua remedia in cō-  
muni vsu quibus ad infrigidandum, vtimur, & hume-  
ctandum intus suscipiendo quæ valent vt medicinæ, &  
vt cibi, & sic sunt cibi medicinales. Primo est aqua can-  
crorum, vel limaciarum, secundo est lac, licet Gal. ni-  
hil dicat de cancris in ista cura, quia tamen Diosc. lib.  
cap. 12. dicit quod cancri decoctio valet exhibita tibi-  
dis, & idem refert Auicen. in ista cura, & sunt in com-  
muni vsu. Ideo primo loquemur de cancris, post de  
lactæ. Cancris quia sunt frigidi, humidi, ideo hecticis  
conueniunt, maxime si sunt phtyfici, quia videntur ha-  
bere proprietatem cum pulmone, eorum caro non vi-  
detur conuenire, quia cibi pro hæcticis debent esse fa-  
cilis digestionis, & non grossi nutrimenti septimo, de  
ing. sexto. Cancris autem Limaciæ, & similia sunt du-  
ræ carnis, & difficilis digestionis, sicuti in capitibus  
pro-



propriis patet, tertio de alim. quòd si esset virtus for-  
ris forsan possumus dare contusum de eis, est tamē me-  
lius facere decoctionem sic, accipere oportet caudam,  
& pedes, & euellere à toto corpore, & etiam, quoniā  
in cortice est ius exiccatiua, debemus eos excortica-  
re, post cum aqua, sale, & cinere ipsos bene lauare, de-  
inde cum aqua pura, demum eos in sufficienti quanti-  
tate aquæ ordeī decoquere, & eam decoctionem cola-  
tam exhibere post balneum cum ptisana, si non detur  
lac, ita dictum est de limaciis. Possumus quoque da-  
re destillatum factum ex eis, sicut communiter fieri so-  
let, & erit facilioris digestionis, quā caro, & in ea erit  
maior virtus quam in decoctione, aduertenda tamen  
est virtus exiccatiua, quæ acquiritur ex lambico. Post  
hæc est lac, quod esse humidum nulli est dubium, quod  
sit frigidum patet, quarto de simpl. med. 16. & quin-  
to, Aph. sexto, quòd si Galen quinto de simpl. med. di-  
cit q̄ habet tepidam caliditatem, per tepidum intelli-  
git mediocriter frigidum, sicut patet, tertio de tuend.  
fani. Quod si etiam, tertio, compl. ultimo, dicit quòd  
est calidum, intelligit, quando est conuersum in san-  
guinem. Quum igitur lac frigidum sit, & humidum  
facilis digestionis, & boni nutrimenti, ideo maxime  
laudatur in hefticis, septimo, de ing. sexto. Cibi enim  
qui in ea sicca cerebri intemperie conueniunt, lac hu-  
manum est propter similitudinem. Quod si non velit  
æger sumere lac humanū debet sumere, quòd sit alio-  
rum animalium diuersum secundum diuersam heftici  
dispositionem, quando viæ sunt magis apertæ conue-  
nit grossius, quando sunt magis strictæ, subtilius in  
principio viæ sunt ampliores, post vero strictiores, lac  
caprinum est simile multum cum humano, & est sub-  
stantiæ aliquantulum grosse, ideo dari potest in principio.

Lac



## Mathei Curtij

Lac asininum est subtrilioris substantiæ ideo dari potest, procedente ægritudine. Gale. septimo de ing. sexto, & decimo de ing. 10. maxime loquitur de asinino. Debemus ergo accipere asinam iuuenem, & ab ipsa sum mouere pullum, eam nutriendo cum herbis frigidis, & humidis, curando vt bene digerat post debemus curare, vt æger post balneum, vel saltem ieiunio stomacho ab eius vberius emulgeat lac, quod si ipse recusat, hoc facere debemus, ducere asinam in cameram ægri, & facere vt subito quando extractum est lac, ipsum bibat, primo autem debet bibere vnum cyathum cum dimidio, & sic procedendo semper, debet augere dosim, sed ad quam quantitatem ascendere debet, determinari non potest vt Gale. dicit decimo, de ing. vltimo sed id coniectura assequemur, donec scilicet non fluctuet in stomacho, & virtus non grauetur, septimo de ing. sexto, videre autem oportet an in stomacho corrumpatur, & hoc cognoscitur ex pulsu, si sit maior aut valentior, signum est quod non corrumpitur, quod si timeamus de caseatione addemus ei parum mellis, vel salis, licet ista non conueniant, ratione febris in hæticis de se, quod si ventris fluxus sit, laudatur lac acetosum, de hoc tamen, in hac cura nihil dicit Galen. post lactis assumptionem, debet æger quiescere, & vigilare, debemus autem sic procedere cum lacte, dicit Gal. primo de ing. sexto, donec æger melius se habeat, post quando tendit sanitatem versus debet regi æger, vita conualescentis, & tunc poterimus omittere lac, hæc de lacte, quod conuenit vt cibus & vt medicina, de aliis cibis, loquendo de sex rebus non naturalibus, dicemus. Sexto, erat aer qui inspiratur, qui debet esse frigidus, & humidus, sed de ipso iam dictum est hæc igitur de illis sex rebus, quibus præcipue  
vti



vti debemus in hecticis sufficient. Quantum ad sex res non naturales, de aere dictum est, cibi omnes quibus in hecticis vti debemus debent esse frigidi, & humidi, boni nutrimenti, non grossi, non viscosi, nec dure digestionis, & in eorum exhibitione debemus simul comparare earum naturam, & virtutis dispositionem, conuenientes ergo cibi vitra lac, sicut ex Gal. patet tertio de ing. 6. sunt succus ptisanę frigidus, halica, cū cre more ptisanę 10. de ing. 10. panis ī furno bene coctus, bene fermentatus, cū pauco salis in aqua infusi, pisces saxatiles, ius albū, testes gallinacei, perdices, passerres montani, & similia, de vino Gale. 10. de ing. decimo, nihil dicit, in septimo de ing. sexto, dicit quod conuenit in illa dispositione sicca stomachi, modo non sit febris, & aqua maxime vituperatur, quia multas parit noxas, & Galen. ibi, & Hyp. tertio, regim. acut. primo referunt per opposita, & maxime laudat vinum, quod plura producat iuuamenta. Crederem ergo quod maxime, quando indigemus restauratione, vinum album aquosum aqua permixtum conueniret, in dandis autē cibis plus oportet dare infero, quam in manet, parum pro vice, sed sapius est tamen necessarium expectare quod cibus prius datus sit digestus, post coenam non bibat, nisi facta digestionē qua peracta, si sitim tolerare non possit, aliquantulum bibat, vtendum est autem cibis consuetis, & naturę indiuidui conuenientibus, hæc omnia ibi refert Galen. Quantum ad somnum, & vigiliam debent mediocres esse, non est dormiendum statim post assumptionem lactis, nec post prandium, quantum ad motum, & quietem, quies magis conuenit quā motus: leui tamen exercitio vti potest, si est possibile vacuo stomacho, & vtatur debitis frictionibus: quæ tamen sint leues & molles, quantum ad inanitionem-



## Mathei Curtij

nititionem, & repletionem curari debet, ne nimis cibis repleatur, & quòd excrementa non retineat, omnia tamen blande facere oportet. Quantum ad accidentia animi, euitent omnia accidentia sæua, maxime quæ calescunt, & exiccant sicut est tristitia, ira, dolor, sed stent læti mediocriter, & cum delectatione viuât, hæc quoad sex res non naturales. Restat modo, vt accidentia corrigamus. Accidentia quæ maxime sequuntur in hecticis sunt syncope, & fluxus ventris, quo ad syncopim vtendum est eis quæ dicta sunt in cura syncopalis minutæ, quo ad fluxum, si fuerit fluxus, melius est vti lacte acetoso, & in aqua hordei dicit Auicenna. ponatur milium torrefactum, & sic procedere debemus cū illis, quæ ventrem sistunt. Aduertendum tantum est, ne sit multum sicca, & sic miscere possumus diuersa remedia secundum diuersitatem intentionem, & hæc pro cura hæctica febris.

### De cura Hæctica Senectutis.

Hæctica Senectutis, vt colligere possumus decimo de ing. decimo, est siccitas inducta in membris solidis sine febre de se, & senibus præcipue aduenit, septimo de ing. sexto, aliquando tamen, & iuuenibus, decimo de ing. decimo, & est similis dispositioni naturali, quādo aliquis moritur morte naturali, huius signa sunt, signa marasmi exceptis signis, qui ex febre procedunt, ratione caliditatis in ea enim non est febris, ideo dicit Auicenna. In tali hæctica sunt pulsus tardi, parui, & rari, & quandoque habent vrinam albam, & subtilem, & in aliis dispositionibus sunt senibus similes. Ista dispositio, si confirmata sit, scilicet quòd sint exciccata membra solida, quia ipsa restaurari non possunt, aliter esset



esse remediū morti, ideo est incurabilis, eius ergo curā aggredi non debemus, quò si si non sit adhuc confirmata, id est, sit tantum siccitas in prioribus humiditatibus, licet hæc vere hectica senectutis dici non possit, tunc eam curare est possibile, quoniam ut dicitur septimo de ing. sexto, omnes exiccationes ea excepta, quæ in membris solidis est sunt curabiles. Quum igitur talis dispositio sit sicca tantum, ideo humidis, non frigidis uti debemus in eius cura, & quum tanta siccitas non reperiatur in membris, nisi cum defectu caloris naturalis, qui humido, quod est eius pabulum, deficiente, absumitur. Humida igitur applicari debent, etiam debent esse calida, seruandus est tamen ille ordo in ista cura qui seruabatur in cura hæcticæ febrilis, excepto quòd loco frigidorum uti debemus calidis. Aer ergo debet maxime esse humidus, vrgens versus calidum, applicandæ quoque sunt exterius medicinae quæ debent esse humidae, & mediocriter calida, ut esset oleum de ben, vel sesaminum dicit Gal. & debent applicari sub actuali caliditate. Balnea multum conueniunt, sed calida tantum, septimo de ing. sexto. Medicinas per interius maxime soluentes debemus euitare, quantum possumus. Possumus tamen uti maxime si non sit beneficium ventris, propter nimiam siccitatem, clysteri, cum rebus calidis & humidis, ut cum cicere contrito cum melle, chamemelo, & ficubus faciendo decoctionem in debita quantitate aquæ addendo vnc. 2. olei sesamini, vel de ben, & sic conficiendo clysterem, cibi debent esse humidi versus calidum vrgentes, vinum etiam est exhibendum. Sed quoniam habito modo procedendum in hectica febre, habetur etiam modus curandi senium, non enim differunt nisi quia in senio non est caliditas febrilis, ideo hæc pro

K

ist 1



## Mathei Curtij

ista cura sufficiant .

### De cura Febris Pestilentialis .

Morborum, vt dicit Hypp. in libro de natura humana, quidam sunt sparsi, quidam communes: communium autem vt dicit Galen. primo epid. commento primo, & primo reg. acut. nono, quidam sunt epidemii idest publici, quidam endemii idest vulgariter grassantes, & horum, qui maxime exitiosi sunt, pestilenciales dicuntur, vt dicit Galen. tertio epid. Ideo eorum Crises, vt plurimum terminantur male, secundo Aph. 13. est ergo febris pestilentialis morbus communis populariter vagans, & exitiosus: fit autem, vt plurimum ex aere plurimum calido, si ei maxime sit admixta putredo, vel malitia, aliquando etiam ex humore intus acquisita venenositate putrescente, primo de diff. feb. quarto. Proprie tamen hæc febris pestilentialis, pestis debet dici, tertio de præfagio ex puls. cap. de pulsibus in frigidis intemperaturis. Causa tamen maxime communis est aer, quam adduxit Hyp. in libro de natura humana, potest tamen fieri ex aquis putrefactis, & vaporibus eleuatis à rebus putridis, & fetentibus, primo epid. commen. primo. Sed quoniam, vt plurimum lædunt quando inspirant aerem, ideo Hyp. causam omnium communissimam expresit, vt ibi excusat Hyppocratem Galen. Possunt quoque esse in causa cibi mali semiputridi, vt legumina &c. quoniam à pluribus comesta habent rationem naturæ communis, sic accidisse refert Galen. in lib. de euchymia, & caco-chymia, & in commento secundo de natura humana. Sunt autem istæ febres vel putridæ, vel hæcticæ. Secundum quod vel infesti sunt humores, vel substantia  
cordis,



cordis, tertio de præfag. ex puls. cap. de puls. frigida  
 intemperature putrida possunt aduenire etiam, quod  
 corruptus non esset aer, & febres pestilenciales pro-  
 prie dicuntur. Hæcticæ autem proprie fiunt ex infe-  
 ctione aeris, & maxime perniciosæ, & contagiosæ, &  
 proprie pestes dicuntur. Aduenit autem præcipue cor-  
 poribus plenis superfluitatē, maxime si sit obstructio,  
 vel plethoria, in vita ociosa degentibus, crapulis, ven-  
 trique immoderate indulgentibus, maxime si corpo-  
 ra fuerint calida, & humida, primo de diff. febr. quar-  
 to, febrium pestilentialium, vt dixi quædam sunt hæ-  
 cticæ, quædam putridæ, & putridarum quædam à san-  
 guinæ, quædam ab alio humore, qui humores aliquan-  
 do in vna parte, aliquando in alia putrescunt, aliquan-  
 do ad vnam partem, aliquando ad aliam, aliquando ad  
 nullam expelluntur. Hinc tot diuersa apparēt in eis si-  
 gna & symptomata, quot enumerat Hyp. tertio, epid.  
 & Gal. i lib. de euchymia, & caco-chymia, & tertio de  
 præf. & puls. incipiēdo ergo à putrida quia sæpius eue-  
 nit, tales febres sunt ardentes, 3. epid. & in lib. de eu-  
 chymia aliquādo magis acutę aliquādo minus, & ideo  
 aliquādo calorē, & sitim habent intensiorē, aliquando  
 remissiorē, pariter materia quæ putrescit, aliquando  
 est magis inclusa in partibus interioribus, aliquando  
 est per totum corpus dispersa, aliquando magis acuta  
 ra, & calida, aliquando cruda, & excrementosa, ideo  
 aliquando adsunt deliria, aliquando somnolentia, pa-  
 riter aliquando nullo modo expellitur, aliquando ad  
 loca debiliora truditur. Hinc aliquando moriuntur  
 antequam appareat aliquid in partibus corporis, ali-  
 quando sequuntur phrenetis, somnolentiæ immobili-  
 tates, spasmi inquietudines, horrores lippitudines, vi-  
 tium vocis, pustulæ in ore, tussis, phthises, deiectiones



## Mathei Curtij

appetitus, dolores stomachi, syncopis, tenasmones, li-  
enterix, dysenterix, alui perturbationes, vlcera vesi-  
cæ, difficultates vrinæ, aquæ inter cutem, pustulæ di-  
uersorum colorum, per totam cutim vlcerationes di-  
uersimode, scabies, phagædenæ, carbunculi modo in  
pudendis, modo in aliis partibus, secundum quòd ma-  
teria, ad caput, ad neruos, ad oculos, ad os, ad pulmo-  
nem, ad stomachum, ad intestina, ad vesicam, ad hypo-  
chondria, ad cutim per vniuersum corpus, ad partem  
exteriorem determinatam demandatur, & sic aliquan-  
do horum vnum, aliquando plura apparent, secundū  
quòd materia ad vnā partem vel ad plures truditur,  
verum hæc omnia, quoniam etiam cum aliis febribus  
non pestiferis, aliquando apparent, ideo possumus di-  
scernere per ea ab aliis, nisi habeant occultam malitiā,  
vltra peccantem humorem, secundum suam naturam  
quæ nascitur ex venenositate eius adiuncta, propter  
quam vt plurimum ægri moriuntur. Vnde dicit Hyp.  
tertio epid. quòd tales ægri tudines, vel non iudicant,  
vel ægre. Crises enim in pestilentibus sunt malæ vt  
plurimum, secundo Aph. 13. & ideo vt plurimum pe-  
ste laborantes moriuntur, vrinam habent, qui hac fe-  
bre laborant vt plurimum turbidam, multam, malam,  
crudam, nihil discernentem, acrem, & graueolentem,  
egestiones crudas, multas, tenues, & foetentes: pul-  
sus, vt plurimum dicit Auic. frequentes, & parui in no-  
cte magis vehementes, quando ergo plura horum si-  
gnorum apparuerint, & cum occulta malitia commu-  
niter inuadunt, febrem pestilentialem putridam est di-  
cere: si autem sit hectica pestilentialis, dicit Gale. ter-  
tio, de prælex pul. cap. de puls. intemperiei frigida, fe-  
bres habent remissiorem, aliquando ab ægro nō per-  
ceptibilem, vrinam in colore, & sedimentum simile sa-  
nis,



nis, pulsus quoque propter aliqua frigida contra caliditatem cordis cooperantia, similes moderatis, tertio de præf. ex puls. cap. de puls. quando arteriæ frigida, & cor calidum, & tunc cognosci debent ex foetore anhelitus, si etiam admouetur manus pectori, cognoscitur febrilis caliditas, sed hæc signa non faciunt pro medico, quoniam hæc febris est contagiosa, primo de diff. febr. secundo, q̄ si vrina appareat conturbata, aquosa & tenuis, certissimum est signum heclicæ pestilentialis, post balneum cibum respuunt qui hac ægritudine laborant, sitiunt præter modum & frigidam postulant, eorum oculi inter lauandum sunt calidi & flammæ. Quum ergo dicit ibi Galen. talia signa apparuerint, certe dictum est, q̄ adest pestis, & per ea vt ibi patet, intelligitur de heclica pestilentiali, quæ proprie est pestis: non enim fit ex putredine humorum, sed ex aere inspirato venenoso, substantiam cordis corrumpente, tertio de præf. ex puls. cap. quando cor est calidum, & arteriæ frigida, hæc sunt signa, ex diuersis locis Hypp. & Galen. collecta, quibus febres pestilenciales cognoscere possumus. Veniendum modo est ad curam, Galen. decimo de ing. vltimo promittit ponere harum febrium curam, id tamen saltem non expresse exigit, nisi dicamus q̄ cura in istis febribus nihil plus sit, quàm venenositas vltra ea quæ de aliis febribus dixit, & ponendo curam aliarum febrium, & ostendendo quæ venenositati resistunt, earum etiam curam posuerit. Hanc igitur præcipue ex dictis Hypocratis, & Galen. colligendo ab intentione curatiua exordiar, in febre pestilentiali sunt omnia quæ sunt in aliis febribus, sed vltra est etiam venenositas, ideo intentio sumitur à febre, & à venenositate: à febre autē putrida, de ea enim præcipue loquar in curando. Nam



## Mathei Curtij

de hectica parum est dicendum, quoniam incurabilis est. Nam ut inquit Gal. tertio de præf. ex puls. cap. quando arteriæ sunt frigidae, & cor calidum, quando substantia cordis est à putredine occupata, quis medicinam, ad eam putredinem tolerandam excogitabit? quod non est dicendum de putrida, ut ipse asserit. Quia igitur putrida sanationem admittat, ideo ad eius curam sic me accingam. In hac febre ut dixi sumitur indicatio ab ipsa, & à venenositate, in febre putrida duo sunt, à quibus sumitur indicatio, putredo scilicet, & febris, sicut supra de mente Galen. decimo de ing. 10. dictum est, est quoque virtus, à qua maxime sumitur indicatio in ista febre. Quatuor ergo sunt, quæ principaliter indicant, febris scilicet, putredo, virtus, & venenositas, febris indicat de frigidis, & humidis, putredo præbet duplicem indicationem, ut scilicet quod putrefactum est, remoueat, & quod est futurum, fieri prohibeat, & hæc ut plurimum fiunt cum aperientibus, & incidentibus, quæ calida sunt, maxime indicant de frigidis, venenositas indicat de prohibentibus eam, & talia sunt styptica, acetosa, & ut plurimum frigida & sicca, ideo de frigidis & siccis indicat: virtus autem de sui conseruatione indicat, ideo ratione virtutum, debemus dare cibos & cætera virtutis conseruantia, quæ sint similia ætati, regioni, & complexionem. Quum igitur ista ferè omnia contraria sint & de se ægritudo sit pernitiola, ideo raro curari potest. Videndum tamen est quod magis vrget, & ei est attendendum altero non neglecto, sicut ex regulis Galen. supra in aliis dictum est, ut tamen per ordinem procedamus primo de illis dicam quæ conueniunt, indicatione sumpta à putredine, aliis non neglectis. Materia illa quæ iam putrida est de sui deductione indicat, sed prius de incisione, at-  
tenua-



tenuatione, & apertione. Primo igitur quoniam ve plurimum sunt multæ materiæ corruptæ in intestinis, optimum est præmittere clysterem, postmodum ratione sumpta à materia simpliciter, quæ febrem putridam facit esset intentio de phlobotomia. Verum quoniam in libro de euchymia dicit Galen. quòd merito Medici sui temporis in ea peste phlobotomiam propter viriû resolutionē abhorrebant, ideo videtur, quòd in febre pestilentiali propter defectum virtutis phlobotomia non conueniat. Crederem tamen quod in totum non esset abhorrenda, si maxime sanguis peccaret, virtus constaret, & ætas maxime pateretur, licet nō multum copiosa, tamen conueniret, quòd si principaliter non peccat sanguis, tunc virtus non constar, eo casu abstinere debemus, nec est mirum si in ea peste, quam ponit Galen. in lib. de euchymia non erat fienda, quoniā consonum est, quòd propter illos malos cibos, quibus homines propter penuriam utebantur, illi laborantes, nō sanguine, sed malis humoribus essent repleti, quod egrediens sanguis ostendebat. Ideo virtus, ut plurimū non constabat, facta igitur phlobotomia, si est fienda, seruatis omnibus conditionibus, quæ in cura tertianæ puræ, & causonidis dicta sunt, vel etiam si fieri nō possit, ad medicamenta soluentia non est subito deueniendum: materia enim indigesta etiam q̄ esset venenosa, modo non sit furiosa, non est educenda, quum de ea nihil dixerint Hyppocrates, & Gale. Primo enim quum pharmaca omnia soluentia, quæ fortia sunt, venenositate participant, morbi malitiam augent, & quum digestio non sit facta, nec humores dissecti, nec viæ apertæ, consonum est quòd nihil educetur, vel cū maximo labore, & virtutis prostratione, & tam de bono, quàm de malo educetur. Huc accedit, q̄ quū causa.



## Mathei Curtij

principalis, ut plurimum sit aer, quo lædimur, ideo causam non auferimus, experimento quoque patet, quoniam dicit Hypp. tertio epid. quod multos offendebat & subito moriebantur, quod si dubitemus, ne eger moriatur, melius est ipsum sinere mori, ex vi, & malignitia morbi quam Medicum, & medicinam deturpare, medicamento solutiuo mortem accelerante. Poterimus tamen uti medicamento ex aloe, mirrha, & croco, vel loco croci ponere ammoniacum, sicuti ponit Paulus. Hoc enim medicamentum non est venenosum nec multum agitat. Regiones namque hepatis non transcendit, & cum hoc exiccat, & venenositati resistit, aliquas materias peccantes educit, his peractis, si est possibile, intentio sumpta à putredine iam facta, indicat de eius educatione, sed prius de incisione, & aperitione: poterimus ergo tunc videre quid magis vrget, an putredo, an venenositas, si putredo, debemus uti aperitiuis, si venenositas, stypticis, & acetosis. Verum quoniam condensant, & constringunt, & sic prohibent intentionem sumptam à putredine, ideo videndum, an materia magis peccat quantitate, vel venenositate, & semper vrgentiori magis est attendendum, altero non neglecto, sed de istis diffusius (loquendo de rebus non naturalibus) infra dicemus. A virtute quia ut plurimum in istis febribus obruitur virtus maxima ab ea sumitur indicatio, & indicat de similibus ætati, complexionibus, & regioni, prohibendo quæ eam destruunt, & dando quæ roborant. Sed quoniam quæ conueniunt magis apparent percurrendo per sex res non naturales, ad eas est deueniendum. Aer est maxime considerandus in febribus, non de ing. 14. sed maxime in istis, quia est earum potissima causa, ut ex Hyp. de humana natura, & Galen. primo epid. commento primo clare liquet,



liquet, si ergo pestis sit ex infectione aeris, videndum est an sit infectio ab influxu coelesti, sicut volunt Medici, vel ab alia causa inferiori, ut ex putredine cadauerum, vel ex vaporibus eleuatis ex aliqua alia re putrida, si sit à causa superiori indifferenter ferè omnes morbo corripuntur, sicut in lib. de natura humana refert Hypp. vnde credo quod multum sit difficile ei resistere, si vero sit à causa inferiori, tum est facilius, primo remouendo causam infectionis, si est possibile, deinde corrigendo infectum. Corrigendo autem, vel intendimus præseruare, vel iam laborantem curare, si volumus præseruare in tali correctione, ut dicit Galen. in de Ther. ad pis. debemus seruare quod dicit. Hyp. mutare scilicet aerem, quia præsentem euitare non possumus, quod si id fieri non possit, debemus præsentem corrigere, incendendo magnos ignes cum lignis & vnguentis odoratis, accipiendo quæ calida sunt, & sicca, ut ignem faciendo ex iunipero, cupresso, & lauro, ponendo post in ignem thus, ambram, moschum, costum, & similia quæ enumerat hic Auicenna. Si vero sit actu æger, debemus alterare cum frigidis, & odoriferis, ut cum camphora, sandalis, rosis, corticibus granatorum, Mirtho, Cydoniis, & similibus, semper curando ut aer inalteratus non occurrat, siue in præseruatione, siue in cura, quod si sit febris tantum ex infectione humorum, alterato aere, vel præseruando, vel curando, debemus curare ut pori stent aperti, ut calor naturalis euentetur, & à putredinali non corripatur, primo de diff. febr. quarto, de cibo & potu Hyp. tertio, epid. dicit, quod omnes ferè in quos eo tempore incidit, fallidiebant cibum, vnde Gal. in commento refert quod suo tempore hoc etiam euenit, & subiungit quod fortissimi viri, qui sibi vim intulerunt, & cibum sumpserunt, omnes ferè superstites



## Mathei Curtij

perstitēs fuerunt : reliqui mortui sunt. Curandum est igitur omni ingenio in hac febre in qua virtus proster nitur, vt cibum ægri sumant, non tamen in maxima quantitate, sed quantum conseruari potest virtus, & quoniam principalis ferè intentio est resistere veneno sitati. Ideo debemus semper admiscere aliqua aceto sa, ut acetum, succum citri, agrestam &c. in potu vi num non conuenit ratione febris, si tamen maxime ne cessitas roborandæ virtutis vrgeat, forsan virtuti at tendendo non esset malum, dare parum vini paucife ri, & siti urgente, poterimus facere aquam coctam cū rebus confortantibus, & venenositati resistentibus. In cæteris procedendum, vt dixi in cura caufonidis. Vi giliæ, & somnus moderate conueniunt & quoniam sæ pe cum istis febribus iunguntur continuæ vigiliæ, de bemus applicare somnifera, vt tempore debito dor miant, non tamen debemus declinare multum ad ali quod horum, vigiliæ enim virtutem debilitant, som nus humiditatem (quæ nocet in isto casu,) generat. Mo tus si aer sit infectus, animo est fugiendus, quia in eo fit maior inspiratio, quòd si aer non sit infectus, debemus curare vt in declinatione, tempore debito, si sit possi bile, moueatur, vt calor naturalis excitetur. Quan tum ad inanitionem est procedendū, sicuti in aliis pu tridis, curare scilicet vt omnes superfluitates excernā tur. Accidentia animi omnia immoderata fugienda sunt, quia virtutes prosternunt si tamen aliqua sint cū lætitia, sint & moderata : hæc de sex rebus non natu ralibus, quæ omnia hic in Medico explicuimus, vt quæ sunt illa, quæ indicatione sumpta à virtute cōueniunt, enarremus. Restat modo pro complemento curæ, vt ad ea quæ sunt exigenda ratione febris, & venenosi tatis deueniamus, febris ista aliquando non est multū  
in



intensa, tertio epid. aliquando sic, in lib. de euchymia si sit non multum intensa parum indicat, si multum, tunc poterimus applicare epithemata frigida cordi, aduertendum tamen si natura tunc expellit, ad partes cutaneas, eo casu talia frigida non essent applicanda, non laudant Paulus, & Auic. potum aquæ frigida, & alia frigida, quæ in sermone sex rerum non naturalium, diximus. Veniendum est modo ad venenositatem. Venenositas quum sit præternaturalis indicat, vt quod est venenosum educatur, & quod est futurum, fieri prohibeatur, quod est factum educitur cum educentibus humores putridos, quod est futurum, cum resistentibus venenositati. Gal. nono de simp. cap. de terra sigil. in fine dicit, quod in ea peste, quæ suis euenit temporibus similis ei de qua Thucid. loquutus est, permulti sanati sunt ex assumptione boli armeni. Debemus dicit Galen. si non adsit febris, vel pauca dare cum vino albo tenui modice diluto, quod si adsit febris intensa, cum magis aquoso, poterimus sic secure dare vnc. 4. aquæ rosatæ vnc. 2. vini albi, vnc. 1. boli armeni, medicamentum illud ex myrrha, aloe, croco vel armoniaco valet, & quia humores putridos educit, & quia exiccando, venenositati resistit. Gal. in lib. de Theriaca ad Pis. dicit theriacam calorem naturalem roborare, & venenositati resistere, vnde in casu isto, si eam bonam haberemus maxime cōueniret, & Mithridatum. Laudatur betonica, cichorea, termentilla, & sic intentione sumpta à venenositate, possumus vti rebus siccis, stipticis, & acetosis, & sic ratione diuersarum intentionum diuersas poterimus admiscere medicinas, vt in processu ægritudinis, quoniam est intentio incidendi aperiendi, ratione putredinis, resistendi venenositati, ratione venenositatis. Poterimus vti syr-  
pis



## Mathei Curtij

pis accipiendo syropos, & aquas incidentes, & aperientes & venenositati resistentes, vt addendo syropos iā dictos in aliis febribus qui incidunt, & aperiunt sed moderate, vt syrupum de succo acetosæ, de succo buglossæ, vel de acetositate citri, pro aquis, sumendo aquam buglossæ, boraginis, cichoreæ, si volumus vt decoctionibus cum herbis, & radicibus incidentibus, & apperientibus ponemus bolum armenum, terram sigillatam, cortices citri, & eorum semina, acetum, boraginem buglossam, cichoream, & similia, sic procedendo si natura vincit morbum, & tentat, aliquam expulsionem tempore debito, quam tamen non possit in totum perficere in declinatione si virtus constabit, poterimus dare aliquod pharmacum fortius educens materiam peccantem, post cum confortantibus, cum resistentibus venenositati erit procedendum vsque ad perfectam securitatem, & sanitatem acquisitam, post cum debitis exercitiis nisi infectus sit aer tenendo poros apertos, & euacuando vt calor naturalis euentetur, prohibebimus ne alia putredo, & venenositas generetur. Restat modo vt de accidentium correctione dicamus. Istam febrem, vt dixi sequuntur phrenitis, dysentericæ, carbunculi &c. quæ dicta sunt, loquendo de signis. Sed horum cura est in propriis curis explicanda, tantum est aduertendum quòd quando sequuntur febrem pestilentialem, sunt cum maiori malitia, & vt plurimum deducunt ad mortem, & quod dicitur de istis, etiam est dictum de variolis, & morbillis, quæ sunt expulsiones febris sanguineæ. Ideo sicuti aliorum symptomatum, non ponitur particularis cura, ideo Galen. loquendo de febribus de earum cura loquens, non meminit. Quare, & nos, qui omnia hæc ferè à Galen. extrahimus febris tantum curam explicantes



cantes, variolarum, & morbillorum curam pertransibimus.

## De Cura Februm Compositarum.

Februm quædam simplices, quædam compositz sunt, secundo de Crisi. nono, simplices sunt, quando vnius tantum signa apparent. Compositz vero quando plurima signa apparent, vel æqualiter vel alterius eorum signis præterualentibus, secundo de Crisi. 12. Duobus autem modis componuntur febres, vel complicate, vel confuse secundo de Crisi. septimo, complicate, quando diuersa hora inuadunt, confuse, quando eadem hora secundo de diff. febr. septimo. Cõponuntur autem vel quæ sine inflammatione sunt, cum illis, quæ ab alicuius membri inflammatione procedunt, & inter eas, quæ ab inflãmatione sunt simul cum his quæ sunt à diuersitate loci apostematis, & de earum cõpositione habetur secundo de Crisi. decimo sed de febribus apostematum non est præsens sermo. Quæ autem sunt sine inflammatione, complicantur simul quæ sunt eiusdem generis, vel diuersæ, vel eiusdem speciei secundo de Crisi. septimo, & aliquando plures simul complicantur tres tertianæ, secundo de Crisi. nono, tres quartanæ secundo, de Crisi. septimo, & sunt eiusdem speciei. Complicatur simul tertiana cum quotidiana, secundo de Crisi. septimo, & sunt eiusdem generis, diuersæ vero speciei, & quando horum quædam sunt interpositæ, quædam continuæ, secundo de diff. febr. vltimo complicantur continuæ cum interpositis, vt tertiana continua cum tertiana interpollata, quæ sunt eiusdẽ speciei, & tertiana interpollata, cum quotidiana cõtina, quæ sunt diuersæ speciei, secundo de Crisi. nono.



## Mathei Curtij

nono. Item interpollatum simul diuersarum specierum, vel eiusdem speciei, vt tertiana interpollata, cum quotidiana interpollata, secundo de diff. febr. septimo, vel tertiana interpollata, cum quotidiana continua, secundo de Crisi. nono, vel duæ continuæ simul, vt tertiana continua, cum quotidiana, secundo de diff. febr. 8. & secundo de Crisi. nono. Et quando dicitur, quod continuæ simul copulantur, intelligendum est non de vniformibus, quarum putredo est in toto, vel in vasis magnis, ideo dicitur, quod duæ complicari non possunt, copulantur quoque diuersi generis, vt putrida cum hectica primo de differē. febr. decimo, & istæ sunt diuersi generis proximi, febres istas compositas difficilior est cognoscere, q̄ simplices, maxime in prima die, secundo de Crisi. nono, oportet ergo primo cognoscere naturam simplicium, secundo de Crisi. primo, & post exercitatus Medicus aliquando in prima die, sed si non in prima, saltem in secunda, vel tertia vel ad plus in quarta cognoscet naturam compositarum, secundo de Crisi. nono, ipsas autem, vel oportet iudicare ex modo periodicandi, secundo de diff. febr. septimo, siue ex modo inuadendi, secundo de Crisi. nono. Quoniam igitur erunt duæ diuersæ febres, vel plures distinctæ simul, si in diuersis horis inuadunt confuse in ea hora apparebunt signa principii earum febrium, & sic de aliis temporibus. Qui ergo habet exacte signa febrium simplicium, si ei occurrant aliquæ compositæ, non cum difficultate eas cognoscet, secundo de Crisi. nono, Sicuti autem signa febrium compositarum simul complicantur, ita etiam intentiones curatiuæ, & sicuti si vna præualuerit, eius signa magis apparent, alterius signis non omnino occultis: si autē æqualiter miscentur, æqualiter ambarum signa apparent, aliquan-

aliquand  
diff. febr  
attende  
les sim  
rimus  
signis  
pns cu  
simplic  
16. Ad  
recurr  
reca,  
cuni  
euen

Fel  
compl  
de Cris  
interpe  
terpoll  
contin  
tempo  
Gale  
quia  
qui p  
mo,  
terti  
enim  
incip  
nec d  
modi  
sis ho



aliquando autem fortiores, & intensiores secundo de diff. febr. octauo, ita in cura, si vna præualet, magis ei attendere debemus, altera non neglecta. Si vero æquales sint, æqualiter vtriusque cura habenda est. Poterimus ergo cognita natura febrium compositarum ex signis simplicium, quæ omnia adducta fuerunt in propriis curis, curare eas per intentiones dictas in curis simplicium, & uti remediis complicatis, primo Aph. 16. Ad ea ergo quæ dicta sunt de curis simplicium, est recurrendum, verum ut compositarum cura magis pateat, adducemus curam hemitritei, sicuti omnes faciunt doctores, quia magis est cum periculo, & sapius euenit.

## De cura Hemitritei.

Febres Tertianæ, cum quotidiana quatuor modis complicantur secundo de diff. febr. septimo, secundo de Crisi. 9. Nam vel ambæ sunt continuæ, vel ambæ interpollatæ, vel tertiana continua cum quotidiana interpollata, vel tertiana interpollata cum quotidiana continua. Quando autem simul iungitur tertiana interpollata cum quotidiana continua, tunc secundum Galen. fit hemitritæus, nō quia fit media tertiana, sed quia pro medietate est tertiana, sicut dicitur semideus qui pro medietate est deus, secundo de diff. febr. septimo, vel dicitur hemitritheus, primo epid. commento tertio, quia non omnia habet accidentia tertianæ, non enim ad perfectam terminatur infebricitationem, non incipit cum rigore, non terminatur cum excretionem, nec diem secundum habet integrum, fit autem duobus modis, vel incipientibus febribus simplicibus in diuersis horis vna anticipante alteram, non sic quod vtraque

in



## Mathei Curtij

in vno paroxysmo, simul inuadunt, sicuti est in exemplo illius iuuenis, de quo Galen. secundo de diff. febr. septimo, vel sit ambobus febribus semper simul inuadentibus, & in accessione semper apparent signa vtriusque febris. Iccirco quoniam propè hemitritæus fit quando simul inuadat ambæ febres, & in primo tantū sit vna accessio, in qua simul inuadunt, in secundo, plures, ideo secūdo modo proprie dicitur hemitritæus, secundo de diff. febr. septimo, possunt autem istæ febres sic simul complicari, quòd cholera superabūdet, & tunc magis apparent signa cholerae, vel pituita, & tunc magis pituitæ, vel æqualiter miscentur, & tunc æqualiter ambarum signa conspiciamus, & semper dicitur hemitritæus, proprie, tamen est hemitritæus, quando æqualis est mixtio, secundo, de diff. febr. octauo, est ergo hemitritæus proprie febris composita ex tertiana interposita, & quotidiana continua, quando eodem tēpore inuadit tertiana signis, quo, & quotidiana, non magis apparentibus vnius, eo paroxysmo, quam alterius, & est illa febris de qua Hypp. primo epid. sectione prima, & secunda loquitur, quando dicit, inuadebant febres continuæ quæ magis vno die affligebant: aduenit autem dicit Auice. corpori, quod vsum fuerit diætā generante pituitam, vel contra, eius signa sunt dicit Galen. secundo de diff. feb. octauo, quæ ponit primo epid. sectione prima, & secunda, & sunt quòd est febris horrida, idest quæ non habet horrores, tantum in principio, sed durantes per maiore partem accessionis, dicit Galen. primo de diff. febr. octauo, & per maiorem partem augmenti, dicit Gal. primo epid. sectione secunda, estq; non intermittens, vna die grauior, alia leuior, in dies acutior inuadens, dicit Hypp. primo, epid. sectione prima, tales febres sunt violent-

violens  
princ  
ris acce  
& post  
ctione  
dum q  
ad sum  
tur, hor  
ratur,  
te chol  
te aut  
inap  
tius o  
tiana  
com  
tere  
bis la  
Vene  
diceb  
ration  
funt m  
quod  
dinet  
que  
ei  
illa  
& c  
rior  
dita  
hio  
gle  
flu  
cent



violentissimæ, longissimæ, & laboriosissimæ, leues à principio, & incrementales, & quanto diebus decretoriis accedentes, tanto deteriores, aliquando remittunt, & post peiores redduntur, dicit Hypp. primo epid. sectione secunda. Rigores habent inordinatos, secundum quod cholera inualefcit, etiam videtur tendere ad summum, post vincente pituita extrema refrigerantur, horrores veniunt summissiores, & cutis refrigeratur, sic ut videatur noua accessio. Iterum vincente cholera calor augetur, & caloris accidentia: vincēte autem pituita, eius signa quoque vincunt, & sic ista inæqualitas vsque ad statum durat, status aduerit citius quam in pura quotidiana, tardius quā in pura tertiana, secundo de diff. febr. octauo, & sic tandem simul commixta apparent signa pituitæ, & cholæræ, est præterea lethalis ista febris, adueniēs his qui longis morbis laborant, dicit Hyppo. primo epid. sectione tertia. Veniendum est modo ad curam, Gal. primo. Aph. 16. dicebat, simplices ægitudines, simplicibus ægere curationibus quod si compositæ sunt, tantum curatiuæ sunt miscendæ indicationes, quantum commixtæ sunt quod si æqualiter mixtæ sunt ægitudines, ægitudines, æqualibus vtendum est remediis, & vtrunque ægitudinem respicientibus, quod si vna superat, ei est attendendum, altera non neglecta, febris igitur ista est composita ex duabus, ex phlegmatica scilicet, & cholerica. In cura igitur debemus miscere intentiones, quod si æquales sint, æqualiter vtendum est dictis in cura quotidianæ, & tertianæ, si pituita magis, his quæ dicta sunt in cura quotidianæ, altera non neglecta. Ideo ut ex Paulo colligitur, ferè esset superfluum omnia medicamenta, quæ ibi fuere adducta, recensere, maxime quod ista ægritudo ferè eodem modo

L cu-



## Mathei Curtij

curatur, quo & tertiana notha. Ideo & ego remedia non repetens, tamen per vniuersalia percurrēs, ordinē medicinarum recensebo. Primo igitur si, quando incipit febris, sint fæces retentæ in intestinis, ordinabimus clysterem, & si sunt aliquæ cruditates in stomacho, lenitium in sequenti mane, in sero postea, si virtus sit fortis, & ætas patiatur curabimus, vt mittatur sanguis in pauca quantitate, propter nimiam abundantiam aliorum humorum, qui rationabiliter in laborante tali ægritudine reperiuntur, post si natura tentet vomitum, poterimus vti leuibus vomitiuis, & forsan exhibendo vomitium, non erit necessarium lenitium, forsan oportebit vtroque vti, post erit accedendum ad digestiua, prouocantia vrinam, & sudorem & apertis viis, resectis humoribus, apparentibus signis completæ digestionis, si natura ipsa non euacuat, vel imperfecte, dabimus pharmacum, quod educat choleram, & & phlegma. Demum rectificando membra principalia, si aliqua sint læsa, corrigendo accidentia, si aliqua adsint notabilia, ordinabimus regimen in sex rebus nō naturalibus, sicuti ordinauimus in cura tertianæ nothæ, semper tamen habebimus maiorem curam de hemitritæo quàm de aliis, quū sit lethalis, nec sine periculo. Materiam medicinarum & ciborum, habes in cura tertianæ puræ, in cura tertianæ nothæ & in cura quotidianæ, quæ omnia miscebis secundum magis & minus, vt dominium peccantis humoris exigit, & hæc pro cura hemitritæi, & omnium febrium sufficiant.

Fran-




# FRANCISCI

## CASSANI

### TAVRINATIS

#### Quæstio

#### De missione sanguinis in morbo laterali.



XPOSITVRVS sanguinis missionē in pleuritide hac ratione mihi procedendum persuasi, ne huiusce rei confusio lectorū animos interturbaret. Principio igitur ex hypotesi pronunciata præmittam, ex Galeno non quidem detorta; sed ita ex proposito desumpta, vt non nisi ab mentis

penitus infano negari non possent, quæque ad causam nostram aperiendam maximè conducent. Alterum, quod me declaraturum polliceor est, quæ nam mens fuerit Galeni in hoc quæsito omnes quoque hic qui solent fieri cauillos pro posse diuellam, tertio rationibus autorumque dictis, quæ in contrarium facere videntur, examusim respondebo. In limine igitur quæstionis nostræ præmitto, quod ad flegmonem faciendam exigitur, vt membra, à quantitate vel malitia materiæ aggrauata ad alia membra sanguinem propellant. Ita sanè quod ad imbecilliora, ea quæ fortiora

L 2      fin



## Francisci Cassani

sunt membra, demandant, rursusque vicissim ita fit, quoad materia ad membrum debilissimum transmissa fit, imbecillissimum si quidem omnium membrorum, vel facilimè tãdem aliorum fluxionem suscipit, quum aliò iam transferi non possit. Huius ordinem scribit Gal. 2. ad Glauc. & in artis medicinalis libro. cap. 95. & rursus 10. de ing. 6. longè tamen clarius in libello de inæquali intemperatura dist. 2. c. 1. in quo Galenus rem exemplo iucundissimè proponit. Fiat, inquit, gratia exempli, in musculo flegmon. prius magnæ tum venæ, tum arteriæ, deinde maiores opplentur: successeque id fit, donec ad minimas quæ etiam & ipsæ replentur deuentum est, ad eas inquã minimas, quæ prius non conspiciebantur. veluti in oculorum flegmone: quò tandem oppletæ venulæ ad extra sanguinè transfundunt, partim per earum ipsarum oscula, partim quia resudat, & sanguis ille in membrorum vacuitatibus, idest porositatibus recipitur. Declarat insuper, quæ sint illa membra, nempe sicut nerui, ligamenta, membranæ, & id generis. Hac hypothesei proposita rem ipsam aggredior. Affirmareque non erubesco in principio pleuritidis, sanguinem ex eadem lateris dolentis parte esse mittendum, ex vena nimirum basilica eiusdem lateris, verum quia ab innumeris iam hæc est exagitata quæstio, ne nos gratis quorundam refellere opinionem existimetis, primo ratione secundo Hippocratis, Galeni, Oribasii, & Pauli autoritatibus opinionem nostram confirmabimus.

In primis itaque dixerim pleuritim in principio esse ægritudinem partim factam, partim quæ fit, quoniã est ægritudo & apostema à sui principio, taleque inquit Gale. lib. de 4. temp. morb. 2. partim fiens, & futurum partim, at quum ægritudo tum facta existit, tum futura

ra

n est, hui  
simul & f  
men id ce  
per Gal.  
3. sed in  
occurr  
fionem,  
huius dual  
thionem  
guinis p  
que ma  
verum  
ribus  
tis co  
ne & l  
tudim  
quod p  
laret  
mun fu  
mon ex  
tudine  
tis con  
euan  
te hui  
ab ve  
sang  
litat  
euan  
na et  
tione  
thefi  
virtu  
tualit



## De missione sanguinis. 75

ra est, huic inquam ægritudini conuenit curatio, qua simul & semel vtrique satisfaciamus intentioni, si tamen id commodè fieri possit, quod & liquido apparet per Gal. in arte medicinali, & 13. de ing. distin. 2. cap. 3. sed in hac pleuritide inchoante, vtrique intentioni occurrèdum est, quod perbellè fiet per sanguinis missionem, ex eadem dolētis parte secta vena, ergo quòd hiis duabus intentionibus per hanc sanguinis detractionem faciamus satis, probo, euacuo siquidem sanguinis partem superfluentem, & membra exinanio, quæ inanita quod residuum est, nedum pro se retinēt: verum trahunt aliunde, maiores itaque venæ à minoribus sugunt, sanguis proinde, qui in locum apostematis confluerat, ab aliis venis retrahitur, hacque ratione & iam factæ succurritur, & quæ futuræ fuerat ægritudini, verum duo mihi probanda super sunt, primum, quòd per euacuationem vel flobotomiam ex eodem latere futuram, & factam amoueam ægritudinem: primum sic probo, supponebatur enim quòd fieret flegmon ex aliorum membrorum transmissione ob multitudinem: vel malitiam, at ex basilica eiusdem lateris euacuatio superabundantem in toto quantitatem euacuat, quod ex Gal. in 2. reg. acut. 10. probo, dicente flobotomiam ex quauis vena à toto euacuat, licet ab vna immediatius: ab alia tardius, missione igitur sanguinis ex ea vena sanguinis multitudinem vel malitiam, vnde membra ad expellendum irritabantur, euacuo. Rursus quod à loco læso euacuet, probo, vena etenim vacuata aliunde trahit, sed venæ alix fortiores retinent, minus fortes vincuntur, quod ex hypotesi patuit, ergo &c. cum hoc etiam accidit expulsua virtus ipsius partis læsæ, ergo. Hanc responsionem virtualiter, licet non ad verbum, habet Hipp. 2. reg. acut.

L 3

10. præ-



## Francisci Cassani

10. præsertim si adiunxeris quod & ipse dicit in 4. eiusdem 69. quod & manifestum est ex Galeni commentatione utroque in loco, verum ne refractariis & contumacibus aliquod relinquatur confugium, Hippocratis verba exponamus. Inquit ille, si dolor ad furculam ascenderit, adeo ut vel brachio, vel mammae, vel partibus superioribus molesta sit grauitas, internam cubiti venam secare expedit, his adde, quæ in 69. venam brachii internam, qua dolor afficit parte secabis sed reuertamur ad 11. secundi reg. acut. in quo inquit, si quæ sub sepio transuerso partes sunt, à dolore infestentur. nec ascendat vsque ad clauiculam. tunc nigro veratro vtere &c. Gal. in cōmento ita scribit. Quum igitur superiorum condolentia signum fecerit, tunc venam in cubito eam secare oportet, quæ sanguinem ab affecta parte & magis, & velocius tum reuellere, tum euacuare possit: Quibus etiam verbis appone, quæ & ipse scribit in commen. 69. vnde habetur nostra ratio iam clarè exposita, verum ut clarius res cognoscatur, Hyppo. sensum, qui alioqui adeo apertus est, ut expositione nostra minimè indigeat, rursus declarabo. Intendit ergo Hypp. quod dum sit flegmon pleuritidis, & in superiore parte, id quod manifestum euadit per brachii grauitatem, & dolorem in furcula, tunc confestim per sanguinis missionem ex eadē parte succurrendum est, sanguinem quidem superabundantem imminuemus, & eum quoque, qui iam effusus est, sanguinem retrahemus, atque hoc pacto corpus vniuersum inaniamus. Sub inferebat proinde Hypp. quod detrahendus erat sanguis ad coloris vsque mutationem, & in lib. 4. dicebat ad animi vsque defectum, mittitur inquam sanguis ad coloris mutationem, ut probè dicit Gale. non alia causa, nisi ut membra inaniantur, id autem



## De missione sanguinis. 76

tem cognoscere licet ex mutatione coloris sanguinis prorumpentis, membra tunc circunuicina ita inanita à loco apostemoso trahunt. Si dolor, subscribit, descendat ad Hypochondria, non mittatur sanguis, sed exhibeatur pharmacum, quoniam signo nobis est, materiam esse in inferioribus costis, neque ab illis ex basilica sectio tantam quantitatem, ut subtrahat, potest euacuare, prius enim sanguis totus, è, corde educeretur. Idcirco hoc in casu non ita confert, sicuti in prior. At huic nostræ rationi duo sunt, quæ negotium faciesce possunt, primum quòd Hyppo. loquebatur post principium, quod tamen falsum esse constat ex Gal. in principio commenti dicente, Hyppo. obseruare eam regulam, vndecunque natura repit &c. Cum igitur videat sanguinem ad superiora prorepere, ut motum naturæ insequatur, per superiora euacuat. Quòd si Hypp. ipse intellexisset exacto principio, & iam fluxa (ut inquit) materia, ut quid Galen. dixisset Hyppo. motum naturæ imitari? imò oppositum fecisset, si in opposita parte euacuasset. In anaxione præterea non constat, quòd Hyp. sanguinem nisi semel misserit. Nunc quero, an ex opposito latere, an ex eadem parte, si vltimum, ergo contra te, si ex opposito, ergo non obseruauit quem præscripsit canonem, quia per te vult quod mittatur ex opposito, secundo reiteretur ex eodem, sed non fecit in Anaxione, ergo aliter Hypp. operatus fuit, quam nobis scriptum reliquerit, obiciēs, fortè quod non reiterauit, quoniam vires erant debiles, ergo ægritudo fuit satis longa, sed ægritudo longa cum virtute debili est mortalis, tertio cris. 5. dices quòd nimium miserat prima vice, contra, quia dicit Hyp. quòd misit quantum debuit, esset præterea facere Hypp. rudem, qui non sciret quantum sanguinis mitti deberet,

L 4      secun-



## Francisci Cassani

secundum obstaculum potest esse, quia dicent quod materia quæ facit apostema, non potest denuo intra venas redire, sed contra. Galen. in 4. de tuen. sanit. dicit, quod si fuerit ægritudo flegmonosa debet Medicus mittere sanguinem, & euacuare venas, mox debet reiterare, cuius causam adfert ipse Galen. quia venæ inanitæ trahunt superfluitates existentes in partibus musculorum ad se, & in reiteratione educuntur, ergo venæ inanitæ sugunt de eo quod est in porositatibus membrorum. Item 4. reg. acut. 1. venæ inanitæ trahunt icores. Item 3. virt. natural. 13. materia in partibus cutaneis existens trahitur ad venas, & sic habetis meam primam rationem. secunda ratio, quod materia, quæ peccat qualitate, expellitur à membris, & expellitur de parte ad partem, & sic tandem donec sit ventum ad postremum debilius. Tunc fit si materia peccat qualitate, debet educi quàm celerius est possibile, nec debet illa materia mala remitti ad alia membra, sed à Medico euacuari, sed euacuando ab eadem parte educitur illa materia, quæ est illuc transmissa, & euacuando à parte opposita, euacuatur materia bona, & mala trahitur ad locum alium non apostematum. Istam rationem innuebat Gal. 2. reg. acut. 10. dum dicebat, quod Hypp. immitatur naturam, imò obseruat suam regulam, vndeunque natura repit &c. Sed dicet quod illa non est conueniens regio, imò est conueniens regio ad euacuationem per quam educitur materia, non transeundo per membrum principale, nec inferendum nocumentum alicui alio membro notabili, sed sic in proposito, quia euacuando eam materiam per partem & basilicam dextram, via est satis ampla, & nullum oblæditur princeps membrum, & insequimur motum naturæ, ergo est conueniens regio, & sic habetis



## De missione sanguinis. 77

habetis secundā rationem autoritatibus mox est agendum, sed per auctoritates ne fiat confusio, intendo hic probare, primo quòd Medicus rectè operando debet diuertere materiam fluentem, vel reuellere per locum directissimum ipso loco, ad quem fluit materia, secundo quòd debet reuellere per partem habentem communicantiam cum illo membro, ad quod fluit, tertio quòd debet reuellere siue deriuare per locum non immediatum ipsi loco patiēti, sed per locum proximum, & quòd diuersio per loca distantia nullum adfert iuuentum, vel si affert, tarde, ex quibus apparet quomodo debet ex eadem parte mitti sanguis, & non ex opposita. primum probo sic Gale. in 5. de ing. 3. dum loquitur de retentione sanguinis fluentis ex vulnere, postquam declarauit, quòd sanguis retinetur per escaram factam, declarat quomodo etiam deriuatione, & reuulsione, tunc ponit differentiam inter deriuationē, & reuulsionem, & dicit quòd deriuatio fit ex partibus proximis, & exemplificat de defluxione ex palato, quæ ad nares deriuatur. Reuulsio verò fit ad contraria, vt fluentibus mensibus, nos reuelimus per vomitum. Istud dicit fuisse de mente Hypp. & per multa exempla id probat, vultuq; tandem, quòd ista reuulsio fiat ad contraria, & fiat per partem rectam correspondentem parti, per quam fit fluxio, quod exemplo sanguinis ex naribus fluentis probat, vt si fluat sanguis enare dextra, affligi debet cucurbitula in hypocôdrio dextro, & è contra fluente ex sinistra, quòd si applicatio ventosæ non sufficiat tunc veniendum est ad sanguinis missionem, & dicit quòd si vires non fuerint imbecilles, tunc debet sanguis mitti ex vena, quæ de directo profusione respondet, subiungit, quòd omnes reliquas profusiones tum ad contraria reuocabis, tum  
ad



## Francisci Cassani

ad vicina deriuabis. Ecce ergo qualiter secundum Galenum omnis deriuatio vel reuulsio debet esse secundum directum loco patienti, sed dicit aliquis vt in casu nostro, quod pars opposita est directa loco patienti: vt si fluat sanguis è nare dextra, sitque pleuresis in latere dextro. Locus sibi directus erit locus sinister, sed contra quia Galen. explicat seipsum, quia de nare dextra fluente sanguine, mittit sanguinem ecubito dextro, & applicat ventosam hypochondrio dextro. Præterea Gal. in tertio de tuenda sanitate loquens de frictionibus quomodo fiat secundum rectum vel transversum dicit quod rectum vel transversum sumuntur penes villos, vel fibras musculorum. Idem dicit in de motu musculorum, sed fibre lateris dextri nullam habet communicationem cum latere sinistro in rectitudine, sed vena lateris dextri continuatur cum vena caua per villos proprios, & villos longitudinales, ergo pars dextra debet dici recta parti dextræ, non sinistra. Præterea Gal. secundo ad Glaucon. post curam carbunculi loquens de intentionibus habendis in cura inflammationum, dicit, quod fluentium humorum retractatio fit per communes venas, si verò iam membrum obsederint, deriuatio fiat vtraque istarum, scilicet deriuatio & retractatio fit secundum Hypocho. per communes venas, & exemplificat de profluvio mulieris, quomodo debemus & reuellere, vel deriuare per communes venas, subinfert, quod si in parte dextra fuerit locus passionis, à dextra manu, vel crure dextro sanguinem detrahes, si verò in sinistra, tunc detrahes sanguinem à membris, quæ illi ex directo sunt. Quod enim ab ipso catexis dicitur, significat, dicit, secundum rectitudinem. Hic nihil immoror in explicando cata potest construi cum genitiuo, vel datiuo, quia vtrumque construas, verba Galen. sunt adeo clara,



## De missione sanguinis. 78

claras; ut non possint tergiuersari, subiungit Gal. quòd viciniore venas oportet incidere, & aducit causam huius rei, & dicit, quòd iste sunt viciniore secundum directum loco patienti, & ut rem omnem melius pandat, exemplificat de inflammatione splenis, quòd debet Medicus eo flegminante mittere sanguinem ex latere sinistro, è contra hepate flegminante ex latere dextro, & applicat regulam vniuersalem, q̃ patientibus mèbris extremis debet à cōiunctis fieri euacuatio, siue velis deriuare siue velis retrahere, sed dices quod Galenus intelligit, q̃ ista fiant post principium, postquam materia est fluxa. Contra Galen in eadem parte loquens de sinanche, dicit, quòd debet primo mitti sanguis ex vena cōiuncta secundum directum, post debet fieri ex loco ipso, sed quia in sinanche non possumus attingere locum ipsum, euacuamus per venas sub lingua, ergo prima quæ fit secundum eum in directo latere, debet fieri in principio. Iam ergo habentur duo ex dictis probata. Restat tertium probandum ex Galeno in libro de sang. misio. distinct. 2. sum. 2. cap. 1. dicit enim Galenus auctoritate Hyppocratis, quòd. Quibuscunque cataxin, eruptio sanguinis, euenit. hoc iuuat è contra autem nihil iuuat, vel interdum nocet. Cuius rationem & quare aliquando noceat, ipse affert, quia vires corporis citra leuamen ægritudinis deiicit, quod probat suo vsitato exemplo, sanguis effluens turgente liene, à nare dextra nihil proderit, & vice versa in hepate effluente è nare sinistra, & ita reuulsionis causa si venam secueris in oppositis sanguinis eruptionibus, citissime conspicuam habebis vtilitatem, at si contra secabis, nihil profueris, & ad probandum quòd sit necesse in reuulsionibus quòd vena ex qua mittitur sanguis communicet cum loco petiente, & quanto maior &



## Francisci Cassiani

& directior fuerit communicantia, tanto commodior fuerit, dicit quod non æque prodest in liene affecto, si mittatur sanguis ex vena digiti medii, & venæ cubiti sinistri, quia etsi vtraque vena sit sinistra, quia tamen vena cubiti est proximior & directior. Ideo magis conuenit. Post pauca subinfert Galenus, quòd etiam in pleurèticis sanguinis missionem ex vena quæ est secundum directum lateris patientis clarissimam sæpe utilitatē attulisse, quæ verò fuit facta ex latere & brachio opposito, aut omnino obscuram, aut certè post temporis interuallum. Dicunt aliqui quòd per post temporis interuallum intelligit Galenus post principium, quasi velit dicere, quod slobotomia in pleuritide ex eodem brachio post principium iuuat maximè, sed ista expositio non potest stare, cum hoc quod distorquet literam vt patet legenti, cum hoc etiam est falsa, vt apparet ex his, quæ subiungit Galenus in eodem loco, quia vult, quòd reiteretur eadem die aliquādo, aliquando post per diem, sed post principium non est reiteranda bis & ter sanguinis missio etiam secundum illos sic exponentes, ergo Gallenus non intelligit de sanguinis missione post principium. Præterea inde const. art. med. decimonono, dum ponit intentiones curatiuas flegmonis, dicit, quòd prima intentio est euacnatio humoris fluentis in partem inflammata: quomodo autem debeat administrari, apparet ex situ partium, quia si influat sanguis in coxam, debet tunc mitti sanguis ex vena poplitis, & ita fluentibus mensibus ex vena poplitis, quòd si influant humores in pulmonem, vel thoracem, per internam cubiti venam euacuationem demoliamur, & sanguinem subtrahemus. Subinfert Galen. quòd optima & facilissima euacuatio est, quæ per proximas & affectæ parris com-



## De missione sanguinis. 79

communes venas fit, sed dices, quod Galen. per interiore venam intelligit venam cruris ex eadem parte, vt existente pleuritide in latere dextro, mitti debet sanguis ex vena poplitis dextri, & ita illam appellat interiore, sed cum hoc quod ista expositio nō conuenit illi textui, est etiam contra Galenum, quia vt per eum, sexto aphorismorum 36. apparet, & secundo ad Glauconem, & 13. de ing. distinct. secunda cap. 3. existente apostemate in parte superiori, mitti debet perpetuo sanguis ex vena cubiti. Si vero fuerit in partibus inferioribus, debet mitti de vena poplitis, vt si fuerit apostema in vtreo, in vesica &c. Ex directo ergo secundum superius & inferius debet sanguis mitti ex vena correspondente. Ita etiam Galenus 13. de ing. distin. 3. cap. 5. post multa dicit, quod debet Medicus in hepate, & pulmone flegmonem patientibus emittere sanguinem ex vena directa secundum partes superiores, & ita in sinanche debet primo tundi vena manus, per manum non intelligas eam in qua sunt digiti, vt videntur plerique tenere, quia quandocunque apud Galenum inuenitur manus absolute, intelligit vnam, quia vt seipsum declararat in tertio anatomicarum aggressionum, manus est duplex, vna quæ dicitur simpliciter manus, & incipit ab articulo scapulae, & terminatur ad brachiale, altera est manus, quæ dicitur extrema, & ea diuiditur in quinque digitos, & incipit à brachiale, vult ergo Galenus quòd incipiente flegmone in sinanche ex vena brachii lateris correspondentis mittatur sanguis, & in apostematibus membrorum superiorum vult quòd mittatur sanguis ex venis brachii, sicut etiam in de sang. miss. & 6. aphorismorum 36. contra Auicenam, qui vult quod incipiamus à vena malleoli. Post Galenum est Oribasius qui lo-



## Francisci Cassani

loquens de vena scindenda secundum Galenum dicit, quod mens Galeni fuit, quod in pleuritide mitteretur sanguis ex eadem parte, ex latere videlicet affecto. Paulus quoque Aegineta non in capite de pleuritide, quia nihil de eo negotio pertractat, sed in lib. 1. cap. 40. dicit, quod si fuerit dolor in aliqua parte stantel plenitudine, debet Medicus mittere sanguinem ex vena magna, quæ erit proximior loco patienti. Quod est omnino contra Rasis. qui vult, quod si sit plenitudo fiat primo sanguinis missio ex opposita parte, si non sit plenitudo fiat in eadem parte, è contra iubet Paulus, cuius ratio potuit fuisse prima, quam nos adduximus. Et ita apparet ex his quatuor, quod in pleuritide debet mitti sanguis ex eadem parte. Quid autem senserit Auicenna, & Rasis non est nobis curæ, satis est, quod clarè deficiunt à Galeno. Restat modo satisfacere obiectionibus, & primo est autoritas Galeni 4. de ing. 6. vbi dicit, quod si aliqua fluxio valenter irruat, reuellere ad contraria studebimus, utique si fuerit in superioribus vlcus per inferna purgantes: si autem fuerit in inferioribus per superiorem ventrè purgabis, at si iā fluxio restitit &c. ergo sequitur quod reuulsio debet fieri ad distantia, non ad proxima. Respondeo, quod reuulsio debet fieri & potest multis ingeniis, & pharmaco purgante, & ligamentis, & frictionibus, vt apparet 5. de ing. 3. tūc dico, quod in flegmone non possunt fieri reuulsiones omnibus istis ingeniis, sed debet Medicus succurrere optimo ingenio & citius succurrente, iuxta illud, extremis morbis extreme exquisite remedia, in simili dicebat Galen. in eo capite quod flobotomia excusatur aliquando iis ingeniis, si fuerit homo sanus, vt inedia; alui purgatione, multa frictione, exercitio, balneo, verum in 13. eiusdē di-



## De missione sanguinis. 80

distinct. 2. cap. 3. dicit, quod in febricitante non licet  
vbi illis suplentibus vices flobotomie. Ita in propo-  
sito dico, quod nos debemus vti reuulsione, sed cum  
sanguinis missione, non cum pharmacia, & illa quæ fit  
cum flobotomia, fieri potest ex parte recta proxima  
habente colligatiam cum parte læsa, quia nullum im-  
minet periculum ex ea, sed non debet fieri cum phar-  
maco ad partem proximam: quia vt dicit Gal. 13. de  
ing. dist. 3. cap. 5. Medicus reuellendo cum pharmaco  
inflammatur, & calfacit, & facit fluere ad locum læ-  
sum ipsam materiam. Ideo vbi contingit reuulsio à  
medico operanda, non debet eam facere existente par-  
te læsa proxima viis ductū, quia inflammatur ea pars.  
Ideo magis læderetur. Ista est causa, quare Galen. lo-  
quens de reuulsione cum pharmaco vel ligaturis, di-  
cit non debere fieri nisi in parte remota. Ita etiam de-  
bent intelligi verba Galen. 13. de ing. dist. 2. cap. 5.  
Secunda difficultas est, quod Galen. & Hyp. 4. apho-  
rif. 68. loquentes de auersione, dicunt, quod auersio fit  
ad contraria, vt secundum longitudinem, supra infra-  
que, secundum latitudinem à dextris in sinistris, secun-  
dum profundum ante & retro, modo in isto casu de-  
bet fieri auersio secundum latus, ergo à dextris in si-  
nistris, ergo non debet fieri flobotomia in eadem par-  
te. Respondeo, quod diuersio est ad oppositum, sed  
non ad extreme oppositum, sed sufficit quod diuersio  
fiat per contrarium motum, vt si materia fluebat ad de-  
xtrum, quod ego faciam eam fluere ad sinistrum, quod  
facio mittendo sanguinem, quod declaro, quia si san-  
guis fluit à vena caua ad venam paruam, quæ est in  
dextra parte, subtrahendo sanguinem ex eadem par-  
te, inanio venā cauam, & facio, quod sanguis qui prius  
mouebatur ad dextram, nunc reuertitur ad eandem,  
venam



## Francisci Cassani

venam cauam & magnam, & non potest reuerti ad venam magnam, nisi faciat motum à dextris in sinistris, hoc est quod vult Galenus ad hoc quòd dicatur motus à dextris in sinistris non est necesse, quòd semper tendat vsque ad sinistram partem, quia sicut exempli gratia, lapis qui descendit à sursum, dicitur descendere ad centrum, etiam quod continuo non attingat centrum, sed etiam per duas vlnas moueatur descendendo, potest dici peruenire ad centrum. Ita est in proposito, dicitur motus à dextris in sinistris, etiam quod materia non redeat nisi ad cauam venā quæ est in medio, tertia difficultas est, quia Gal. in 1. ad Glauc. cap. de causis inflammationis, dicit, quòd existente flegmone in parte genu debet mitti sanguis ex vena cubiti, è contra si fuerit apostema in cubito, vel in parte superiori, deberet mitti sanguis ex parte inferiori, ergo sic debet fieri in pleuresi, quæ est apostema in parte superiori, debet ergo mitti sanguis ex parte inferiori, vt expoplite, ex isto loco Galeni. credo quòd Auicenna habuerit suam opinionem. Respondeo igitur & dico, quod aliud est de flegmone in parte interna, aliud de flegmone in parte externa, quia flegmon in parte interna, idest in aliquo viscere, indiget celeri subsidio, vt dicit Gale. in initio illius capitis, ita quod nisi fiat talis preuisio in principio, & aliquod committatur erratum, agitur de periculo vitæ, & inter cætera incommoda quæ accidunt ad flegmonem internam est suppuratio, ita quòd si fiat suppuratio est periculum maximum, quia dicit Gale. 2. pronost. § 2. suppuratio est media inter sanitatem, & insanabilitatem, debet ergo Medicus omnino vitare istud incommodum quantum potest, sed nullum est magis præsentaneum remedium, quàm euacuatio à loco in eo casu, quia debet Medicus  
niti



## De missione sanguinis. 81

niti ut materia in eo loco recepta educatur per flobotomiam, & non potest educi per flobotomiā, nisi educatur ex loco rectitudinem habente cum loco læso, & ei proximus, & habet colligatiam cum eo, & ad istud propositum dicit Galen. in de sang. miss. distin. 2. sum. 2. cap. 5. quod in principio apostematum fluente adhuc materia debet fieri reuulsio cum euacuatione, sed in apostemate cruris vel genu, aut alio apostemate exteriore, ubi non est tantum periculum de suppuratione, non curat Medicus reuellendo euacuare, à loco apostemato, quia sufficit quod reuellat à parte distante, quia per sanguinis missionem in brachio bene fit reuulsio & tollitur ille impetus naturæ expellentis ad eam partem, & hoc sufficit Medico. Ideo Gal. in de flobotomia, distin. 2. sum. 1. cap. 3. dicit, quod non debet mitti sanguis usque ad coloris mutationem in omni flegmone sed solum in interioribus, ob scilicet magnum periculum, quod imminet ex ipso flegmone interno; reuulsio opposita solum sistit impetum impellentis naturæ, & non euacuat à loco apostemato. Quod ista sit vera intentio Gale. apparet ex eo 13. de ing. & in de flobotomia, ubi expresse vult quod flegmonizante aliquo viscere ex inferioribus, quod mittatur sanguis ex vena poplitis, quia illa habet omnes conditiones cum ipso utero & vesica, sed in apostemate cruris vel genu non mittit ex illa quæ est sub malleolo, quia non est intentio ad euacuandum à loco læso. Quarta difficultas est, quia videtur quod ex flobotomia ex eadem parte fiat maior attractio ad locum læsum, quam euacuatio, quia videtur quod ex flobotomia ex eadem parte faciamus currere sanguinem, ad eam partem, ad istud respondeo, quod euacuatio ex eadem parte non trahit materiam ad locum læsum, sed attrahit à loco

M. l. l. l.



læso, quia flobotomia, ex quacunque parte fiat, euacuat à toto, secundum Galen. siue ergo fiat ex eadem parte, siue ex opposita, euacuabit à toto, sed accidit ista differentia, quia ab eadem parte melius subducit materiam à loco, & melius suscipit impulsione à natura factam. Quod declaro, quia materia propulsa à venis, impellitur secundum longitudinem villorum si ergo mittatur sanguis ab eadem parte, per impulsione quam habet per villos lōgitudinales tota influit illuc, & non transibit ad locum læsum, & non magis replebit, quàm euacuabit, imò magis euacuabit, sed dices, dicamus quod non euacuem multam quantitatem sanguinis, ob aliquid quòd impediatur, tunc natura suscipit illum impetum. Ideo magis ledetur. Respondeo, quod dum non possumus vnica euacuatione euacuare, tunc stante aliquo impedimento debemus reiterare, & quando Gal. dicit in de flobotomia dist. 2. sum. 3. cap. vlt. quòd si intendamus euacuationi, & reuulsioni, tunc eadem die, & post quatuor horas, si intendamus reuulsioni tantum, sequenti die. Respondeo, quod non intendimus reuellere solum, nisi vt sistamus aliquem alium fluxum, tunc ad sistendum alium fluxum, sufficit reiterare die sequenti, ne debilitetur nimirum virtus. Ideo dicebat Galen. ibi, quod æger debet refici, & post reiterari, sed dū intēdimus reuellere, & euacuare fit id ad prohibēdā aliquā flegmonē, ideo acceleratione indiget, & nō tāta mora. Et quantūuis Gal. dicat, q̄ eadē die debet reiterari, tamē nō itelligatis, q̄ sufficiat eadē die, vt mane, post vespērā vsq; differre, sed debet intermitteri spacium trium, aut quatuor horarum, quia Gal. in hoc proposito loquens in quarto de tuenda sanitate dicit, quod debet tantisper intermittere, vt alii humores, qui sunt intra venas, intro remeant. Hæc satis dicta sint pro ista quæstione.

Com-



# COMPENDIVM

## BREVE BENEDICTI

VICTORII FAVENTINI,

De Dosibus medicinarum.

### Caput primum.



**E R M O** iste brevis tria  
habet capita principa-  
lia, primum caput est  
medicinarum soluentium,  
secundum caput erit di-  
gerentium, tertium vn-  
guentorum & empla-  
strorum. Pro primo ca-  
pite attende, quod me-  
dicinae soluentes quædam  
sunt in forma potabili,  
quædam in forma pilu-  
larum. Et quoniam medicinae soluentes in forma po-  
tabili, & in forma boli, eodem cursu currunt, ideo pri-  
mo de his similiter sermonem habebimus. Et nota,  
quod medicinae soluentes sunt duplices, quædam sunt,  
quæ solvunt electiue humorem proprium, vt Scam-  
monea coleram, Sena, epithimum, melancholiâ, Tur-  
bit, & agaricus pituitam, quædam sunt medicinae sol-  
uentes leniendo, & sunt illæ quæ euacuant à viis latis  
educendo materias communes, & ideo sunt basis om-  
nium medicinarum electiue soluentium, veluti est cas-

M z fia



sia fistula, manna, thamarindi, & condimenta quædam  
sicut cōfectio de prunis sine scamonea, de sebesten si-  
ne scamonea, & de cassia sine scamonea, Dosabis igi-  
tur medicinas soluentes leniendo, secundum medici-  
nas soluentes secundum electionem humorum educen-  
dorum. Et attende quod cum dosis medicinarum sit  
quantitas ponderalis earundem, quod in volendo do-  
sare medicinas lenitiuas debes habere respectum ad  
ætates principaliter, eorum corporum, quæ lenitiue  
euacuari debent. Considerabis igitur tres ætates, pri-  
mo ætatem à septimo ætatis anno infra, secundo à se-  
ptimo vsque ad sexagesimum annum, tertio ad sexage-  
simo vsque ad vltimum senium. In prima itaque æta-  
te Medicus debet esse valde prudens, & timorofus in-  
dando medicinas solutiuas, in quibus ingreditur sca-  
monea, vel aliud forte solutiuum, sicut est turbit, esu-  
la, & etiam pro parte agaricus, quoniam à septem an-  
nis infra ætatis corporis humani humidum est val-  
de resolubile, & medicina electiue, operans nedum  
agitat humidum, verum etiam sui caliditate illud con-  
sumit, ideo consulo quod Medicus in quantum potest,  
caueat ab exhibitione medicinarum in dicta prima æta-  
te. Sed quoniam medicinae lenientes vltra hoc quod  
euacuant materias communes in viis latis existentes,  
non viciant membra, à quibus, educunt ideo in hac pri-  
ma ætate denegandæ corpori non erunt. Quarum do-  
sis communis erit maior vsque ad drag. 7. Iuniorum  
vero secundum quod annuarim minorabitur ætas à se-  
ptimo, anno infra, vt in ætate septem annorum auda-  
cter exhibe cassiam ad dosim dragmarum 7. In ætate  
sex annorum 6. drag. dabis. In ætate vero quinque an-  
norum drag. 5. cum veneris ad ætatem quatuor anno-  
rum consulo, vt nullatenus des ipsis pueris medicinas  
le-



lenientes, quoniam sui viscosæ substantiæ, & dulcedine facile cōmouent vermes. Igitur pueris à quatuor annis infra prohibebis omnia hæc cassiam, & confectionem de sebesten, & confectionem de prunis, & similia his eo tamen tempore libere poteris offerre ipsis pueris rheubarbarum in substantia mag. quia oppugnat vermibus, minus vero in infusione. Et maior dos rheubarbari in dicta ætate erit vsque ad drag. vnā, vel in forma pilulari, vel in forma potabili. In ætate vero media, cuius sunt tres particulares ætates, vna vsque ad 18. annum, alia vsque ad quadragesimum, tertia vsque ad sexagesimum. In prima ætate dos medicinarum lenientium poterit ascendere vsq; ad dragmas decem à decem & octo vsque ad quadraginta, vsque ad vnciam vnā & mediam à quadraginta vsque ad sexaginta quandoque dragm. decem, quandoque vnc. vnā & med. dare poteris attenta consideratione ad obedientiam, vel inobedientiam alicui, siue ea tribue in forma boli, vel in forma potabili. In tertia ætate vero, quæ est vsque ad vltimum senium nunquam transcendas dosim dragmarum 10. medicinarum lenientium. Et sic in omni ætate audacter poteris contribuere prædictas doses medicinarum lenientium. Demum considerabis dosim medicinarum electiue soluentium. Et attende, quod tales medicinae sunt in duplici differentia. Quædam enim sunt furiosæ in suis operationibus, & modo soluendi, vt scamoneum, elaterium, quarum operationes, sunt sicut furiosi operatores, & ideo cogitabis quod dosis dictarū medicinarum sit per gr. & non per drag. vel per scrup. & in dando tales medicinas corpori humano non attingas vsque ad scrupu. earum, sed multo infra dosabis eas per grana adeo vt earum dosis non sint, nisi gr. 10. si vero

M 3 sint



sint medicinæ laboriose soluentes non tamen cum furia, & celeri euacuatione materiæ peccantis, dosis earum non attinget vnc. sed communis dosis earum non debet præterire vnc. med. vt turbith, agaricus, aloes. Si vero fuerint medicinæ electiue soluentes compositæ, quæ solunt per virtutem scamoneæ, vel alterius fortiter soluentis, dosis earum de per se. non debet præterire dragm. quatuor sicut est electuarium indum, electuarium de dactylis. Confectio amech, confectio elefscoph. Electuarium de succo rosarum. Si vero hæ medicinæ compositæ in quibus est virtus scamoneæ, vel alterius electiue soluentis, offerantur corpori humano permixtæ cum medicinis lenientibus sicut est communis practicandi modus, non attingas earum vnc. med. sed secundum quantitatem medicinæ lenitiuæ dosabis prædictas medicinas, vt si maior sit dosis lenientium, minor dicatur esse dosis electiue soluentium, verbi gratia, si dabis drag. 6. cassiæ fistulæ nouiter tractæ, vel alterius de prædictis medicinis lenitiuis secure poteris ei admiscere electuarium indum, vel diaphiniconem in dosi dragmarum trium. Si vero lenitium fuerit vncia vna, solutiui dosis non transeat drag. 2. & ad plus drag. 2. cum dimidia, & eandem dosim solutiui obseruabis, si plura solutiua adinuicem permiscere volueris, siue hoc fiat in forma boli, siue in forma potabili.

Si vero Medicus morbum curabit cum exhibitione pilularum, consideret primo si compositionem illarum ingreditur scamonea vel non, si non, sicut in pilulis de agarico, & de assaiaret, de aloe lota, tunc dosis istarum debet esse vsque ad maximam dosim quæ est dragmarum 2. Et quia melius est infra subsistete quam complete euacuare, ideo communis earum dosis maior erit  
vsque



vsque ad dragmam vnam & med. attenta etiam ætate ipsius patientis, quoniam si esset puer, vel senex, earum dosim minuere debebis, si vero in earum pilularum compositionem ingrediatur scamonea, debes considerare quantitatem scamoneæ ingredientis, si maior illius quantitas fuerit, tunc minues dosim earum, dato etiã quod non multum ingrederetur de scamonea, sed si cū ea multa alia soluentia ingrederentur, sicut sunt pilulæ cochix Almanf. Et pilulæ foetide, & multe alie his similes, quarum dosis communis maior est dragm. vna, vsque ad scrupulos quatuor, tunc considera quod tales pilulæ medicinæ sunt prohibendæ & cauendæ à Medico in prima ætate, & tertia de iam dictis ætatibus, vbi vero has pilulas cōpones cum pilulis, in quarum compositionem non ingreditur scamonea, vel aliud forte solutium, secundum quantitatem pilulæ non scamoneate, verbi gratia, cum scrup. duobus pilularum assaieret, vel de agarico, vel elefanginarum poteris permiscere scrup. 2. vel 2. & med. pilularum scamoneatarū vel aliud forte solutium. Et hæc de medicinis soluentibus tum leniendo, tū electiue educendo.

Secundum caput est de digerentibus, seu de dosi ipsorum quæ corpori humano offerri debent.

Attende quod cum maior virtus alteratiua membrorum corporis humani sit in decoctione facta ex appropriatis simplicibus materiæ digerende, quam reperitur in syrupis & aquis distillatis, ideo consulo, quod ceteris paribus maior quantitas syruporum cum aquis destillatis corpori exhibeatur quam ipsius decoctionis, ob quam rem considera quantitatem corporis

M 4      pacien-



## Bened. Vic. Fauen.

patientis, & quantitatem materiæ peccantis digerendi, quod si corpus robustum & magnum fuerit, cuius membra sint proportio nata quantitate, poteris syruporum dosim crescere cum aquis destillatis vsque ad vnc. 8. pro vice ei offerantur vnc. 3. syruporum & in his non ingrediatur aliquod solutium, & vnc. 5. aquarum, quod si non fuerit tantæ magnitudinis & roboris corpus, vel in ætate pueritiæ, minuere debes dosim syruporū secundum quantitatem minoris corporis, & etiam ætatem pueritiæ, vt si communis dosis syruporum cum aquis destillatis fuerint vnc. 5. secundum quod corpus erit excedentis quantitatis & crassitie, & etiam materia erit multa, exhibebimus maiorem dosim syruporum. Si vero à mediocritate corporis minuatur corpus humanum, & in eo pauca sit materia. Infra communem dosim syruporum poteris deuenire ad vnc. 3. vsque ad vnc. 3. syruporum cum aquis destillatis. Si vero pergratum erit Medico, vel infirmo digerere materiam cum decoctionibus, cum in ea maior sit virtus digestiua illius decoctionis dosis erit vsque ad vnc. 5. vna cum modico zucchari, vt melius natura voluptuetur in ea, quæ etiam decoctione in sua dosi poteris permiscere vnc. vnam syruporum secundum quod expediat pro digestionem huius vel alterius materiæ digerendæ, & hæc de dosi digerentium dicta sint.

### Tertium caput de vnguentis

#### & emplastris.

In omni quantitate vnguentorum dosis debet esse alis, vt pro qualibet vncia oleorum, vel succorum in-

ingre-



redientium vnguenta sufficit dragm. med. puluerum ingredientium dicta vnguenta, quod si volueris vnguenta in suis virtutibus vigorare, pro quælibet vnc. olei, vel succorum addere poteris dragmam vnā pulueris, de dosi ceræ ingredientis huiusmodi vnguenta dicimus quod diuersificanda erit secundum quod attendimus maiori, vel minori vnguentorum densitati. Vbi velimus densius vnguentum, plus de cera dabimus. Vbi vero minorem densitatem requirimus, & minus de cera contribuimus, ob quam rem cum cerota componere voluerimus, maiorem ceræ dosim contribuimus.

Vbi vero vnguenta mollia tētabimus, & maiorem ceræ quantitatem addemus. In prædictis quoque vnguentis considerare debes quātitatem, seu dosim oleorum ingredientium, similiter succorum, & puluerum, & quandoque gummorum iuxta quantitatem humorum peccantium, quod si humor peccans calidus fuerit, dosim frigidorum augmentabis. Si vero frigidus, dosim calidorum in maiori quantitate præparabis. Et simili modo in passivis de humido, & sicco dicemus: semper tamen attenta complexione membri peccantis, quod si fuerit membrum complexionis frigida patiatur, autem ægritudinem calidam, dosi medicamentorum debet declinare ad maiorem gradum frigiditatis, primo vt repellamus calidam, secundo vt temperaturam frigidam membri conseruemus, & sicut dico de hac, dicendum est de complexione calida, sicca, & humida. Et attende quod si membra principalia patiantur à mala complexione calida, vel frigida, non debes illis applicare vnguenta, vel cerota quæ sunt vehementis frigiditatis, vel caliditatis, quoniam medicamenta intensæ qualitatis, non debent appli-



## Bened. Vic. Fauen.

applicari membris principalibus propter rationes dadas a Principe in quarta primi. Si vero volueris emplastra componere aduerte, quod ea, quæ decoquuntur, vt herbæ, semina, radices, in maiori dosi debent assumi, quam sit dosi pinguium, puluerū, farinarū, & oleorū ingredientium dicta emplastro, quoniā de oleis in emplastris tantū debes apponere, & de pinguibus aliis sicut butirosa, & pinguedines tantū debes apponere quantū sufficit ad impinguandū solū ipsa emplastra. Et hoc vt aliorum virtutes non confundantur. Et in his emplastris debes habere considerationem ad complexionem morbi peccantis, quod si morbus calidus fuerit, vigeant in emplastro frigida, non tamen sine adiutorio aliquorum calidorum, ne sua frigiditate constipetur, & compingatur materia in loco laborante. Simili modo si complexio morbi fuerit frigida, non sis contentus solis calidis, ne eorum caliditate membrum patiens dissoluatur. Et ideo relinquo prudentiæ Medici in dosando emplastro, & eorum quæ ingrediuntur ipsa, in frigidando calidis complicare, & in humido, siccis & contra. Et hæc sunt de oleis & vnguentis, ac emplastri.

Con-



## CONCLVSIONES

BARTHOLOMEI

MONTAGNANAЕ

DE COMPOSITIONE,

&amp; Dosi medicamentorum, etiam omnium ferè simplicium.



IN OR debet esse  
dosis ingredientis com-  
positionem, quæ est ele-  
uata in gradu, quâ quæ  
non est ita. Elleborus  
in gradu, vt si spici nar-  
di, camomillæ adiun-  
gatur, minor debet esse  
dosis quam camomil-  
læ, quæ est calida & sic-  
ca in primo, & prima.  
inuasione.

Maiores debet esse medicine dosis habentis respec-  
tum ad longinquas partes, quam ad propinquas, &  
agaricus licet educat phlegma à toto corpore, maior  
tamen est respectus eius ad stomachum. Et Hermo-  
dactili maiorem habent respectum ad iuncturas, qua-  
re in comparatione ipsorum cum Agarico maior de-  
bet esse dosis Hermodactilorum ad educendū phleg-  
ma ex utroque.

Minor debet esse dosis Scamoneæ, quam Rhabar-  
bari,



88 Bart. Montag.

bari, & tanto minor quanto excedit in gradu.

Medicinæ ingredientis compositionem multorum iuuamentorum, vel operationum, minor erit dosi, quam multorum iuuamentorum tardæ operationis.

In medicina ponuntur aliquando duæ probasi, aliquando tres, aliquando vna tantum, vt in Benedicta ponitur Turbith ad euacuandum phlegma à renibus, & iuncturis, & ad ipsum fortificandum ponuntur Hermodactili, & quia tarde operationis Scamonea in paralyfi, quæritur materierum consumptio, & neruorum corroboratio. Ergo simul miscetur Castoreum & Piretrum pro vna basi, aliquando ponuntur in vna basi duæ medicinæ contrariæ cognatæ membris diuersis, quia natura diuidit vnicuique suum proprium, & conueniens. Nam vnumquodque membrum non remouet quod sibi non conuenit, ad quod iuuatur ab attractiua, & aspectu membri.

In solutiuis quarti gradus distinguitur quia ponimus primo gradu solutiuum. Aquam lactis, syrupum violatum, mel rosatum colatum. In secundo Thamarindos cassiam fistulam, mannam. In tertio Polipodium rhabarba. & similia. In quarto Scamoneum, ferapinum colatum. Dosis autem in minori gradu minor erit.

Tenenda hæc regula firma & solida ne transcendant vnciam duas, syrupo. licet dosis consueta sit vnciam duas neque vncia tres, aquarum pro singulis viribus.

Volens ordinare syrupum debet assumere accommodatum membro cui paretur syrupus, & ad stomachum. Absinthii syrupus vnc. vna, & de mentha vnc. 2. aque eorundem an. vnc. 2. in casu frigido.

Hec regula sit infallibilis in omni affectu calido & fri-



frigido, si dandus erit syrupus miscere conducit aliquā  
aquam cordialem, & buglosse, vel melisse.

Omnes syrupi cōpositi ex variis medicinis respiciē  
tes varias egritudines appellantur magistrales, vt ex  
Absinthio, ex stechade, stomacho, & capiti.

Medicinæ educentes, alie sunt lenitiue, vt Cassia,  
manna, diacassia, sebesten, Aliæ laxatiuæ, quarū alie  
simplices priorum quatuor humorum, alie compo  
sitæ vel in pilulis, vel electuariis.

## Doses.

Syruporum dosis ad haustum vnum vnc. 2.

Aquarum cum mixtura syr. duplum totius.

Decoctorum siue syrupus ad vnc. 4. med.

Elect. à drag. 2. vsque ad vnc. 2. non certa.

Loch ad vnc. med. successe lambendo.

In digestiuis obseruandum quod membrum præcipue  
peccet quod vbi remotum fuerit ab ore plus aque di  
gestiue haustus miscendum, si proprius, plus syrupi,  
vnde fit, vt aliquando in doloribus renum, matricis  
vesice solis aquis digeratur sic etiam si stomachus, &  
mezerica peccent solis syrupis digeri materia potest  
in quibus Medicum anatomices meminisse iuuat.

## Medicine in liquido cholere.

Thamarindi quorum dosis est a drag. tribus ad drag.  
quinque.

Diaprunis ab vnc. med. ad drag. quinque.

Elet. de suc. ros. à drag. 4. ad drag. quinque.

Conf. Ham. ab vnc. med. ad dragm. sex.

Diamanna ab vncia vna, ad vncias duas.

Cassia



## Bart. Montag.

Cassia extracta ab vnc. vna ad vnc. duas.  
Diaprunis simplex à drag. 4. ad vnc. 2.  
Elect. de sebest. ab vnc. med. ad drag. 5.  
Elect. de psilio à drag. tribus, ad drag. 5.  
Hiera simplex à drag. 3. ad vnc. mediam.

### Phlegmatis.

Diaphen ab vnc. med. ad drag. 5.  
Indi ab vncia media ad drag. 5.  
Elefcophi ab vnc. med. ad drag. 5. vel sex.  
Hiere simp. à drag. 3. ad vnciam med.  
Benedicte lax à drag. 3. ad vnc. mediam.

### Melancholie.

Diasen. à drag. 6. ad vnciam vnam.  
Hiere ruf. Hiera log. Hiera cherm. ab vnc. med. ad  
drag. quinque, vel sex.  
Diacatholicon a drag. 5. ad vnc. vnam.

### Medicine in solido pilularum phlegmatis.

Hiere simplicis	Hiere composite ad vnc. 1.
Cochiarum	ad scrupulos duos.
De agarico	ad scrupulos duos.
Sine quibus	ad scrupulos duos.
Agregatiuarum	ad scrupulos duos.
Hermodaëtlorum	ad scrupulos duos.
Turbit	ad scrupulos duos.
De opoponace	ad scrupulos duos.
Euphorbii	ad scrupulos duos.
Serapini	ad scrupulos duos.
Benedicte lax.	ad scrupulos duos.

De



## Pilule cholere.

De rhabarbaro	a drag. 1. ad drag. duas.
Hiere simp.	a drag. 1. ad drag. duas.
De fumoterre	a drag. 1. ad scrupu. 4.
Auree	a drag. 1. ad drag. duas.

## Stomatice.

Azacorit, elephanginarum, aloes, mastice, hiere cum reub. hiere cum agar. lucis. ad drag. 1.

## Tabule.

Diaphenicon	a drag. tribus ad med.
Turbith	a dragm. tribus ad 4.
Tragea	a scrup. 1. ad vnc. med.
Elect. de suc. ros.	a drag. 3. ad vnc. med.

## Pilule melancholice.

De fumoterre	ad dragmam vnam.
De lapide lazuli	ad scrupulos duos.
De quinque generibus mirab.	ad drag. 1.

## Additio ad doses syruporum.

Syrupus digestivus a drag. 5. ad vnc. 2.  
 Pro fyrupi vnc. vna aquarum vnc. 2.  
 Pilule a scrup. vno ad drag. vnam, sine acuitione, vbi vero per gr. acuius addimus a gr. vsq; ad 2. Sed tunc quoque de pilularum pondere docuimus & scribimus a scrup. 2. ad dragmam mediam.  
 Boli laxatiui a drag. tribus ad vnc. med.  
 Elec. cum aquis a drag. 3. vsque ad drag. 6.  
 Conserue ad restaurandos spiritus vitales pro qualibet conserua specierum miscemus specierum scrupu. 1. ad drag. med.

## Tabula



# TABVLA DOSIVM COMMVNIVM

tam simplicium, quam compositorum  
extantium in vsu.

## A

**A** Ceti passulati, Passularum ad acetum sit propor-  
tio in decies minor, vt acetum libra vna, passula-  
rum dragma vna.

Aceti squillitici . . . . . vnc. 3.

Aceti diarrhodon . . . . . vnc. 3.

Aceti conditi . . . . . vnc. 3.

Acuentium pharmaca in 10. minor vt,

Agarici drag. 1. salis gemme gra. 6.

Agarici decoctionis a drag. 2. ad drag. 5.

Agarici contriti a drag. vna, ad drag. 2.

Aloes loræ a drag. 2. ad scrupulos 8.

Antidoti hemagogi . . . . . vncia med.

Aquæ ad iulep proportio sit quadrupla, vel sexdupla.

Aquarum destillatarum, vel decoctionum e syrupis vncie  
6. cum saccharo.

Aquarum cum syrupo . . . . . vncie tres.

Aquarum pro decoctione solutiuorum sit vsque ad vn-  
cias octo, consumpt. ad medietatem, si ex fructibus;  
si ex floribus ad quartam, si ex herbis ad 3. partem.

Aqua sacchari quæ pro potu sit ex vncia vna sacchari  
vnc. 2. 1. aquæ bulitio sit ad consumptionem tertiæ  
partis.

Aquæ sacchari in confortatione non acuti ab vnc. 2.  
sacchari ad libram vnam.

Aquæ compositio, vt med.

Aquæ hordei pro potu in cibo sunt aqua libr. octo, hor-  
dei



dei libr. 1. post ebullitionem illā proiciatur aqua illa, & suppone secundo lib. aquæ, & decoquatur usque ad cōsumptionē duarum partium, de tribus usque quo ad libr. vnam deueniat.

Aquæ mellis pro potu tantum mellis lib. vna, ad 12. aquæ, decoctio fit ad consumptionem tertię partis.

Hidromellis mellis libr. vna, aquæ libr. octo, ad consumptionem tertię partis, & aromatizetur quandoque cum dragmis duabus pulueribus ligati in petia in libra vna aquæ.

Aquæ calibeate extinctio fit chalibe decies extincto, deinde coletur.

Aquæ simplicis decoctio fieri debet ad consumptionē duarum partium ex tribus ita, vt non remaneat nisi tertia.

Aquæ naturalis potio fit à lib. vna, ad tres.

Aquæ lactis potio fit à drag. 3. ad lib. 3.

Aquæ granatorum cum suis pulpis contritorū ab vnc. quinque, ad vnc. octo.

Aquæ fructum m. ab vnc. 2. ad quatuor.

Aristologiæ à drag. vna, ad drag. duas.

Aromatici rosati cum melle drag. quinque gariofilati similiter in forma solida dosis est vnc. vna.

Asari infusi dos. à drag. tribus, ad quatuor, contriti vero à drag. 1. ad drag. 2.

## B

Balneorum artificialium consumptio fit vnius partis ex quatuor, aut vna de tribus.

Been à dragma media, ad dragmas duas.

Belliricorum infusorum ab aureis 3. ad 6.

Benedicte dosis à drag. tribus, ad vnc. mediam cum vino calido in clystere à vncia vna, usque ad duas.

## N

## Brodii



Broddii caulium pro lenitione ventris scutella vna.  
Broddii galli decrepiti ab vnc. 2. ad libr. i.

Brodii galli decrepiti ab vnc. 2. ad libr. 1.

Capill. vene. scilicet decoctio in aqua cum aquæ li-  
bra vna.

Caput purgiorum succi fit ad aquam proportio subtri  
pla, seu subquadrupla pulueris à drag. vna, ad plus.

Cauteriorum pulueris dosis ad drag. vnam.

Carthami infusi ad drag. quatuor, ad nouem, contriti  
vero à drag. i. ad quatuor.

Caricarum in decoctionibus an. 4. ad 8.

Cassia fist. extracta ab vnc. vnam, ad duas, in casu ab  
vnc. 2. ad 4. | Ego tres sumpsi.

Cartartici imperialis, a drag. tribus, vel s.

Cerotum communiter ordinatur ab vncia vna, ad vn-  
cias duas.

Cerotum ex quolibet gummi, mastice, galbano, & huiusmodi cum aceti, vel vini parua quantitate dissoluti fieri potest.

Cerotum stomachale ad formam scuti parui deferendum est supra stomachū per duos, aut tres menses.

Cerotum splenicum quartanæ, supra pannum albū  
de lana longitudine spithamæ, latitudinis quatuor  
digitorum sex mensibus continuis deferendum.

Cerotum hepaticū formæ lunaris, latitudinis palmæ.

Cerotum cordiale rotundum ad formam rotulae mediocris super panno de gran.

Cerotum matricale rotundum magnitudinis nebulæ  
magnæ supra vmbilico deferendum sex mensibus.

Cerotum pro sciatica, fit quasi sphericum longitudinis  
unius spithamæ, latitudine sex digitorum conti-  
nue deferendum.

Cero-



- Cerotum capitale ad formam manus super buginata.  
Centaureæ dosi à drag. vna, ad duas, in decoctione  
ab vnc. vna, vsque ad 4.  
Chebulorum infusorum ad drag. 4. ad decem contri-  
torum à drag. 2. ad tres.  
Ciclamini ab vnc. duabus ad quatuor, & proprie suc-  
ci eius.  
Citronum conditorum vnc. 3.  
Clysterium decoctio ab vnc. quatuor, vsq; ad cyathos  
tres, olei vnc. 3. pul. 2. drag. vna. ad drag. duas, ele-  
ct. vel sepi. vnc. 1. ad duas salis a drag. vna, ad tres.  
Collirium pro oculis ex g. 3. aque cum sief. sine opio,  
tutia præparata abl. dra. med. ad plus.  
Colochintidis dosi à scrup. vno, ad duos.  
Cōfectio in solidis cōmuniter à drag. quatuor ad sex.  
Cōfectio anacardina secundum Mesuē ad drag. duas,  
secūdm Modernos semidrag. cum vino bis in heb-  
domada in hyeme, in estate vero semel.  
Cōfectio magistralis in morsellis tanta fructuum,  
quanta carniū, & pro qualibet libr. paste libr. vna  
sacchari quantum sufficiat.  
Cōfectio magistralis in rotulis pro qualibet drag. 1.  
specierum, vult sacchari vnc. duas ad minimum, cō-  
muniter tamen tres.  
Cōfectio vsualis pro vermibus ad drag. tres.  
Consolantis ad solutium subdupla pro portio requi-  
ritur, vt turbith, drag. 2. zinzib. drag. 1. corrigen-  
tium debet esse ad solutiua proportio equalis ad  
subdupla.  
Conseruæ violatæ ab vnc. duabus, ad 3.  
Cucurbitæ elixæ, seu frixæ expressionis eius cum sac-  
cha. ab vnc. 4. ad tres.  
Cucumeris asinini à gr. 10. ad 30. cum saccharo cum  
N 2 pul.



Bart. Montag.

pul. à dragm. 15. ad 35.

Decoctum eius à drag. 2. ad drag. 4.

Cynoglossæ opiate à drag. med. ad dragmam vnam  
ad plus.

Colaturarum decoctio, idest consumptio fit vsque ad  
medium, nec transeat libr. vnam simplicium deco-  
quendorum vnc. 1.

D

Decoctio caricarum erit nu. quatuor, sebesten nu. 6.  
prunorum 7. iuiubarum octo.

Passularum drag. vna, tamarindorum drag. med. pru-  
norum de pers. nu. 4. vsque ad 6. Iuiubarū ad octo,  
ad decem sebesten a 6. ad 15. Caritæ a 3. ad octo,  
passul. ad vnc. vna ad duas tamarindorum ad vncia  
vna, ad duas.

Diacalamentum dragma vna.

Diacasix ab vncia vna, ad vncias duas.

Diacodii vnc. 1. Diacori drag. 6.

Diacurcumæ drag. tres.

Diacimini in forma solida drag. tribus.

Diacytoni laxat, ad vnc. 4. ad vnc. sex.

Diacytoni cum speciebus vnc. 1. siue vnc. duabus, so-  
luti dragm. sex.

Diagalange in elect. drag. 3. in forma solida drag. 6.

Daireos drag. 6.

Dialaisse drag. quatuor.

Diamargarit. drag. med.

Diamoron sic. drag. sex.

Diambræ in elect. dragm. 3. in forma solida a drag. 6.  
ad vnciam vnam.

Diamarinati drag. duas.

Diamusci in electuariis dulcis drag. duas, sed in forma  
solida



# De Dosibus.

91

solida	drag. quatuor.
Dianthos	drag. 1.
Diapapaueris	drag. 1.
Diapenidi	vnc. duas.
Diaphenicon in elect. ab aureis 3. ad 4. in forma solida	a dragm. 6. ad vnc. 1.
Diaprunis solutiui	drag. 6. simp. vnc. 2.
Diarob descriptum communiter	ab vncia media ad dragmas sex.
Diarob cum agarico	a semidrag. ad drag. 6.
Diarob cum sena	ab vnc. med. ad drag. 6.
Diarob cum turbith	a drag. 2. ad drag. 6.
Diarrhodon abbatis	vnciam vnam.
Diasenæ	a drag. 5. ad dragmas septem.
Diasatyrium Mesue	aur. 5, Nic. drag. 3.
Diadragantum alb.	drag. 1. & rubri file.
Diatrion pipereon cum melle	dragm. 2. sed in forma solida drag. quatuor.
Diaturbith	ab vncia media ad vnam.
Diureticarum decoctionum	vnc. 5. cum saccharo lacte sem. communi vnde vnc. 4. succi facilis drag. 3. fortis drag. 2.

## E

Elect. confortatiui ac laxatiui	dragm. 1. atque aperit pul. drag. vna.
Elect. elefcoph.	ab aureis 2. ad tres in forma solida a dragmis sex ad vnc. vnam.
Elect. lenitiui	ab vncia vna ad vnc. duas.
Elect. de sebesthen	simp. ab vnc. 1. ad duas.
Elect. per digest. humorum,	vnc. med. cum vnciis duabus aquæ appropriatæ.
Elect. de succo ros.	a drag. 3. vsque ad 6.

N 3

Elect.



## Bart. Montag.

Elect. de sebesthē solutiui à dragmis quatuor, ad dragmas septem.

Elect. de pfilio a drag. 2. ad sex.

Elect. de empithimio a drag. 2. ad drag. sex.

Elect. in decoctionibus, vel infusio à dragma vna, ad vnciam mediam.

Elect. de aromatibus vsque ad aureos 3.

Elect. de gemmis aureum vnum cum aqua buglosse, aut vino bono.

Elect. regum drag. vna, vsque ad drag. 2.

Elect. de baccis lauri per os vnc. med. in clystere vn. 2

Elect. de sorbis vnc. vna.

Elect. indum a drag. duabus ad quinque.

Elect. dulcis drag. 1. cum brodio cicerum rub.

Emblicorum infusorum ab aureis 3. ad 6.

Ellebori nigra a scrup. vno ad scrupulos duos, Epatis lupi dragma vna.

Epithemi decoctum ab vncia vna ad tres contriti vero a drag. tribus ad drag. 6.

Epithematum aquarum a libra media ad duas, aceti albi a drag. vna ad vnciam vnā, Croci vel Camphoræ a gr. 4. ad scrup. medium, & vsque ad vnum.

Embrogatum pro qualibet libr. vna aquæ vini, vel alterius liquoris m. 2. herbæ, vel florum, vel seminū consumptio vero quartæ partis, vel tertiæ, vel mediæ pro comuni embroca aquarum libr. 1 1. simp. in 24.

Emplastrorum pulueres confuso modo contritorum, vel radicum contusarum in aqua coctarum cuiuslibet m. 1. vnc. med. vel pinguedinis requiritur.

Euphorbii a gr. quatuor ad 12. dosis secundū Modernos a gr. tribus, secundum Veteres ad quinque tantū.

Empatorii decoctio ab vnc. 4. ad vnc. 6.

Esule



## De Dosibus.

92

**E**sfule dicte Aforbram Corticis radice eiusdē a gra. 8.  
vsq; ad 28. Sed lactis eius a gr. quatuor, vsq; ad 12.

### F

**F**icuum siccarum calefacti pro lenitione ventris do-  
sis nu. 6. vel octo.

**F**omentationum pro toto corpore situlæ aquæ 6. pro  
vno membro i. herbarum autem vel florum m. 10.  
pro qualibet situla consumptio communiter deco-  
cti vsque ad tertiam partem aquæ.

**F**omentationum ex floribus in decoctionibus pro qua  
libet situla aquæ m. 5. vel circiter, consumpt. vero  
quartæ partis tantum.

**F**ricationum modus erit vsque quo rubent membra  
quia resolvere oportet, aut diuertere.

**F**umiterræ succus ab vnc. med. ad vncias duas, deco-  
ctio ab vnciis decem ad 15.

### G

**G**albani, vel alterius liquoris vnc. vna pul. vnc. vna,  
pro pessariis crassitudo policis cum filo.

**G**argarismatum decoctio, & consumptio fit vsque ad  
medietatem, nec transeat lib. vnam, simplicium de-  
coquendorum dosis fit vnc. vna dulcium cum sub-  
scripto mellis, aut sacchari facturum vero cū aquis  
sublimatis. Dos aquarum vnc. 3. vel quatuor sy-  
rup. vnc. 2. elec. sub quadrupla.

**G**enistæ seminum ab vnc. vna ad vnc. tres.

### H

**H**amech elec. dragm. 2. ad aur. 3. montan. a dragmis  
quatuor ad drag. 7.

**H**ermodactilorum a drag. 3. vsque ad 6.

### N

4

Harmo-



## Bart. Montag.

Harmodaetilorum contritorū ab aureo vno ad duos.  
Hidromellis mellis libr. vna aquæ libr. octo, consum-  
ptio tertiæ partis.

Hiere simplicis Gal. in pil. drag. vna ad 2. confectæ cū  
melle ab vnc. med. ad 1.

Hiere picre per os vnc. med. per cly. vnc. 1.

Hiere colocynthidos dragm. 2.

Hisopi montani decoctionis ab vnc. octo ad 10. con-  
tritæ a drag. tribus ad septem.

### I

Indi maioris aurei 3. seu dragm. quinque minoris si-  
militer.

Infusionum decoctio, vel cum aqua, cum succo rosa-  
rum, vel alio ab vnc. duabus ad quatuor pul. vero  
simpli. infundendorum à drag. vna ad tres, ad plus  
infusionis ab hora octaua ad 14. Dosis aquæ in in-  
fusione vsque ad vncias octo, ad plus consumptio  
ad medium.

Ireos a drag. 2. ad dragmas 6. in decoctione, contrit.  
vero a drag. 1. ad duas.

Iringiorum conditarum vncia vna.

Iulep partem vnam, aquarum partes tres vbi confor-  
tatione opus est, vbi autem extinctio necessaria est  
faciemus iulep partem vnam, aquarum partes sex.

Iulep longum sit quantitas libr. vna, dul. aut vini gra-  
natorum quantum de syrupo, vel saccharo aquæ in  
syr. sit æqualis.

Iuris galli decrepiti a libra vna ad duas.

Iusquiami in iniunctionibus vsque ad dragmā vnam.

Iustini cum brodio cic. rubr. ad drag. vnam.

Lapidis



## L

Lapidis armeni loti a dragm. vna ad 2. non loti a dragm. med. ad drag. 1. vel 2.

Lapidis lazuli præparati a drag. 1. ad duas.

Lauatiuorum siue brodii, siue aquæ hordei, siue mellis dosis communiter vnc. sex, vel cyathus.

Lætificans almanforis ad dragmas sex.

Lenitiuorum quantitas forma digiti minimi faciendo mellis ad puluerē proportio dupla fortium vnc. 1. pulu. dragm. 2.

Litontripon drag. vna cum brodio cicerum rubrorū.

Loch sani vnc. 2. loch de squill. vnc. med.

Loch de pulmone vulpis dragm. sex.

Loch de papauere

vnc. vna.

Lupulorum seu volubilis magni vnc. 4. infusionis in aqua casei cum libra vna.

## M

Mannæ cum aqua hordei, vel endiuizæ dissolutæ vnc. duabus.

Masticatoriorum simplicium quantitas auellanzæ, cōpositarum viscosarum ad non viscosa proportio ad mitius ad sesquialtera. Conuenientius tamen viscosorum partes sunt tres, non viscosorum vna. Et cum sapa, vel melle viscosa mollescentur, & cum aromatibus aromatizentur & grauiora sint & non insuauia.

Mandragoræ in vnctionibus dragm. vna.

Mellis rosati

vnc. tribus.

Mezercon idest catapotia in decoctione a drag. media ad vnam, pulueris egranis octo ad scrupulum vñ.

Mioletæ a dragmis sex ad vnciam vnam.

Mitridati

dragmis tribus.

Mirabola-



**Bart. Montag.**

Mirabolanorum citrinorum infu. a drag. 5. ad 20. contritorum a drag. duabus ad quinque. Indorum infusorum a drag. quatuor ad decem, contritorum a dragmis duabus ad 4.

Musæ enez dragmis tribus.

**O**

Opii per os a gran. tribus, ad sex. In colliriis, suppositoriis vsque ad scrupulum vnum, in iniunctionibus vsque ad scrupulos duos.

Opiati cinoglossæ vide in c.

Opoponacis a drag. vna ad dragm. duas.

Oximellis simpl. vnc. tribus, laxatiui a drag. quatuor vsque ad dragm. septem.

**P**

Papaueris albi vnc. med. syrup. vnc. 1. vel 2. Emulsio-  
nis ab vnc. duabus ad vnc. 5.

Passularum pro lenitione ventris ab vncia media, sy-  
rupi vnc. vna, vel media.

Penidiarum cum brodio carniū pinguium pro leni-  
tione ventris vnc. 2.

Pessariorum quantitas sit vnc. 3. Crassitudinis polli-  
cis cum filio dosis galbani, vel alterius pnlueris ad  
alias pulueres sit æqualis.

Philonii romani, vel perfici a drag. vna ad tres post ci-  
bum per vnam horam cum somnū prouocare oportet,  
quando vero sedare dolorem aut fluxum cohi-  
bere exhibendo per 5. horas ante cibum.

Pilulæ de Agarico a drag. 1. ad drag. duas.

Pil. aggregatiue a drag. vna ad drag. duas.

Pil. elephangine a drag. 2. ad dragm. tres.

Pil. arabicæ a dragm. vna ad dragm. duas.

Pil.



- Pil. az aicut a dragm. vna ad dragm. duas.  
 Pil. aureæ a dragm. vna ad dragm. duas.  
 Pil. anatasi a dragm. vna ad dragm. duas.  
 Pil. aureæ alex. a drag. 2. ad drag. quatuor.  
 Pil. de bdelio a drag. 2. ad aureos duos.  
 Pil. cochie a dragm. vna ad dragm. duas.  
 Pil. de euforbio a drag. med. ad drag. vna.  
 Pil. de eupatorio ad drag. 2. cum aqua casei.  
 Pil. foetide scrupulis duobus.  
 Pil. de fumoterre a drag. 1. ad drag. duas.  
 Pilulæ de hermodactilis minores & maiores a drag-  
 ma vna ad dragmas duas.  
 Pil. inde a dragmis 2. ad aureos duos.  
 Pil. lapidis lazuli, & lapidis armeni ad dragmas duas  
 cum aqua casei.  
 Pil. lucis a dragma vna ad dragmas duas.  
 Pilulæ de opoponaco a dragma vna ad dragmas duas  
 cum aqua sua.  
 Pil. mastichine a dragm. vna ad drag. tres.  
 Pil. mirthine a drag. vna ad drag. duas.  
 Pilulæ de rhabarbaro ad dragmas duas.  
 Pil. sarcocollæ a dragm. vna ad drag. duas.  
 Pil. de serapino a drag. med. ad drag. vnam.  
 Pil. sine quibus a dragm. vna ad drag. duas.  
 Pil. stomatice a dragm. vna ad drag. duas.  
 Plinii arteticum ad dragmas duas.  
 Prifane hordei ad consumptionem tantam vt ad me-  
 dium veniat in liquido dandum.  
 Polipodii a dragm. duabus ad drag. quatuor.  
 Psili a dragma vna ad dragmas tres.  
 Pulueris solutiui a scrupulo vno ad dragmā vnā cum  
 cyatho medio aquæ hordei, brodii carniū aut vini.  
 Pulmonis vulpis dragmis duabus.  
 Prnuorum



## Bart. Montag.

Prunorum recentium, aut siccarum per noctem infu-  
forum in aqua florum violarum pro linimento ven-  
tris numero sex.

Prunorum siccarum expressiones cum saccharo adli-  
bram vnam.

### R

Radices in dectionibus consumuntur ad medietatem.

Rhabarba. contriti a dragma vna ad dragm. quatuor  
infusi a dragma vna ad dragm. 10.

Requies nicolai a dragma vna ad dragm. tres.

Rosati electi dragmas quinque secundum mesuem se-  
cundum alios dragm. 8.

Rosate nouelle

vnciam vnam.

Rhob de macis

vnciam vnam.

Rhob vini

vncias tres.

Rhob de berberis

vnciam vnam.

Rhob de agresta

vncias duas.

Rubie throciscate

vnciam mediam.

### S

Sacchari buglossati ab vncia vna, ad vncias duas.

Sacchari rosati ab vnc. medi. ad vnc. duas.

Sacculorum capitalium specierum medium ingredien-  
tium vnc. vna, vel vltra figuræ oblongæ quadran-  
gularis non transcendens tamen longitudinem sex  
digitorum nec latitudinem quatuor, & sit cum sin-  
done de grana.

Sacculus stomachalis simpl. mesuem 8. vel 10. est gr.  
vnc. 2. vel 3. figuræ scutalis.

Sacculorum cordialium vnc. vna figura quadrata, aut  
ad formam cordis in sindone retorta, cuius longi-  
tudo sit digitorum 6. trium latitudo.

Saccularum



- Saccularum hepaticarum, ac stomachalium forma  
lunarius, vt de cerotis dictum est in litera C  
Sape pro quibuslibet vnc. 3. farinæ amili vncis dua-  
bus & amigdalarum dulcium recent, sacchari cum  
aqua florum violarum, vel ros. quantum sufficit.  
Salis gemmæ ad aureum vnum.  
Sarcocolle a dragm. vna ad dragm. duas.  
Scammoneæ seu diagridii a gr. 3. ad 12.  
Sene præparate puluis a drag. 2. ad drag. tres, cum bro-  
dio senæ infusæ ab aureis tribus ad vnciam vnam.  
Seri caprini in quo fiunt infusa precedenti sero, epithi-  
mi, vel folliculi senæ dragmas duas, aut salis, drag.  
me 1. ad drag. vnam, colati mannæ scutella vna.  
Serpentariæ a dragm. 3. ad dragmas sex.  
Serapini a dragma med. ad dragm. duas.  
Sebesthen solutiui a dragm. 4. ad dragm. septem sim-  
plicis vero ab vnc. 1. ad vnc. 2.  
Sternuramentorum quantitas sit gr. 1. frumenti humi-  
dorum vera pro qualibet vncia vna liquoris sit pul-  
ueris scrup. 1. vel dragm. med. tota autem quanti-  
tas humidorum non transeat vncias duas.  
Stupefacientium non opiatorum quantitas a scrup. 1.  
ad drag. med. opiatorum vero fermentatorum ab  
vnc. 1. ad 2. med. pilul.  
Syrupi violati dosis ab vnc. 2. ad vnc. 4.  
Syrupi acetosi simplicis ab vnc. 2. ad vnc. 4. Et post ip-  
sum duas horas bibatur vnc. quatuor aquæ hordei.  
Syrupi communiter dosis est drag. duæ aquarum ve-  
ro vnc. 4. pro syrupo.  
Syrupi magistralis pro quolibet m. 1. herbarum lib.  
med. mellis despumati, vel sacchari addimus deco-  
ctionis, vel succi lib. med. mellis lib. med. vel sac-  
chari ad minus licet sit melius 5. 8. permiscere.  
Syrupi



## Bart. Montag.

Syrupi de stechade dosis ad vnciam vnam.

Stæchados, vel decoctionis a vnc. 5. ad 7.

Succi granatorum vnc. 2. cum aliqua prædictarum  
aquarum.

Succi ros. puri ab vnc. 1. cum saccharo.

Succi viol. puri ab vnc. 1. ad 2. cum saccharo.

Succi violarum ab vncia vna ad vnc. duas.

Succi habominabilis libr. vna, mellis vel sacchari cū  
libra vna addimus.

Specierum syrupos aromatizantium crasso modo  
contritarū, in petia linea ligatarum dosis erit vnc.  
3. pro lib. syrupi, vel iulep.

Sudorum prouocantium decoctionis, vel aquæ drag.  
5. vini albi vnc. 2. addimus.

Sacchari vnc. 2. electi drag. vna, cum vnciis quatuor  
aquarum.

Laus Deo.



